This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 106 454 770

FE
44
M36
1892



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

ET SPONTANÉES

DES ENVIRONS DE ROMORANTIN

PAR

ÉMILE MARTIN

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE,

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE ROMORANTIN.

ROMORANTIN

IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE ET RELIURE DE JOUBERT ET FILS

Place d'Armes, 22 et rue Saint-Martin, 12.

1875

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES & SPONTANÉES

DES ENVIRONS DE ROMORANTIN

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES & SPONTANÉES

DES ENVIRONS DE ROMORANTIN

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

ET SPONTANÉES

DES ENVIRONS DE ROMORANTIN

PAR

ÉMILE MARTIN

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE,

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE ROMORANTIN.

ROMORANTIN
IMPRIMERIE DE JOUBERT ET FILS

1875

Digitized by Google

Nov. 1909
21295

Digitized by Google

PRÉFACE

Ce catalogue est uniquement le résumé méthodique de mes herborisations autour de Romorantin et, plus particulièrement, dans les cantons de Romorantin, Mennetou, Salbris, Selles-sur-Cher et Saint-Aignan. Je n'y ai rien inscrit sans l'avoir moi-même constaté sur place.

La plupart des espèces citées sont communes aux autres parties du département de Loir-et-Cher que je n'ai pas explorées et figurent déjà dans les ouvrages qui se sont occupés de la flore de département. Mais, ce qui n'y figure pas, ce que j'ai tenu à indiquer, ce sont les localités précises où j'ai trouvé les espèces rares et intéressantes.

Mon but est de faire profiter de mes herborisations les botanistes Romorantinais qui viendront après moi, et, en évitant aux botanistes étrangers des pertes de temps considérables, les ennuis et les dépenses qui en sont la suite, de les déterminer à visiter mon pays par l'espoir fondé d'y trouver facilement les plantes signalées et d'y faire en outre des découvertes.

Digitized by Google

Une partie notable de la Sologne Romorantinaise n'a pas été explorée. Bien que j'aie herborisé, en dehors de mon arrondissement, dans huit communes du canton de Saint-Aignan plus rapprochées de Romorantin que de Blois, j'ai négligé, dans mon arrondissement, une partie du canton de Neung, la presque totalité du canton de Lamotte et les parties que j'ai explorées ménagent encore bien des surprises. En effet il a suffi à MM. Franchet, Max. Cornu et Rimbert d'y faire quelques courses pour découvrir :

M. Franchet : les *Ranunculus ophioglossifolius*,— *Œnanthe pimpinelloides*,— *Andryala integrifolia*,— *Verbascum nigrum, Schottianum, Schiedeanum et autres hybrides*, — *Veronica montana*, —*Phelipœa arenaria*, — *Leersia oryzoides*, — *Equisetum ramosum*.

M. Cornu : les *Linum Gallicum*, — *Utricularia intermedia*,— *Lymnanthemum nymphoides*, — *Linaria Pelisseriana*, — le remarquable *Isoetes tenuissima* et un très-grand nombre de cryptogames qui ne rentrent pas dans le cercle de mes études.

M. Rimbert : les *Lathyrus palustris*, et *orchis odoratissima*.

Avant eux et avant moi, mais après les recherches de M. Lefrou et du docteur Monin, M. Rimboux, le modeste et savant curé de Pruniers qui m'a dirigé pendant les premières années de mes herborisations, avait constaté, dans sa paroisse et aux environs, nombre de

Digitized by Google

plantes alors inconnues dans l'arrondissement de Romorantin : *Cardamine impatiens* et *parviflora*, — *Trifolium maritimum* et *glomeratum*, — *Myriophyllum alterniflorum*, — *Pelasites vulgaris*, — *Chlora imperfoliata*, — *Verbascum nothum*, — *Nayas minor*, — *Carex Buxbaumii et filiformis*, — *Nitella intricata*, — *Chara coronata*.

Enfin, chaque année je découvre moi-même quelques espèces nouvelles pour l'arrondissement de Romorantin et parfois pour le département de Loir-et-Cher, même dans des localités déjà visitées, mais qu'on ne saurait fouiller trop à fond. Aussi, en vue de diriger les recherches et de faciliter les découvertes, j'ai inscrit à la fin de chaque famille les espèces de Loir-et-Cher qui ne figurent pas dans mon catalogue et je les ai fait suivre du nom du botaniste qui me les a données ou indiquées.

Malgré la précision que je me suis efforcé de donner à mes annotations, on ne doit pas espérer trouver les espèces qu'on recherchera partout où je les ai signalées. Ainsi un grand nombre, surtout parmi les plantes annuelles, paraissent et disparaissent suivant l'influence prépondérante des causes favorables ou nuisibles à leur existence, suivant que l'année est chaude ou froide, sèche ou humide.

Celles qui se développent dans les bois récemment abattus, disparaissent au fur et à mesure que les arbres, en grandissant, les privent de la somme de lumière et d'air qui leur est néces-

Digitized by Google

saire et sont remplacées par d'autres espèces qui recherchent l'ombre et la fraîcheur.

Les *Characées*, les *Nitella* particulièrement, persistent rarement dans un même endroit pendant un grand nombre d'années.

Les *Hybrides* n'apparaissent qu'accidentellement et les localités citées ne valent que comme indication, dans un même lieu, des espèces dont le croisement est de nature à les produire.

Enfin le dessèchement des étangs et des marais, les semis de pins, le curage des cours d'eau, les défrichements des bruyères et d'autres causes secondaires concourrent à modifier chaque année la végétation de la Sologne d'une manière profonde et durable. Tout en constatant ces modifications lorsqu'elles me sont connues, j'ai maintenu mes annotations antérieures inutiles sans doute pour la recherche des plantes, mais destinées à rappeler l'état ancien de mon pays et à faire connaître l'influence sur sa flore de la culture et de la civilisation.

Il me semble assez difficile de tracer des plans d'herborisation qui devraient être modifiés suivant le lieu qui servira de point de départ, l'année, la saison, le temps et les moyens de de transport dont on dispose, le but enfin qu'on veut atteindre.

Toutefois, parmi les localités intéressantes, je puis citer comme lieu d'herborisation de fin de mai :

1° Les carrières de Belleroche dis-

Digitized by Google

tantes de 2 kilomètres à peine de la gare de St-Aignan-Noyers.

Sous les pins de la forêt de Grosbois qui bordent ces carrières au Nord-Ouest on trouve en abondance : *Arenaria montana, Digitalis purpurea, Asphodelus sphærocarpus* et surtout *Simethis planifolia;* puis, à deux pas de là, dans les carrières : *Helianthemun procumbens, Linum salsoloides, Genista sagittalis, Digitalis lutea, Orobanche Teucrii, Melittis melissophyllum, Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Polygonatum vulgare, Orchis simia, purpurea* et *hybrida, Ophrys aranifera, apifera* et *muscifera, Cephalanthera ensifolia, Epipactis latifolia* et, parfois, *Limodorum abortivum.* Sans parler des *Hypericum montanum, Ononis natrix, Seseli montanum, Brunella grandiflora* et *Phalangium ramosum* dont la floraison est plus tardive. Il est difficile, je crois, de rencontrer, sous le même coup d'œil et d'une manière aussi tranchée, une réunion plus remarquable de plantes silicoles et de plantes spéciales au calcaire. Cette herborisation se fait facilement en prenant à Romorantin le convoi de midi 45 minutes à la destination de la gare de St-Aignan, et, après avoir largement herborisé, on a le temps nécessaire pour dîner à St-Aignan et on est de retour à Romorantin à 10 heures du soir.

Celui qui est marcheur ou qui dispose d'une voiture et d'un bon cheval peut, en partant vers 5 heures du matin de Romorantin, aller d'abord au-delà de Noyers jusqu'au moulin de Chante-

Digitized by Google

reine, commune de Thésée. A peu de distance de ce moulin, dans la vallée du Cher, vers le Sud-Est, il recherchera, dans un large fossé parallèle à la route : le *Ranunculus ophioglossifolius* que j'y ai trouvé une fois, — dans des terres : les *Sisymbrium asperum* C. et *Scutellaria hastifolia*, ce dernier très-rare. — Dans les moissons : *Myagrum perfoliatum*, *Neslia paniculata*, *Valerianella coronata*, — aux bords des fossés gazonnés : *Viola pumila* et, un peu plus loin, à 600 mètres peut-être du moulin : le *Viola stricta* au milieu d'une prairie.

Il sera bon d'emporter son déjeûner et, après déjeûner et herborisation, on aura le temps nécessaire pour visiter les carrières de Belleroche.

2° L'exploration de la rive gauche du Cher dans les communes de St-Julien, St-Loup et Maray.

On arrive à Villefranche où, au bas de la chaussée du pont du canal du Berry, on récolte : *Lemna arhiza.*

Après avoir traversé le pont de St-Julien, en aval et aux bords du Cher : *Salix hippophaefolia* si la saison n'est pas déjà trop avancée.

A 1 ou 2 kilomètres au-delà de St-Julien, dans les terres bordant la route de Graçay : *Polychnemum arvense*, *Cerastium brachypetalum*,— entre les bornes nos 5 et 6 sur les talus des fossés de la route et aux bords des chemins aboutissant à l'Ecot : *Viola lancifolia.*

On revient sur ses pas pour aller aux Terres-

Digitized by Google

Rouges et dans le taillis situé près et à l'Est de cette ferme : *Erica scoparia, Euphorbia pilosa, Simethis planifolia, Asphodelus sphærocarpus.*

De retour à St-Julien, on suit la route de St-Loup et, immédiatement avant d'arriver à Olivet, dans un pâtureau appelé le Jardin du Couvent : *Aquilegia vulgaris, Orobanche Galii, Orchis purpurea* et *Simia, Ophrys aranifera.*

Dans la cour de la ferme d'Olivet : *Ulmus effusa.* Autour des bâtiments : *Lamium maculatum.*

Arrivés à Sauveterre dans une fosse bordant la route et un taillis contigu au jardin du château : Une Renoncule aquatique intéressante que M. Lamotte appelle *R. flaccidus.*

Entre Sauveterre et St-Loup, dans deux ravins : *Cystopteris fragilis.*

Dans les bois de la côte du Cher qui se rapprochent de St-Loup, surtout s'ils sont récemment abattus : *Cardamine impatiens, Epilobium montanum* et *lanceolatum, Circœa lutetiana, Phyteuma nigrum, Luzula Forsteri, Carex tomentosa, Aspidium angulare.*

Après avoir traversé St-Loup on prendra, à droite de la maison d'école, le chemin qui, par la ferme de la Grange, descend au ruisseau du même nom. Aux bords de ce ruisseau et spécialement dans les bois du Fondereau : *Oxalis acetosella, Primula elatior, Galeobdolon luteum, Veronica montana, Allium ursinum, Polystichum Filixmas, Alhyrium Filixfemina, Aspidium aculeatum* et *angulare.*

Digitized by Google

On descend ensuite ce ruisseau jusqu'à sa jonction avec le Roulier qu'on remonte jusqu'à la Fontaine-Chaude. Dans la terre sise à l'angle des deux ruisseaux : *Trifolium strictum;* dans le bois de la rive droite : *Sedum elegans, Œnanthe pimpinelloides;* aux bords du Roulier et plus particulièrement au bas de la ferme du même nom : *Galeobdolon luteum, Ornithogalum pyrenaicum, Carex remota* et *strigosa.* Ce dernier abondant seulement à la Fontaine-Chaude.

En reprenant le chemin de St-Loup, près du bourg : *Cerastium brachypetalum, Ranunculus parviflorus.*

On suit ensuite la route de St-Loup à Genouilly jusqu'à la Pelaudière et, dans le bois humide touchant à la vallée qui se trouve entre la Pelaudière et Sigonneau : *Fragaria elatior.*

En se rendant de la Pelaudière à Daluet, dans ou aux bords d'un large fossé sis au bas des communs de la Pelaudière à droite du chemin de Daluet : *Lathyrus Nissolia* et *tuberosus, Glyceria plicata.*

A Daluet, dans le jardin : *Lamium incisum.*

Dans les moissons de la ferme : *Medicago apiculata, Lathyrus tuberosus, Turgenia latifolia, Matricaria chamomilla* et *inodora.*

Dans les pacages et fossés tourbeux surtout à l'Est : *Cerastium aquaticum, Scirpus sylvaticus, Carex paniculata* et *punctata, Glyceria plicata* et *airoides, Polystichum Thelypteris.*

Pour revenir il vaut mieux passer par le bourg de Maray. Au bas de Maray, dans la prairie

Digitized by Google

en pente qui borde la route : *Trifolium maritimum.*

NOTA. — Je ne compte pas au nombre des espèces à récolter le *Nasturtium pyrenaicum* qui peuple tous les gazons et les *Ranunculus parviflorus*, *Cardamine hirsuta*, *Thlaspi rubellum*, *Trifolium subterraneum*, *glomeratum* et *filiforme*, etc., qu'on doit rencontrer çà et là sur son chemin.

Cette excursion exige cheval et voiture. On part le matin entre 5 et 6 heures, on emporte son déjeûner et on revient facilement dîner à Romorantin.

3° A ceux qui ne pourraient disposer que de quelques heures : Une excursion aux Fontenils et aux bords du Riau-Mabon.

On s'arrête à Romorantin dans l'île des Poulies où : *Cardamine impatiens* et *Ornithogalum pyrenaicum.*

On prend le cheminde la Fringale et, arrivé aux Berthets dans le fossé Sud de la route : *Ranunculus hederaceus*, *Montia rivularis.*

Aux Papillons : *Trifolium Molinerii* et *subterraneum.*

A 4 kilomètres de Romorantin environ on quitte le chemin de la Fringale pour suivre celui des Fontenils et de Chenon et, dans les moissons à l'angle des deux chemins : *Sedum pentandrum*, *Spergula pentandra*, *Spergularia segetalis.*

Aux bords du parc des Fontenils : *Anemone Pulsatilla.*

Dans un pâtureau du Clos-Thion voisin de ce

Digitized by Google

parc : *Arnica montana, Hypochœris maculata, Simethis planifolia, Carex Hornschuchiana.*

Dans la partie haute de ce pâtureau : *Anemone Pulsatilla.*

Dans une fosse : *Myriophyllum alterniflorum, Nitella translucens.* Dans une terre contiguë : *Specularia hybrida.*

On revient sur ses pas à la route de la Fringale qu'on suit jusqu'au Riau-Mabon. Là dans les prairies et aux bords du ruisseau au Sud de la route : *Ranunculus ophioglossifolius, Cardamine parviflora, Trifolium Michelianum, micranthum* et *strictum, Sedum pentandrum, Helosciadium inundatum, Carex Buxbaumii, tomentosa* et *Hornschuchiana.*

Dans la fosse d'une terre en regard, au Nord de la route : *Alisma natans, Nitella capitata.*

Une demi-heure en voiture suffit pour revenir à Romorantin. Si l'on dispose d'un temps plus considérable on peut continuer l'herborisation en quittant la route de la Fringale pour prendre le chemin de la Gaillardière.

Au détour on trouve dans la bruyère et sur le chemin : *Erica scoparia, Orobanche Ulicis, Festuca rubra,* Var. *hirsuta.*

Dans la prairie de la Gaillardière bordant en amont le Riau-Mabon : *Carex Buxbaumii, Asphadelus sphœrocarpus.*

Aux bords de cette prairie et du bois : *Trifolium medium.*

Dans le bois : *Rhamnus cathartica.*

En remontant le Riau-Mabon on traverse un

Digitized by Google

chemin au-delà duquel le *Carex Buxbaumii* forme presque la base de la prairie.

En suivant au Sud ce chemin on arrive à des marnières sises entre Chenon et la Gouabinière où : *Ranunculus Godroni, Nitella intricata, Chara longibracteata* Var. *mundior, Chara aspera* et, parfois, *Nitella capitata.*

4° Enfin, à ceux qui, venus de Paris, auraient à leur disposition une voiture pour les conduire de Salbris à Romorantin, je puis conseiller l'itinéraire suivi le 31 mai 1874, par M. Bureau, professeur au Muséum, accompagné de MM. Max. Cornu, Poisson et de nombreux botanistes.

M. Jules Poisson a rendu compte de cette herborisation et son rapport figure au Bulletin de la Société botanique, séance du 10 juillet 1874, spécialement pages 219 et 220.

—

Pour le classement et les dénominations, j'ai pris comme guide la flore de France de MM. Grenier et Godron et lorsque, par exception, je m'en suis écarté, j'ai inscrit les noms adoptés par ces auteurs.

Les espèces rares ou douteuses ont, pour la plupart, été soumises soit à M. Grenier, soit à M. Boreau dont nous avons à déplorer la perte récente. J'ai eu recours également aux lumières de mon ami M. Franchet particulièrement en ce

Digitized by Google

qui concerne les *Verbascum*. Je prie MM. Grenier et Franchet de vouloir bien agréer ici l'expression de mes remercîments.

Les mois placés à la suite des noms spécifiques des plantes sont ceux pendaut lesquels je les ai observées.

Les localités imprimées en caractères italiques sont celles dont j'ai constaté la disparition.

Les localités imprimées en gros caractères sont celles où l'on doit herboriser de préférence pour trouver l'espèce recherchée.

ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

C.C.	Très-commun.
C.	Commun.
A.C.	Assez commun.
P.C.	Peu commun.
A.R.	Assez rare.
R.	Rare.
R.R.	Très-rare.
fl.	Fleurs.
fr.	Fruits.
Var.	Variété.
S.Var.	Sous-variété.
C^{ne}	Commune.
A.B.	Arrondissement de Blois.
A.V.	Arrondissement de Vendôme.
A.B.V.	Arrondissements de Blois et de Vendôme.

Digitized by Google

Noms des communes où j'ai herborisé et des cantons auxquels ces communes appartiennent d'après l'ordre suivi dans ce catalogue :

CANTON DE ROMORANTIN

Romorantin.
Courmemin.
Lanthenay.
Loreux.
Millançay.
Pruniers.
Veilleins.
Vernou.
Villeherviers.

CANTON DE LAMOTTE

Lamotte.
Nouan-le-Fuzelier.

CANTON DE MENNETOU

Mennetou.
Chapelle-Montmartin (La).
Châtres.
Langon.
Maray.
Saint-Julien.
Saint-Loup.
Villefranche.

CANTON DE NEUNG

Neung.
Dhuizon.
La Ferté-Beauharnais.
La Ferté-Saint-Cyr.

Digitized by Google

La Marolle.
Montrieux.
Thoury.

CANTON DE SALBRIS

Salbris.
La Ferté-Imbault.
Marcilly-en-Gault.
Orçay.
Pierrefitte-sur-Sauldre.
Saint-Viâtre (autrefois Tremblevif).
Selles-Saint-Denis.
Souesmes.
Theillay.

CANTON DE SELLES-SUR-CHER

Selles-sur-Cher.
Billy.
Gièvres.
Gy.
Lassay.
Mur.
Rougeou.
Soings.

CANTON DE SAINT-AIGNAN

Saint-Aignan.
Châteauvieux.
Châtillon-sur-Cher.
Couffy.
Noyers.
Pouillé.
Ségy.
Thésée.

Romorantin, le 15 Septembre 1875.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES ET SPONTANÉES

DES ENVIRONS

DE ROMORANTIN

RANUNCULACEÆ Juss.

CLEMATIS Vitalba L. Juillet-septembre.
Haies et buissons.

Val du Cher, C.C. — Val de la Sauldre, A.C. — Çà et là ailleurs.

C^ne^ de Romorantin : Haie de la rue Creuse, près le Rantin.

NOTA. — Un pied de *clématis vilicella* L. a existé pendant longtemps aux abords de la Sauldre, entre le Gué des Moulins-Neufs et Pruniers, loin de toute habitation et de toute culture.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

THALICTRUM flavum L. Juillet-août.

Bords des eaux, endroits marécageux et ombragés.

Bords du Cher, de la Sauldre, de la petite Sauldre et de la Boute-Vive, A.C. — Çà et là ailleurs.

C^ne^ de Villeherviers : Prairies tourbeuses en amont du parc du Portail, aux bords du Riau-Mabon.

ANEMONE Pulsatilla L. Fin d'avril-Commencement de juin.

Landes, bruyères, pacages incultes et secs.

C^ne^ de Romorantin : *Côte de Piégu*, — *Bruyères des Monteaux*.

C^ne^ de Lanthenay : *Marnières de Grangeneuve*.

C^ne^ de Pruniers : Pentes incultes dominant la route départementale N° 1, entre Beauvais et les Quatre-Roues, A.C. — *Landes entre cette partie de la route départementale n° 1 et la Sauldre, C.C.*

C^ne^ de Villeherviers : Partie haute d'un pâtutureau entre les Fontenils et Clos-Thion, A.C. — Bords du chemin longeant le parc des Fontenils, R.R. — Talus limitant à l'Est la prairie du Riau-Mabon entre le chemin de la Fringale et la Gaillardière, C.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

ANEMONE nemorosa L. Mars-avril.

Bois frais, pacages frais et ombragés.

C^ne^ de Romorantin : Ile des Poulies, C.

C^ne^ de Lanthenay : Prairie de la rive droite de la Nasse au-dessous de l'arche de Plisson, R. — Prairie de la rive gauche de la Sauldre en amont de Longuevalle, R.

C^ne^ de Villeherviers : Bas du parc du Portail, C. — Pâtureau de la rive gauche de la Sauldre en regard de Moulin-Neuf, A.C. — Ile de Trécy, C. — Bords du grand fossé au-dessous du Pont de Juillet, C.

C^ne^ de S^t^-Julien : Taillis des Terres-Rouges divisé par une prairie, A.C.

C^ne^ de S^t^-Loup : Bords du ruisseau de la Grange, R.

ADONIS autumnalis L. Juin.

Moissons des terrains calcaires.

C^ne^ de Billy : Trouvé en 1864 entre le moulin de Larey et la route nationale 156, R.R.

═══ **æstivalis** L. Mai-juin.

Moissons des terrains calcaires.

C^ne^ de Pruniers : Moissons de la Besaudière, R.R. — Id. de la Maison-Blanche, R.R.

C^ne^ de Gièvres : Terres du Vivier, R.R. — Champs des Calabres, R.R.

Digitized by Google

RANUNCULACÉÆ

ADONIS flammea Jacq. Mai-juin.

Moissons des terrains calcaires.

C^ne^ de Gièvres : Champs des Calabres, R.R.

C^ne^ de Billy : Trouvé en 1864 entre le moulin de Larey et la route nationale 156, R.R.

MYOSURUS minimus L. Avril-mai.

Moissons, vignes et cultures sablonneuses et humides, C.

C^ne^ de Lanthenay : Terre à l'angle de la route de Pruniers et du chemin de la Dabinerie.

Je l'ai trouvé communes de Romorantin, Pruniers, Villeherviers, — La Chapelle-Montmartin, Langon, S^t^-Julien, S^t^-Loup, Villefranche, — La Ferté-S^t^-Cyr, — Selles-S^t^-Denis, — Selles-sur-Cher, Billy, Gièvres, — Châtillon-sur-Cher.

RANUNCULUS hederaceus L. Avril-juillet.

Mares, fossés inondés et ruisseaux des terrains sablonneux, C.

(Dans les lieux asséchés, les feuilles sont plus petites, leurs lobes plus profonds et moins arrondis).

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

C^ne de Romorantin : Fossés du chemin de Theillay entre la Croix-des-Bubes et la Roche, — aux Berthets dans le fossé du chemin de la Fringale.

C^ne de Lanthenay : Fossés du chemin de Lassay.

C^ne de Millançay : Fosse au bas de l'étang de Varenne.

C^ne de Villeherviers : Fossés de la route de Salbris aux abords de Moulin-Neuf, de la ferme de Trécy et du Pont-Gitton.

C^ne de Villefranche : Fosse et ruisseau à Montauger, — fossé de la route de Villefranche à Gièvres près S^te-Marthe.

C^ne de Lassay : Fossé d'écoulement de l'Etang-Neuf.

Je l'ai trouvé encore communes de Loreux, Pruniers, Veilleins, — Langon, — Neung-sur-Beuvron, La Ferté-S^t-Cyr, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Selles-S^t-Denis, — Gièvres, Gy.

RANUNCULUS tripartitus D.C. fin Mars-mai. Eaux tranquilles des mares et fossés dans les terrains sablonneux. — C.C. dans les printemps humides.

(La forme terrestre se rencontre sur les terrains asséchés).

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

C^ne de Romorantin : Fosses dans les bruyères de Chat-Lièvre entre la route de Villefranche et le chemin de fer.

C^ne de Lanthenay : Petite fosse bordant à l'Est le chemin de Queue-de-Loup à Courmin, — fossé du chemin de Belair à Queue-de-Loup dans un bas-fonds à l'angle des tailles du Lieu, — fosse dans les landes qui séparent les tailles du Lieu du chemin de la Forêt presque vis-à-vis l'allée de la ferme des Bruyères, — fosse bordant, à l'Ouest, le chemin de la forêt entre l'allée des Bruyères et celle de Mer,—*fosses d'extraction bordant la route de Vernou.*

C^ne de Millançay : Fosse bordant la route de Millançay à Vernou, — fossé d'une taille au Nord de l'étang du Vieux-Millançay, — fosse de l'allée de Villechenay à la route départementale n° 1, — étang bordant la route de Millançay à Montrieux au bas de la ferme des Montils.

C^ne de Pruniers : Fossés de l'allée bordant les bruyères entre Longueville et la Cornuère et le ruisseau traversant cette allée, — fossé bordant les bruyères de la Pommerie, — fossé bordant au Sud le pâtureau de la Petite-Robinière, — fossés à l'angle Nord-Est du parc de la

Digitized by Google

Miltière joutant la route de Gy, — fosses dans des bruyères entre les Landes et la Chapelle, — *fosse dans les bruyères de la Robinière, etc.*

C^ne^ de Veilleins : Fosse bordant, à l'Est, la route de Veilleins à Courmemin en sortant de Veilleins, — fosses dans des bruyères bordant cette route, — fossés bordant la route de Romorantin à Vernou.

C^ne^ de Villeherviers : Fossé du val de la Sauldre bordant des terrains spongieux couverts de *myrica gale* en amont du parc du Portail, — marais de la rive gauche de la Sauldre, presque vis-à-vis Trécy, — fossés du chemin de Theillay près la ferme du Tourneux, — fosse dans le pâtureau des Pelleteries.

C^ne^ de Salbris : La grande rouère entre Montboulan et le Thou.

C^ne^ de Lassay : Petit étang dans des bruyères près le château du Moulin, — fosses au bas de l'Etang-Neuf, — fossés à la Bretonnerie, — fossé entre un bois et la terre sise au bas de la chaussée de l'étang du Rotay.

Je l'ai récolté en outre communes de Courmemin, Loreux, — La Ferté-S^t^-Cyr, — S^t^-Viâtre, — Gy.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

RANUNCULUS ololencos Lloyd. Fin avril-juin. Marais, fosses, fossés, étangs, C. principalement dans les terres de bruyère.

(La forme terrestre se rencontre fréquemment sur les terrains asséchés.)

Cne de Pruniers : Marais Chaunet, — ancien étang Facy, — fosse dans des bruyères entre les Landes et la Chapelle, — *fosse et mare à l'extrémité Sud-Ouest des bruyères de la Robinière.*

Cne de Veilleins : Fossé de la route de Romorantin à Vernou entre les bornes 76 et 77.

Cne de Villeherviers : Gardoir de l'Etang-Neuf.

Cne de Dhuizon : Chambre d'emprunt bordant la route de Dhuizon à Thoury.

Cne de Salbris : Fossés de la route entre Salbris et Souesmes, — mare de la rive droite de la Sauldre près Vauteau, — le grand marais entre le Thou et l'Ecluse. — Mares et chambres d'emprunt dans une grande bruyère coupée par la route nationale n° 20 et bordant le chemin de fer à 3 kil. environ au Nord de Salbris.

Cne de La Ferté-Imbault : Canal dans le parc du château, — canal coupé par la route départementale n° 11 entre le bourg de La Ferté-Imbault et le pont sur la Sauldre.

Digitized by Google

Cne de Marcilly-en-Gault : Etangs de la Magdeleine, de l'Aunay.

Cne de Selles-St-Denis : Fossé d'écoulement d'une mare près le Tertre.

Cne de Souesmes : Fossés de la route entre Salbris et Souesmes, — fosse bordant l'ancien chemin de Pierrefitte à Souesmes, — fossé entre des bruyères et un pré bordant au Sud la route départementale nº 11 vers les limites du département. Dans ce fossé, comme dans la fosse détruite dans les anciennes bruyères de la Robinière, j'ai trouvé des fleurs intermédiaires entre les R. *ololencos* et *tripartitus*.

Cne de Gy : Marais dans les landes de Chênemoireau, — idem de Boureau, — marécages de la rive droite de la Croisne entre le bourg de Gy et la ferme de la Demangère.

Cne de Lassay : Mares à la Brétonnière.

RANUNCULUS aquatilis* L. Avril-août.

Eaux stagnantes, C.C.

Je comprends sous ce nom des individus à pétales largement ou étroitement obovales,

* NOTA. — J'ai tenté de décrire les formes très-variées que présentent les nombreuses renoncules d'eau des environs de Romorantin, mais l'insuffisance de mes observations ne me permet pas de publier mon travail à ce sujet; je me borne donc à rattacher les formes que j'ai observées aux espèces généralement admises.

Digitized by Google

avec ou sans feuilles flottantes, à feuilles flottantes réniformes, tronquées ou peltées, à feuilles submergées ayant des laciniures courtes ou longues, écartées en tous sens ou se réunissant en pinceau quand on les émerge.

L'une de ces formes à laciniures écartées en tous sens a été pendant plusieurs années considérée par M. Grenier comme étant le *R. confusus* Gr. et God., et par suite je l'ai moi-même distribuée sous ce nom à plusieurs correspondants. Je l'ai observée :

C^ne^ de Lanthenay : Étang de Courmin.

C^ne^ de Langon : Contre-fossé du canal du Berry.

C^ne^ de Mur : *Étangs près et au Nord du bourg de Mur.*

C^ne^ de Soings : *Lac de Soings.*

RANUNCULUS trichophyllus Ch. Avril-juin. Eaux tranquilles, A.C.

Varie à feuilles toutes submergées et à feuilles flottantes, qui n'apparaissent guère avant le mois de mai. (R. *Godronii Gren.*)

C^ne^ de Romorantin : Fossé du chemin des Arrogantes (avec feuilles flottantes).

C^ne^ de Villeherviers : Fosses au Nord du chemin de Theillay près le pont sur la Rère, — marnières entre Chenon et

Digitized by Google

la Gouabinière (avec ou sans feuilles flottantes).

Cne de Villefranche : Larges fossés entre le jardin de la Commanderie et la route de Villefranche, — *fossé d'écoulement d'une mare entre la Besardière et la route de Villefranche* (avec feuilles flottantes).

Cne de Gièvres : *Mare à la Berrerie* (plus petit dans toutes ses parties). — Mare bordant à l'Est l'ancien chemin de Gièvres à Chabris.

Cne de Gy : Fosses de la vallée de la Croisne bordant la route de Romorantin à Gy.

Var. **radians** (R. *radians Rev.)* Avril-mai. Eaux tranquilles, R.

Cne de Lanthenay : Marnière à la Dabinerie.

Cne de Villeherviers : Mare au Bois-Fuzeau, bordant la route de Salbris (route départementale nº 11).

Cne de Langon : Chambre d'emprunt entre le canal du Berry et la route nationale nº 76 de Nevers à Tours.

Drouetii Sch. *(*R. *Paucistamineus Tausch.)* Fin mars-avril.
Eaux tranquilles, R.

Cne de Romorantin : Fosse à St-Marc.

Cne de Pruniers : Anciennes marnières à la Cornuère.

Digitized by Google

Cne de Villefranche : Larges fossés entre le jardin de la Commanderie et la route de Villefranche.

J'ai trouvé commune de St-Loup, d'avril à juin, dans une fosse bordant la route de St-Loup et le bois contigu aux jardins de Sauveterre, un Ranunculus que M. Martial Lamotte observe depuis longtemps en Auvergne et qu'il appelle R. *flaccidus*. Il lui paraît distinct des R. *trichophyllus* et *Drouetii* par les proportions plus grandes de toutes ses parties, et en outre du R. *trichophyllus* par ses tiges molles et les laciniures de ses feuilles molles, longues et réunies en pinceau. Il m'a paru remarquable par ses pétales étroits, ses styles persistants et allongés, ses pétioles très-courts excepté dans le bas des tiges; et enfin, parfois, par le nombre de ses fleurs qui, sur une même branche non ramifiée, s'étagent les unes au-dessus des autres. Si ce Ranunculus devait être considéré comme une espèce, il ne pourrait être appelé R. *flaccidus*, puisque ce nom a été donné par M. Hooker à un Ranunculus de l'Hymalaya.

RANUNCULUS circinatus Sibth. R. *divaricatus Schrk.* Mai-juin.

Eaux tranquilles, R.

Digitized by Google

C^ne de Villefranche : Canal du Berry, entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux. — Contre-fossé Nord du canal du Berry entre Villebrette et l'Escourioux.

C^ne de Mennetou : Canal du Berry à Mennetou.

RANUNCULUS fluitans Lam. Mai-juillet.
Eaux courantes, C. dans le Cher, — C.C. dans la Sauldre, surtout en se rapprochant du confluent de cette rivière.

Var. *heterophyllus*.

C^ne de Gièvres : Je l'ai trouvé une fois dans le Cher entre l'Escourioux et Jaugy.

C^ne de Villeherviers : Je l'ai trouvé une fois dans la Sauldre au confluent de la Beauce.

= **Lingua** L. Juillet.
Marécages et fossés marécageux.

C^ne de Villeherviers : Fossés dans les prés de la Chansonnerie rive droite de la Sauldre, R.

C^ne de Langon : Bords marécageux de l'étang du grand pâtureau de la Fleurière, R.R.

= **flammula** L. Mai-octobre.
Mares, fossés et endroits humides, C.C.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

Varie à racines fibreuses ou radicantes, à feuilles entières ou dentées, ovales ou cordiformes à la base.

RANUNCULUS auricomus L. Avril-mai.
Bois et pâtureaux frais et couverts, C.

═══ **acris** L. Mai-septembre.
Prés, pelouses, C.C. var. *Steveni* et var. *Multifidus*, avec les passages de l'une à l'autre variété.

═══ **nemorosus** D.C. Mai-juin.
Bois, pâtureaux couverts, C. notamment :

C^ne de Courmemin : Taillis de l'Imbertière.

C^ne de Lanthenay : Tailles du Lieu. — Futaie de Mer.

C^ne de Loreux : Bois à la Moutonnerie. — Forêt de Bruadan.

C^ne de Millançay : Forêt de Bruadan.

C^ne de Veilleins : Taille du Loup aux levées. — Bois autour du bourg.

C^ne de Vernou : Bois aux Augères.

C^ne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines.

C^ne de S^t-Loup : Bois de la côte du Cher. — Bois bordant le ruisseau de la Grange.

C^ne de Lassay : Bois et pâtureau à la Bertonière.

C^ne de Noyers : Forêt de Grosbois.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

RANUNCULUS repens L. Avril-juin.
Prés, fossés humides, bois humides, C.

═══ **bulbosus** L. Avril-juin.
Prés, pacages, pelouses C.C.

═══ **chœrophyllos** L. Mai-juin.
Talus des fossés, bords des chemins, pelouses arides; dans les terrains sablonneux, C. notamment :

Cne de Romorantin : Bords de la route de Theillay près la ferme du Portail.

Cne de Courmemin : Chemin longeant la taille de l'Imbertière près l'angle Nord-Est du bois.

Cne de Lanthenay : Abords de la Dabinerie, — Bords du chemin de Belair à Queue-de-Loup.

Cne de Millançay, C.C.

Cne de Pruniers : Abords de la Chapelle, de la Cornuère, du pâtureau de la Grange, etc.

Cne de Villeherviers : Terre à l'angle du chemin de Putteville et de la route de Theillay, — chemin de Romorantin à Forez.

Je l'ai trouvé encore Cnes de Veilleins, — Villefranche, — Marcilly-en-Gault, etc.

═══ **Philonotis** Retz. Mai-juin.
Moissons et champs humides, C.C.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

RANUNCULUS parviflorus L. Mai.

Pied des haies, C. notamment :

C^ne^ de Romorantin : Ruelles des Crottés, rue du Lys — route d'Orléans — rue de Beauvais — rue de l'Erable — Chemin-Creux, — chemin des Lisses.

C^ne^ de Lanthenay : Route de Pruniers, route de Salbris, etc.

Je l'ai trouvé en outre communes de Courmemin, Veilleins, Villeherviers — Langon, St-Julien, Villefranche — Salbris, Pierrefitte, Selles-St-Denis — Gièvres, Mur — Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher.

= **ophioglossifolius** Vill. Mai-juin.

Fossés et prairies inondés.

C^ne^ de Romorantin : Fossé d'un pré bordant la route de Romorantin à Villefranche, près la borne 43, R.R.

C^ne^ de Villeherviers : Prairie humide au bas du presbytère, R.R. — Bords du chemin de Theillay, dans la partie excavée longeant le bois entre les Tourneux et le pont sur la Rère, C., — fossé dans le val de la rive gauche de la Sauldre en amont du déchargeoir de Moulin-Neuf, R.R. — Prairies du Riau-Mabon, en amont du chemin de la Fringale, C.C.

Digitized by Google

C^ne^ de Villefranche : Prairie de la Lavanderie, bordant au Nord la route 76 et fossé de la route dans lequel s'écoule l'eau de cette prairie, C. — *Partie marécageuse d'un pâtureau de la Lavanderie, contigu à l'ancien pâtureau de S^te^-Marthe dans le val du Cher,* R.

C^ne^ de Selles-sur-Cher : Fossés à l'angle du chemin d'Avray et de la route de Selles à Meusnes, A.R.

C^ne^ de Thésée : Vallée du Cher dans la partie du fossé d'assainissement faisant face à la vallée de Chantereine, R.

RANUNCULUS arvensis L. Mai-juin.
Moissons, C.

═══ **sceleratus** L. Mai-juin.
Lieux fangeux, A.C.

C^ne^ de Romorantin : Écoulement fangeux près de Saint-Lazare dans le bas du faubourg de Blois.

C^ne^ de Lanthenay : Fosse à la Malicorne.

C^ne^ de Pruniers : Fosse à la Pésière.

C^ne^ de Villefranche : Fosse à l'Escourioux.

C^ne^ de Soings : Autour du lac de Soings, etc.

FICARIA ranunculoides Mœnch. Mars-mai.
Haies, prairies, bois et pâtureaux frais, C.C.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

CALTHA palustris L. Avril-mai.

Bords des ruisseaux, prairies humides, C.

Varie à feuilles légèrement ou fortement crénelé-dentées, étroitement ou largement réniformes.

HELLEBORUS fœtidus L. Février-avril.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bords du chemin bas près le bois de la Cave.

Cne de Châteauvieux : Parc du Château.

NIGELLA arvensis L. Juillet-août.

A.C. mais dans les moissons des terrains calcaires seulement.

Cne de Romorantin : Moissons aux Arrogantes.

Cne de Pruniers : Moissons de la Maison-Blanche, de la Besaudière.

Cne de Villefranche : Moissons de la Gaudinière.

Cne de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.

Cne de Gièvres : Moissons de Jaugy, du Poulinat, de la Grange de Rère, de la Colinière, des champs des Calabres.

AQUILEGIA vulgaris L. Mai-juillet.

Cne de Loreux : Forêt de Bruadan, çà et là, R.

Cne de Millançay : Forêt de Bruadan, çà et là, R.

Digitized by Google

RANUNCULACEÆ

Cne de Pruniers : Bords des prés du ruisseau de Bâtarde à droite et à gauche du chemin de Romorantin à Pruniers, — Grand pâtureau de la Cornuère.

Cne de Villeherviers : Parc du château du Portail, — Pacages à Trécy.

Cne de St-Julien : Pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.

Cne de Noyers : Forêt de Gros-Bois et carrières de Belleroche, C.

DELPHINIUM consolida L. Juillet-août.
Moissons des terrains qui ne sont pas purement sablonneux. C.C. dans les communes de Maray, St-Julien, St-Loup.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

THALICTRUM *expansum* Jord. Environs de Blois, A.B. (M. Moreau.)

—— *majus* Jacq. Avaray, A.B. (M. E. Roger.)

HELLEBORUS *viridis* L. Rochambeau, A.V. (M. Nouel.)

ISOPYRUM *thalictroides* L. Environs de Vendôme, A.V. (M. Peltereau.)

PÆONIA *corallina* Retz. Naturalisé dans le parc des Montils, A.B., (Moi-même.)

BERBERIDEÆ Vent.

BERBERIS *vulgaris* L. De Muides à Saint-Dyé, A.B. (M. Roger.)

Digitized by Google

NYMPHEACEÆ Salisb.

NYMPHŒA alba L. Juin-août.
Etangs, eaux stagnantes, C.

NUPHAR luteum Smith. Juin-août.
Etangs, rivières, mares, C.

PAPAVERACEÆ Juss.

PAPAVER Rhœas L. Juin-juillet.
Moissons, C.C.

═══ **dubium** L. Mai-juin.
Moissons, C.

═══ **Argemone** L. Mai.
Moissons, champs sablonneux, C.

CHELIDONIUM majus L. Avril.
Vieux murs, haies, dans le voisinage des habitations, C.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

PAPAVER *hybridum* L. Cnes de Montoire et Thoré, A.V. (MM. Franchet et Nouel.)

GLAUCIUM *luteum* Scop. Levée de la Loire, A B. (Moi-même.)

Digitized by Google

FUMARIACEÆ d. c.

CORYDALIS solida Sm. Avril-mai.
Haies, bords des bois.

C^ne de Pruniers, 1° rive droite de la Sauldre : Pied des haies entre les Quatre-Rôues et Champleroy, — *entre Champleroy et les communs des Verrières, — entre le gué des Moulins-Neufs et le bourg de Pruniers ;* — 2° Rive gauche de la Sauldre : La Gascetière dans les haies d'un taillis et d'un pâtureau près la ferme.

FUMARIA borœi Jord. Juin.
Cultures, A.C.

C^ne de Romorantin : Trouvé une fois dans un champ de petits-pois au Petit-Chambord.

C^ne de Loreux : Abords de Migereau, R.R., — de Rosière, C.C., — de la Moutonnerie, P.C.

C^ne de Salbris : Culture à Montboulan et au Thou, A. C.

C^ne de La Ferté-Imbault : Cour d'entrée du château de La Ferté-Imbault.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Abords de la Brosse.

C^ne d'Orçay : Cultures près le bourg.

C^ne de Pierrefitte : Cultures à l'entrée du bourg.

Digitized by Google

FUMARIACEÆ

C^ne de Selles-S^t-Denis : Cultures à Bois-Méant, — jardins au bourg de Selles-S^t-Denis.

C^ne de S^t-Viâtre : Cultures au Grand-Cernéan.

C^ne de Neung-sur-Beuvron : Abords de Villemorand, R.

FUMARIA Bastardi Bor. Mai-juin-octobre.
Cultures, pied des haies, A.C.

C^ne de Romorantin : A.C., surtout dans les cultures de petits-pois.

C^ne de Lanthenay : Cultures aux Etangs.

C^ne de Villeherviers : Jardin potager du Portail.

C^ne de Langon : Jardin de Bois-au-Frère.

C^ne de La Ferté-Imbault : Jardin potager du château.

C^ne de S^t-Viâtre : Jardin du Grand-Cernéan.

Je l'ai trouvé en outre communes de Villefranche, — Gièvres, etc.

═══ **officinalis** L. Mai-juin.
Lieux cultivés, C.

Var. **media** (F. *media Lois.*) Juin.

C^ne de Romorantin : Jardin de ma maison.

C^ne de Mennetou : Culture de chanvre bordant la route entre Préjeux et Mennetou.

═══ **micrantha** Lag. *Densiflora*, D.C. Juin.
Lieux cultivés. R.R.

Digitized by Google

Cne de Romorantin : Cultures rue des Limousins et faubourg de Blois.

Cne de Pierrefitte : Jardins du bourg.

Cne de Selles-St-Denis : Ados de fossé de l'ancien chemin de Theillay entre les Anges et Grosaulne.

FUMARIA Vaillantii Lois. Mai-juin.
Cultures dans les terrains calcaires, R.R.

Cne de Selles-sur-Cher : Cultures au Bourgeau.

Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.

Cne de Gièvres : Terres calcaires des Calabres, — du Vivier.

Cne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière.

Cne de Noyers : Culture à la Croix-St-Martin.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

FUMARIA *capreolata* L. Montrichard, A.B. (M. Delaforge).
Var. *pallidiflora* Jord. Troô, A.V. (M. Franchet).
— *parviflora* Lam. Environs de Vendôme, A.V. (M. Franchet).

CRUCIFERÆ Juss.

RAPHANUS Raphanistrum L. Mai-juin.
Moissons, C.C.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

SINAPIS arvensis L. Mai-juin.

Varie à siliques glabres ou hérissées (S.*orientalis auct.*),C., mais seulement dans les terrains qui ne sont pas purement sablonneux.

═══ **cheiranthus** Koch. *(Brassica cheiranthus* Vill.*)* Mai-septembre.

Terres sablonneuses, C.C.

BRASSICA nigra Koch. *(Sinapis nigra* L.) Juin-septembre.

Environs des habitations, A.R.

C^né^ de Romorantin : Haies des environs du moulin des Garçonnets.

C^ne^ de Lanthenay : Abords des tuileries de la première arche bordant la route départementale n° 1 (route d'Orléans).

C^ne^ de Loreux : Derrière les bâtiments des Gasts.

C^ne^ de Pruniers : Abords du moulin des Quatre-Roues, — Jardin du Grand-Marmagne.

DIPLOTAXIS tenuifolia D.C. Septembre.

C^ne^ de Romorantin : *Pied de mur contigu au Grand-Jardin*, R.R.

═══ **viminea** D.C. Septembre.

Vignes, A.R.

Digitized by Google

Cne de Selles-sur-Cher : Vignes au bas de St-Eusice, — vignes à la Colinière, — vignes de la Thizardière au Nord du canal du Berry.

Cne de Billy : Vignes au Tertre-Blanc et au Pont-de-Sauldre.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Vignes au Pont-de-Sauldre.

CHEIRANTUS cheiri L. Avril-juin.
Vieux murs, A.C.

ERYSIMUM cheiranthoides L. Mai-août.
Lieux frais, cultures humides, P.C.

Cne de Villeherviers : Culture à la Chansonnerie.

Cne de Langon : Champ près la vieille rivière dans le val du Cher.

Cne de Villefranche : Jardins de l'Escourioux.

Cne de Gièvres : Val du Cher près Jaugy.

Cne d'Orçay : Jardins du bourg.

Cne de Theillay : Jardin près le chemin de fer.

perfoliatum Crantz.(E. *orientale R. Br.*)
Mai-juin.

Moissons des terrains calcaires. R.

Cne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

C^ne de Villefranche : Moissons calcaires de la Gaudinière (le Pérou).

C^ne de Gièvres : Moissons calcaires du Vivier.

BARBAREA vulgaris R. Br. Mai-juin.
Lieux frais, bords des eaux.

Varie à siliques dressées le long des rameaux. B. *stricta* Bor. B. *rivularis* de Mart.-Donos, C.

Varie à siliques étalées, R.R.

C^ne de Romorantin : Ile des Poulies et mur du Moulin de la ville arrosé par une roue.

SISYMBRIUM officinale L. Juin-septembre.
Décombres, bords des chemins dans le voisinage des habitations, C.

═══ **asperum** L. Mai-juin.
Lieux mouillés en hiver, R.R.

C^ne de Thésée : Vallée du Cher presque en regard de la vallée de Chantereine.

═══ **Alliaria** Scop. Avril-mai.
Haies, C.

═══ **Irio** L. Avril-mai.
Vieux murs, R.R.

C^ne de Romorantin : *L'un des piliers de l'ancien pont.*

C^ne de S^t-Julien : Ancien couvent d'Olivet dans un fossé au pied des murs.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

SISYMBRIUM Sophia L. Mai-septembre.

Décombres, jardins, voisinage des habitations, R.

Cne de Romorantin : Jardin de la rue du Lys, R.R.

Cne de Millançay : Abords des jardins dans le bourg.

Cne de Villeherviers : Château du Portail, R.R.

Cne de Soings : Abords d'une maison isolée dominant au nord le lac de Soings, C.

NASTURTIUM officinale R. Br. Mai-septemb.

Ruisseaux, fossés inondés, C.

Var. *siifolium.*

Cne de Maray : Ruisseaux à Daluet.

= **sylvestre** R. Br. Juin-septembre.

Grèves du Cher, jardins et vignes humides, C.C.

Var. **rivulare** (N. *Rivulare Reich.*)

Cne de St-Julien : Trouvé en 1854 sur les grèves du Cher près le pont de St-Julien.

Var. **anceps** (N. *Anceps* D.C.)

Cne de Villefranche : Bords du Cher à l'Escourioux.

Cne de St-Loup : Bords du Cher entre Sauveterre et St-Loup.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

ARABIS Sagittata D.C. Mai-juillet.

Pied des haies, prés. A.C. dans les vallées du Cher et de la Sauldre. Çà et là ailleurs.

═══ **hirsuta** Scop. Mai-juillet.

Murs, bois, pied des haies. R.R.

Cne de Pierrefitte : Pied d'une haie près le moulin Sarrazin.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche et bois environnant.

Cne de Thésée : Murs près le moulin de Chantereine.

═══ **perfoliata** Lam. (*Turritis glabra* L.) Mai-juillet.

Bois, bords des haies, A.C.

Cne de Lanthenay : Haie de jardin à Queue-de-Loup.

Cne de Loreux : La Moutonnerie, près les bâtiments.

Cne de Pruniers : Haie bordant le chemin de Pruniers entre les Beaunes et le ruisseau de Longueville, — Haie du chemin des Brezolles au pont de Pruniers.

Cne de St-Julien : Bois de la côte du Cher bordant le chemin de Saint-Loup.

Cne de Villefranche : Bois entre l'Escourioux et Ste-Marthe.

Digitized by Google

C^ne de Selles-sur-Cher : Bois près les Nouïes bordant la route des Nouïes à Selles.

C^ne de Gièvres : Bois près le bourg bordant la route de Gièvres à Selles.

C^ne de Neung : Bords d'une chambre d'emprunt près le pont d'Avignon.

C^ne de la Ferté-S^t-Cyr : Bords du chemin de la Ferté-S^t-Cyr à Crouy.

ARABIS Thaliana L. Avril-juillet.
Champs, jardins, C.C.

CARDAMINE pratensis L. Mai-juin.
Prés, fossés, bords des eaux, C.C.

Var. *dentata* Reich. Trouvée en 1857 aux bords du canal du Berry près l'Escourioux, commune de Villefranche.

═══ **impatiens** L. Mai-juin.
Lieux ombragés des bords du Cher et de la Sauldre, A.R.

C^ne de Romorantin : Iles de la Sauldre à Mousseaux, aux Poulies, au moulin des Bruyères.

C^ne de Lanthenay : Presqu'île à Longuevalle.

C^ne de S^t-Loup : Parties basses des bois de la côte du Cher entre Sauveterre et S^t-Loup.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

CARDAMINE hirsuta L. Mars-mai, reparaît parfois au commencement de l'automne.
Pied des haies, val des rivières, vignes et jardins humides, C.C.

Je l'ai observé notamment communes de Romorantin, Lanthenay, Millançay, Pruniers, Vernou, Villeherviers, — St-Julien, Villefranche, — Gièvres, Langon, etc.

Je le trouve à Olivet, commune de St-Julien, avec cinq étamines et une tige assez feuillée. Intermédiaire entre le C. *hirsuta* et le C. *sylvatica*.

parviflora L. Mai-juin.
Prairies et bas-fonds humides, P.C.

Cne de Loreux : à Migereau dans des terrains marécageux bordant la route.

Cne de Pruniers : Bas-fonds d'une prairie de la rive gauche de la Sauldre près la Berrerie, R.R.

Cne de Villeherviers : Prairie humide du chemin de la Fringale près le Riau-Mabon.

Cne de Villefranche : Pré de la Lavanderie bordant la route de Nevers à Tours, — *Bas-fonds d'un pâtureau de la Lavanderie dans le val du Cher.*

Cne de Gièvres : Pied d'une haie longeant à l'Est l'ancien chemin de Gièvres à Chabris au Sud et à quelques centaines de mètres d'une mare bordant ce chemin, — Prairie

Digitized by Google

bordant à l'Ouest la route de Romorantin à Chabris dans un bas-fonds dénudé simulant un ancien fossé près le pont de la route, le premier au-dessous de la Grange de Rère, R.

C^ne de Selles-St-Denis : Environs du canal d'irrigation de Migereau dans les parties humides et ombragées immédiatement au-dessus de la prairie, — mares du val de Rère près et à l'Est de la Bronse.

ALYSSUM calycinum L. Mai-juin.
Terres calcaires et terres sablonneuses voisines du calcaire, P.C.

C^ne de Pruniers : Talus de fossé à l'embranchement de deux chemins près et à l'Ouest du bourg, — terres de la Gascetière et de la Maison-Blanche, — bords de l'allée des Quatre-Roues à la Maison-Blanche.

C^ne de Gièvres : Chemin de la Loge en arrivant aux terrains calcaires.

C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.

C^ne de Soings : Coteaux au Nord du lac.

DRABA muralis L. Avril-mai.
Broussailles, pied des haies, R.R.

C^ne de Gièvres : *Le haut du pâtureau de Jaugy, — haies de vignes près Jaugy,* — haie méridionale d'un bois de

Digitized by Google

pins longeant la route de Villefranche à Gièvres un peu avant Jaugy, C.C.— Partie méridionale d'un pacage au Chesné, R.R.

DRABA verna L. Mars-avril.

Murs, chemins, lieux sablonneux, secs et découverts, C.C.

Var. *brachicarpa*.

Cne de Villefranche : Mur et pied du mur du canal à la Commanderie, R.R.

Var. *stenocarpa*, C.

Var. *majuscula*, C.

Var. *stenopetala*, C.

RORIPA nasturtioides Spach. (*Nasturtium palustre*, D.C.) Bords des étangs et rivières. Lieux humides, C.

Cne de Romorantin : *Bords de l'étang des Monteaux.*

Cne de Lanthenay : Bords des étangs de la Babinerie, de Courmin, de la Flandrinière.

Cne de Loreux : Bords de l'étang d'En Haut.

Cne de Pruniers : Ruisseau du Grand-Village, — bords de l'étang de la Châtre.

Cne de Villefranche : Bords du Cher.

Cne de Soings : Bords du lac.

Je l'ai trouvé en outre communes de Maray, Selles-sur-Cher.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

RORIPA pyrenaica Spach. (*Nasturtium pyrenaicum Brown*).

Bords gazonnés des chemins et sentiers, prairies, C.C.

Je l'ai trouvé notamment communes de Romorantin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Villeherviers,— Langon, St-Julien, St-Loup, Villefranche, — La Ferté-Imbault, Selles-St-Denis, — Selles-sur-Cher, Gièvres.

amphibia Bess. (*Nasturtium amphibium Br.*) Mai-juin.

Bords des eaux, fossés inondés, mares, étangs, C.C.

MYAGRUM perfoliatum L. Mai-juillet.

Moissons des terrains calcaires, A.R.

Cne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière, A.R., de la Maison-Blanche, R.R.

Cne de Villefranche : Ancien pâtureau de Ste-Marthe, R., — terres du Pérou près la Gaudinière, C.

Cne de Selles-sur-Cher : Moissons bordant la route nationale no 156, au Sud d'une taille.

Cne de Gièvres : Champs des Calabres, R.R. — moissons du Vivier, C.

Cne de Châteauvieux : Moissons de Péquignon.

Cne de Thésée : Moissons du val du Cher presque vis-à-vis la vallée de Chantereine.

CAMELINA fœtida Fries (C. *dentata Pers.*) Juin.

Champs de lin, R.R.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : *Champ de lin à la Cornuère.*

Cne de Selles-St-Denis : Champ de lin au bourg de Selles-St-Denis.

NESLIA paniculata Desv. Juin.

Moissons calcaires, R.R.

Cne de Pruniers : Moissons calcaires de la Maison-Blanche, R.R.

Cne de Selles-sur-Cher : Moissons calcaires bordant la route nationale no 156, au Sud d'une taille traversée par le chemin de fer.

Cne de Gièvres : Moissons calcaires des Calabres, R.R., — moissons calcaires du Vivier, R.

Cne de Thésée : Moissons du val du Cher presque vis-à-vis la vallée de Chantereine, R.R.

TEESDALIA nudicaulis R. Br. (T. *Iberis*, D.C.) Avril-mai.

Bords des chemins sablonneux, fossés, terres incultes, C.C.

THLASPI arvense L. Mai.

Vignes, lieux cultivés, A.C.

Cne de Romorantin : Les Crottés.

═══ **perfoliatum** L. Avril.

Vignes et champs argileux et calcaires des environs de Romorantin, A.C.

Cne de Lanthenay : Vignes des Etrangle-Chiens, des Verdons, de la Dabinerie.

Digitized by Google

CRUCIFERÆ

THLASPI Bursa-pastoris L. (*Capsella bursa-pastoris Mœnch.*) Avril-mai.

Lieux cultivés, vignes, C.C.

Var. **rubellum** (*Capsella rubella Reut.*) A.C. dans la vallée du Cher, R.R. ailleurs.

Cne de Pruniers : Allée des Quatre-Roues à la Maison-Blanche, R.

Cne de Langon : Chemin descendant des Tréchis à la route nationale no 76.

Cne de St-Julien : Levée du pont sur le Cher, — Bords du chemin de St-Julien à St-Loup.

Cne de St-Loup : Bords du chemin de St-Julien à St-Loup près Sauveterre.

Cne de Villefranche : Bords du Cher à l'Escourioux, à Villebrette, etc.

Cne de Gièvres : Chemin de la Loge, — le haut du pâtureau de Jaugy.

LEPIDIUM campestre R. Br. Mai-juin.

Bords des chemins et des champs. C. dans le val du Cher et de la Sauldre. Çà et là ailleurs.

═══ **graminifolium** L. Juillet-août.

Bords des chemins, R.R.

Le haut Mail à Romorantin d'où les cantonniers l'ont fait disparaître.

═══ **latifolium** L. Août-septembre.

Spontanéité très-douteuse.

Haies, terrains humides, R.R.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Haies du jardin du Grand-Marmagne, haie de la cour de la ferme de Longueville.

Cne de Villefranche : Cour et jardin de Montauger des deux côtés de la haie.

Cne de Gy : Haie du jardin de Piedsauvron.

SENEBIERA Coronopus L. Juillet-octobre.

A.C. dans les terrains calcaires des environs de Romorantin.

Cne de Lanthenay : Chemin des Petits-Guideaux.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

BARBAREA *patula Fries*, entre Onzain et Seillac, A.B. (M. Moreau).

CARDAMINE *amara* L. Le Loir, près Vendôme, A.V. (MM. Franchet & L. Legué).

CARDAMINE *sylvatica* Link. Mondoubleau, A.V. (M. L. Legué).

DIPLOTAXIS *muralis* D.C. Montrichard, A.B. (Moi-même).

IBERIS *amara* L. Avaray A.B. (M. E. Roger).

LEPIDIUM *Smithii* Hook. Mondoubleau, A.V. (M. L.Legué).

ISATIS *tinctoria* L. naturalisé à Troô et environs, A.V. (Moi-même).

NOTA. — M. Franchet considère le *Lunaria biennis* comme naturalisé dans le parc des Montils près Blois.

Le *Cochlearia armoracia* L. croissait autrefois au bord d'une fosse dans la prairie

Digitized by Google

de Bois-Méan (Cne de Selles-St-Denis). La fosse a été comblée, le *C. armoracia* a disparu. Je suppose qu'il y avait été introduit.

Le *lepidium sativum* et le *sinapis alba* sont rarement cultivés en grand dans les environs de Romorantin.

NOTA. — J'ai trouvé une fois dans ma cour le *lepidium ruderale* provenant vraisemblablement de graines de mon herbier.

CISTI Juss.

CISTUS umbellatus L. Mai-Juin.
Landes, lisières de bois de pins.

Cne de Salbris : Lisière de bois bordant le chemin de Falaze à la Reboutinière près la route départementale no 11 de Salbris à Souesmes.

Cne de Pierrefitte : Landes entre le pont des Alicourts sur la Sauldre et celui de Cerbois sur la Boute-Vive.

Cne de Souesmes : *Toute l'étendue des landes bordant la route de Salbris à Souesmes entre les bornes 34 et 35.*

Cne de Gy : *Bruyères de Boureau et* lisière de bois de pins contigus.

alissoides Lam. Mai-Juillet.
Landes, lisières de bois de pins.

Digitized by Google

CISTI

C^ne de Nouan-le-Fuzelier : Landes traversées par la route de Pierrefitte à Nouan.

C^ne de Salbris : Lisière de bois bordant le chemin de Falaze à la Reboutinière près la route départementale n° 11, — Bruyère sise à 3 kilom. environ au Nord de Salbris longeant le chemin de fer et traversée par la grande route de Toulouse, — *Bords du chemin de fer du Centre du pont de Salbris à la borne 55.*

C^ne de Pierrefitte : Landes traversées par la route de Pierrefitte à Nouan-le-Fuzelier, — Landes et lisières de pins entre le pont des Alicourts sur la Sauldre et le pont de Cerbois sur la Boute-Vive, C., — landes bordant le val de la Boute-Vive, C.C.

C^ne de Souesmes : Landes et restes de landes bordant la route départementale n° 11 surtout entre les bornes 33 et 34, — landes des bords du Reau, — landes bordant le chemin de Souesmes au bois du Grand-Clos. Du côté de la Poulardière et de la Passerie il forme presque la base de la végétation, C.C.

C^ne de Gy : *Landes de Chênemoireau, — de Boureau.*

Digitized by Google

HELIANTHEMUM vulgare Gœrtn. Mai-juillet.
Prés secs, bords gazonnés des chemins, talus gazonnés des fossés, C. mais seulement là où le terrain n'est pas complètement sablonneux.

═══ **guttatum** Mill. Juin-octobre.
Terrains sablonneux et incultes, C.C.

FUMANA procumbens G.G. Mai-juillet.
Pelouses sèches et calcaires.
C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, R.R.
C^ne de Châteauvieux : Pentes arides à Péquignon, R.R.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche, R.R.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

HELIANTHEMUM *polifolium* D.C. (H. *pulverulentum* D.C.)
Avaray, moulin de S^t-Gervais, A.B. (M. Roger).
HELIANTHEMUM *canum*, moulin de S^t-Gervais, A.B. (MM. Roger et Moreau).

VIOLARIEÆ D.C.

VIOLA hirta L. Mars-juin.
Haies, prés, pâtureaux, bois, C.C.

═══ **odorata** L. Mars-avril.
Haies, prés, lieux frais, C.C.

═══ **sylvatica** Fries. Avril-mai.
Haies, prés, bois.
Var. **riviana** Reich, C.C.

Digitized by Google

Var. **sylvestris** Reich. *(Viola Reichenbachiana Jord.)*

C^ne de Pruniers : Pâtureau de Marmagne C., — pâtureau aux Bresolles.

C^ne de Villefranche : Prairie du val du Cher à l'Escourioux.

C^ne de Souesmes : Val de la petite Sauldre près le moulin de la Fosse-aux-Loups.

C^ne de Gièvres : Prairie du val du Cher près la route de Gièvres à Chabris.

VIOLA lancifolia Thore. Mai-juin.

Bruyères, landes et semis de pins.

C^ne de Millançay : Bruyères contiguës au pâtureau de la Martière et à un étang bordant la route de Millançay à Montrieux, R.R.

C^ne de Pruniers : Terre et bruyère de la rive gauche de l'étang de Bâtarde au Sud des gardoirs, R., — *bruyères du Chesnay bordant la route de Romorantin à Lassay,* R.

C^ne de Villeherviers : *Bords de la route de Romorantin à Theillay entre les bornes 9 et 10* R.R.,— entre les grandes marnières des Roches et la Chalanière sur les bords des fossés échappés à la culture, R.R.

C^nes de La Chapelle-Montmartin et S^t-Julien-sur-Cher : Talus des fossés des deux côtés de la route de S^t-Julien à Graçay entre les bornes 5 et 6, C.

Digitized by Google

Cne de Langon : *Val de la Rère au bas et à l'Est de Bruleteau,* A.R.

VIOLA canina L. Mal-juin.

Landes et bruyères, talus gazonnés des fossés, bord des bois, C.C.

Je l'ai trouvé à pétales bleu-clair et bleu-foncé, à feuilles courtes et allongées, à stipules plus ou moins foliacées. N'y a-t-il pas des espèces distinctes confondues sous ce nom ?

═══ **pumila** Vill. Mai. (V. *pratensis Koch.)*

Cne de Thésée : Fossés et talus de fossés dans le val du Cher presque vis-à-vis la vallée de Chantereine, R.R.

═══ **stricta** Hornem. Mai.

Cne de Thésée : Prairie du val du Cher au Sud-Est et à 5 ou 600 mètres du moulin de Chantereine, R.R.

═══ **stagnina** Kit. Mai-juin.

Grèves, talus de fossés, R.R.

Cne de Selles-St-Denis : Bas-côtés de la route de Selles-St-Denis à Mennetou et parties dénudées de la prairie bordant le fossé de la route dans la vallée de la petite Rère, R.R.

Cne de Langon : Cururés de la petite Rère au bas du pont de la route de Selles-Saint-Denis à Mennetou, — Cururés de la Rère vis-à-vis le pâtureau de Bourdaloue, R.R.

Digitized by Google

VIOLA tricolor L. Mai-juin.
Moissons et bords des champs, C.
Je ne suis pas à même de distinguer les diverses formes dont MM. Jordan et Boreau ont fait de nombreuses espèces.

RESEDACEÆ D.C.

RESEDA lutea L. Mai-août.
Terres incultes et calcaires, A.R.
Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche et de la Gascetière.
Cne de Selles-sur-Cher : Bords des chemins calcaires.
Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.
Cne de Châtillon-sur-Cher : La Cave.
Cne de Châteauvieux : Péquignon.

Luteola L. Mai-juin.
Décombres, bords des chemins, voisinage des habitations, C.

ASTEROCARPUS Clusii Gay. Mai-septembre.
Champs sablonneux et arides, bords des bois de pins et des chemins sablonneux, C.C.

DROSERACEÆ D.C.

DROSERA rotundifolia L. Juillet-septembre.
Terrains spongieux, C.

Digitized by Google

Cne de Millançay : Fondrières et marécages au-dessous de l'étang de la Meunerie.

Cne de Pruniers : Marécages bordant la route départementale no 1 entre Beauvais et les Quatre-Roues, — bords de l'étang de Bâtarde.

Cne de Veilleins : Terrains spongieux entourant l'étang de Bordebure, — Terrains spongieux à la Roche, — bruyères spongieuses au Nord de Tréfontaine.

Cne de Salbris : Parties spongieuses des bruyères des Rougerins.

Cne de Pierrefitte : Écoulements spongieux bordant la Boute-Vive, C.C.

Cne de St-Viâtre : Marais à la queue de l'étang de Favelle sur les Sphagnum.

Cne de Souesmes : Écoulements spongieux bordant le Reau, C., — idem bordant la petite Sauldre, C.C.

Cne de Gy : Bords des marais dans les landes de Chènemoireau.

Je l'ai trouvé en outre notamment : Cnes de Nouan, — Dhuizon, — La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, Theillay, — Gièvres, Mur.

DROSERA intermedia Hayn. Juin-septembre. Terrains spongieux, C.C.

Dans les mêmes localités que le *Drosera rotundifolia* L., et en outre :

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Bords d'un marais entre les étangs de Courmin et de Nobière.

C^ne de Millançay : Fondrières au Nord-Est de l'étang de Malzonné.

C^ne de Villeherviers : Bruyères humides de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail.

C^ne de Montrieux : Bords de l'étang de la Gautellerie.

C^ne de Gièvres : Écoulements spongieux aux Petits-Étangs.

C^nes de Langon, — Selles-S^t-Denis.

PARNASSIA palustris L. Juillet-août.

Prairies tourbeuses, A.R.

C^ne de Romorantin : *Parties humides et tourbeuses des bruyères des Monteaux.*

C^ne de Pruniers : *Pré des Verrières.*

C^ne de Villeherviers : Pré tourbeux de la Sauldre au-dessus et au-dessous du pont de Villeherviers jusqu'au confluent du Riau-Mabon.

POLYGALEÆ Juss.

POLYGALA vulgaris L. Avril-juin.

Prés, pelouses, C.

Var. V. **Lejeunii** (P. *Lejeunii Bor.*) Juin.

Pelouses calcaires, R.R.

Digitized by Google

C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

POLYGALA calcarea Schultz. Avril-juin.
Pelouses des terrains calcaires, A.C.
C^ne de Romorantin : Prés et pacages aux Arrogantes, — bords de la route de Romorantin à Villefranche vers la borne 43.
C^ne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche.
C^ne de Villefranche : Prés de la Demanchère, *Pâtureau de Montauger*.
C^ne de Langon : Vallée de la petite Rère (rive gauche) près la route de Selles-St-Denis à Mennetou.

═══ **depressa** Wend. Avril-juin.
Bruyères et landes, C.
Toutes les espèces ci-dessus varient à fleurs bleues, roses ou blanches.

Autre espèce du département.

POLYGALA *comosa* Schkuhr. C^ne de Cellettes, A.B., (M. Franchet).

SILENEÆ D.C.

CUCUBALUS baccifer L. Juillet-août.
Haies, A.C., dans les haies des environs de Romorantin, notamment :
C^ne de Romorantin : Haie du chemin du Liot.

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Haie du Chemin-Creux allant de la Fontaine-des-Crevées à la route de Loreux.

C^ne de Pruniers : Haie du pâtureau des Bresolles.

C^ne de Gièvres : Haie du val du Cher entre l'Escourioux et Jaugy.

SILENE inflata Sm. L. Mai-juin-juillet.

C., Moissons, champs, lieux pierreux.

Var. **puberula** (S. *puberula Jord.*)

C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc, R.

C^ne de Gièvres : Champs calcaires des Calabres, R.

conica L. Juin.

Bords des chemins sablonneux voisins du calcaire et champs calcaires, A.R.

C^ne de Pruniers : Bords du chemin des Quatre-Roues à la Gascetière, R.R., — idem à la Maison-Blanche, R.R.

C^ne de Soings : Chemin contigu à la source de la Croisne, P.C., — abords du bourg de Soings, A.C.

C^ne de Noyers : Bords de la route entre la gare et les carrières de Belleroche.

gallica L. Juin-juillet.

Moissons, cultures, A.C.

C^ne de Romorantin : Moissons à S^t-Lazare, — Moissons dans la partie humide de l'ancien étang de Beauvais contiguë au bois.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Chemin de Béjarie, — idem du Portail à Forêts, — champs de Balletan.

Cne de Villefranche : Moissons du val du Cher.

Cne de la Chapelle-Montmartin : Moissons bordant le chemin de la Chapelle à Saint-Julien.

Cne de Selles-St-Denis : Moissons aux Anges.

Cne de Soings : Moissons bordant la route de Mur à Soings.

Je l'ai trouvé encore Cnes de Lanthenay, — Langon, St-Julien, — Gièvres, Mur.

SILENE Armeria L. Juin-août.

Clairières de bois, pelouses, champs incultes, moissons A.R.

Cne de Pruniers : Terre des Verrières bordant au Sud le chemin de Romorantin à Pruniers.

Cne de Villefranche : *Champ bordant au Nord la route de Nevers à Tours à la montée en sortant de Villefranche.*

Cne de Selles-sur-Cher : Bois bordant près et à l'Est des Nouïes la route de Gièvres à Selles-sur-Cher.

Cne de Billy : Moissons bordant la route nationale 76.

Cne de Gièvres : Clairière entre le canal et la route à l'entrée des bois des Nouïes en venant de Villedieu, — Abords de la gare de Gièvres.

Digitized by Google

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Moissons bordant la route nationale n° 76.

SILENE nutans L. Juin.
Bruyères, bords des bois.
C^ne de Villeherviers : Parc du Portail, — Bruyères de Bruleteau, — bords d'un bois à la Gaillardière.
C^ne de la Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines, — partie méridionale d'un pâtureau à l'Est du Frotier.
C^ne de la Ferté-S^t-Cyr : Bois entre Crouy et la Ferté-S^t-Cyr, C.
C^ne de Selles-sur-Cher : Bois bordant la route de Blois entre Selles et la vallée de la Sauldre, — bords du canal du Berry entre le pont de la Thizardière et le pont-canal, C.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Le haut du bois de la Caye.

= **pratensis** Gr. God. *(Lychnis vespertina Sibth.)* Mai-juin-juillet.
Haies, bords des chemins, champs incultes, C.C.

LYCHNIS flos-cuculli L. Mai-juin.
Prés, C.C.

AGROSTEMMA Githago Lam. Mai-juin.
Moissons, C.C.

SAPONARIA officinalis L. Juillet-août.
Bords de la Sauldre et du Cher, C.

Digitized by Google

SILENEÆ

GYPSOPHILA vaccaria Sibth. (*Saponaria vaccaria* L.) Juin-juillet.
Moissons des terrains calcaires, R.
C^ne^ de Billy : Moissons calcaires, R.
C^ne^ de Gièvres : Moissons au bas du pâtureau de la Grange de Rère C., mais accidentel.
C^ne^ de Lanthenay : Avoine à la Lambinière C., mais accidentel.
C^ne^ de Noyers : Moissons près le bourg.

═══ **muralis** L. Juillet-août.
Champs sablonneux humides, bords des étangs, C.

DIANTHUS prolifer L. Juillet-septembre.
Talus de fossés, lieux secs et sablonneux, C.C.

═══ **Armeria** L. Juin-août.
Pelouses, bois, pâturages, C.

═══ **Carthusianorum** L. Juillet-octobre.
Pentes herbeuses, R.
C^ne^ de Pruniers : Berges de la Sauldre (rive gauche) vis-à-vis Champleroy et aux bords du chemin entre les Bresolles et le pont de Pruniers.
C^ne^ de Selles-sur-Cher : Berges du canal du Berry entre le pont de la Thizardière et le pont-canal.

═══ **Caryophyllus** L. Juillet-août.
Murs en ruine.

Digitized by Google

C^ne de Mennetou : Reste de fortification bordant la route de Châtres à la sortie de Mennetou, R.R.

Autre Espèce de Loir-et-Cher.

VISCARIA *purpurea* Wimm. (Lychnis viscaria L.) les Ponts-Chartrains près Blois (A.B.). Cette espèce signalée par M. Lefrou n'a jamais été retrouvée depuis.

ALSINEÆ Bartl.

SAGINA procumbens L. Mai-septembre.
Champs et pelouses humides, bords des étangs sablonneux, C.

apetala L. Mai-septembre.
Pelouses, chemins, cours des maisons et rues peu fréquentées, C.

ciliata Fries. Mai-août.
Pelouses et terrains frais, A.R.

C^ne de Lanthenay : Chemin du Grand-Vauvert à Courmin, C.

C^ne de Gy : Pelouses bordant le chemin de Lassay près le moulin Tardieu (Lardilleux).

C^ne de Marcilly-en-Gault : Chambre d'emprunt bordant la route de Marcilly à Neung à 1 kilomètre de Marcilly.

NOTA. — J'ai trouvé le 12 Juillet 1864, dans les landes bordant la rive droite

Digitized by Google

des fondrières du Pavillon et sur un espace très-restreint, un *Sagina* qui me paraît être un hybride du *Sagina procumbens* dont il a le port et les tiges radicantes et du *Sagina subulata* dont il a la pubescence et qu'il rappelle en partie. M. Boreau lui a donné le nom de *Sagina micrantha*. Je l'ai vainement cherché depuis.

SAGINA subulata Wimm. Mai-septembre. Champs, pelouses sablonneuses et fraîches, fossés, C.C. dans les années humides.

C^ne^ de Romorantin : *Bords de l'étang des Monteaux,* — bords du chemin de la Fringale.

C^ne^ de Pruniers : Allée de Longueville, — allée de la Cornuère.

C^ne^ de Veilleins : Chemin de Veilleins au château de Montgiron.

C^ne^ de Gièvres : Semis de pins aux bords du marais de Villefondue.

C^ne^ de Gy : Terre dans la région du marais de la rive droite de la Croisne près le bourg de Gy, — cultures à l'entrée des bruyères de Chênemoireau, etc.

C^ne^ de Lassay : Terre bordant le chemin de Lassay près les limites de Pruniers, — terre et fossés bordant le même chemin un peu avant l'étang Paris, etc.

C^ne^ de Mennetou : Terre entre les marnières de la Blatière et l'étang de Veillère.

Je l'ai trouvé en outre notamment : C^nes^ de Courmemin, Loreux, Villeherviers, —

Digitized by Google

Marcilly-en-Gault, Selles-St-Denis, Saint-Viâtre, — Mur, Rougeou.

ALSINE tenuifolia Crantz. Mai-juin.
Champs sablonneux, murs, C.

MŒHRINGIA trinervia Clairv. (*Arenaria trinervia* L.) Mai.
Haies et bois ombragés, C.

ARENARIA Montana L. Mai-juin.
Ajoncs, landes et bruyères, C., ainsi :

C^ne^ de Romorantin : Côte de Piégu, — bruyères des Monteaux. Ces deux localités ont été défrichées et l'*Arenaria* ne s'y trouve plus si ce n'est aux bords des chemins.

C^ne^ de Lanthenay : Tailles du Lieu.

C^ne^ de Pruniers : Côte de la Gascetière entre Beauvais et les Quatre-Roues, — bords de l'ancien étang Facy, — bruyères de Longueville, — haie du chemin de Pruniers entre les Guéraides et les Bardineaux, — bords du chemin de Chênemoireau entre l'écoulement de l'ancien étang Facy et la Robinière, etc.

C^ne^ de Villeherviers : Extrémité orientale du parc du Portail et bruyères à l'Est de ce parc, — bords du fossé en arrivant à Colombier.

Digitized by Google

Cne de Langon : Bords du chemin entre le Liot et Bois-au-Frère, — abords de Bois-au-Frère.

Cne de Villefranche : Landes bordant la route de Nevers à Tours entre la Lavanderie et la Parconière.

Cne de Salbris : Bords de la route de Salbris à Souesmes, — bruyères bordant le chemin de fer au Nord et à 3 kilomètres environ de Salbris.

Cne de Selles-St-Denis : Bords du chemin de Veur à Selles-St-Denis.

Cne de Souesmes : Bords de la route de Souesmes à Salbris où je l'ai trouvé à pétales plus petits que les sépales.

Cne de Gy : Landes de Chênemoireau, — idem de Boureau.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Le haut du bois de la Cave.

Cne de Noyers : Autour des carrières de Belleroche, et encore Cnes de Nouan, Pierrefitte, — Lassay, Mur.

ARENARIA serpyllifolia L. Mai-juin.
Terrains sablonneux, murs, C.

Var. **leptoclados** *(Arenaria leptoclados Guss.)*.

Cne de Gy : Champs incultes dans la région des Marais de la rive droite de la Croisne.

Digitized by Google

ALSINEÆ

STELLARIA media Vill. Printemps et automne.
Pelouses, cultures, C.C.

Var. **apetala** *(St apetala Bor.)*.
Pelouses sèches, pied des murs.
C^ne^ de Romorantin : Bords du chemin de la Fringale, — pied du mur de l'hospice longeant le chemin de Pruniers.
C^ne^ de Pruniers : Pied du mur des Beaunes longeant le chemin de Pruniers.
C^ne^ de Gièvres : Terre à la Berrerie bordant le chemin de Pruniers.

Var. **neglecta** Weih.
Lieux ombragés, humides.
C^ne^ de Romorantin : Mur de ville près la Porte-aux-Dames.
C^ne^ de Gièvres : Talus d'un fossé près la fontaine de l'Erabe.

holostea L. Avril-Mai.
Haies, buissons, C.C.

glauca With. Mai-juin.
Lieux marécageux, prés humides, R.
C^ne^ de Villeherviers : Petite mare de la rive gauche de la Sauldre près le pont de Moulin-Neuf, R.R., — prés de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail, R.R., — fossés séparant ces prés de la bruyère, R.R.
C^ne^ de Villefranche : Pré de la Lavanderie bordant la route de Nevers à Tours.

Digitized by Google

ALSINEÆ

C^ne de Gy : Marais de la rive droite de la Croisne et notamment C.C. auprès de deux de ces marais voisins de la Pichonière et appelés les Petits-Étangs.

STELLARIA graminea L. Mai-juin.

Prés, haies, buissons, C.

═══ **uliginosa** Murr. Juin.

Lieux marécageux, R.

C^nes de Neung et de Montrieux : Bords du ruisseau séparant les deux communes à Villemorand, C.

C^ne de Souesmes : Bords d'un marais au Sud de Falaze, — écoulements spongieux entre deux bras de la petite Sauldre aux environs de Many.

HOLOSTEUM umbellatum L. Mars-avril.

Vignes, champs et fossés sablonneux, C. notamment :

C^ne de Lanthenay : Vignes près la Lambinière, etc.

C^ne de Pruniers : Bords du chemin de Pruniers près les Beaunes, etc.

C^ne de Villefranche : Jardin de la Commanderie, etc.

C^ne de Gièvres : Près le pont de Chabris.

CERASTIUM quaternellum Fenzl. *(Mœnchia erecta Reich.)* Mai-juin.

Chemins gazonneux, pelouses, moissons, C. — très-rameux mais plus rare dans les terrains remués.

Digitized by Google

ALSINEÆ

CERASTIUM viscosum L. (C. *glomeratum Tuill.*) Avril-mai.
Lieux cultivés, champs, C.

═══ **brachypetalum** Desp. Mars-mai.
Vignes, cultures, talus des fossés, bords des chemins, A.C

C^ne^ de Romorantin : Rue du Lys et chemin des Petits-Guideaux dans la partie voisine de la rue du Lys,— terre et prés hauts dans les Crottés.

C^ne^ de Lanthenay : Vignes aux Grands-Guideaux, — id. aux Verdons, — bords du chemin aux Étangs, — terre à l'angle du chemin de la forêt et de celui de la Malicorne.

C^ne^ de Pruniers : Environs de la Maison-Blanche, — id. de la Cornuère.

C^ne^ de Villeherviers : Terre à l'Est et près de Chenon, etc.

C^ne^ de S^t^-Loup : Bords du chemin descendant au Roulier.

C^ne^ de S^t^-Julien : Pelouses près les carrières de Valette.

C^ne^ de Billy : Les parties hautes des prés bordant la Sauldre.

C^ne^ de Gièvres : Bords du chemin de Villefranche à Gièvres un peu avant l'allée de Jaugy.

═══ **semidecandrum** L. Mars-avril.
Terres au repos, pelouses, C.

Digitized by Google

ALSINEÆ

CERASTIUM glutinosum Fries. Mai-juin.
Ados de fossés, bords des pinières, terrains incultes et sablonneux, C.

═══ **vulgatum** L. *(Triviale Link.)*.
Champs, prés secs, murs, bords des chemins, C.

═══ **arvense** L. Fin avril-commencement de juin.
Bords des chemins, R.R.
Cne de Selles-St-Denis : Bords et pelouses de la route de Selles-St-Denis à Mennetou entre la ferme de la Bronse et le pont sur la petite Rère.

MALACHIUM aquaticum Fries. Juin-octobre.
A.C. sur les grèves du Cher, notamment :
Cnes de Langon, Villefranche, St-Julien, — Gièvres, Selles-sur-Cher; R. ailleurs.
Cne de Pruniers : Bords du ruisseau de Marmagne à son confluent, R.R.
Cne de Maray : Ruisseaux tourbeux à Daluet, C.

SPERGULA arvensis L. Juin-octobre.
Moissons et champs sablonneux, C.C.
Var. **Sativa** *Boënn.* notamment :
Cne de Lanthenay : Sur les sables du chemin de Queue-de-Loup à Loreux.
Cne de Pruniers : Dans une terre à l'entrée du chemin allant des Bresolles au pont de Pruniers.

Digitized by Google

C^ne de Marcilly-en-Gault : Terre bordant la route près l'étang de la Madeleine.

SPERGULA pentandra L. Avril-mai.
Sables incultes, bords des pinières, talus maigres des fossés un peu gazonnés.

Morisonii Bor. Avril-mai.
Sables incultes, talus des fossés un peu gazonnés, A.R.

C^ne de Villefranche : Talus septentrional du fossé de la route entre S^te-Marthe et les pins de l'Escourioux.

C^ne de Gy : Lisières des bruyères de Boureau.

C^ne de Selles-S^t-Denis : Parc de Boisméan.

J'ai récolté le 2 juin 1870, dans une terre semée en pins longeant le chemin de Selles-S^t-Denis à Veur au Sud-Ouest de la ferme de Sauldre, une variété du *Spergula Morisonii* à poils pubescent-glanduleux. Je l'y ai vainement cherchée depuis.

SPERGULARIA segetalis Fenzl. Mai-juin.
Moissons des terrains sablonneux et frais, A.C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Pruniers : Moissons de la Cornuère, — Moissons bordant la partie basse du chemin entre les Bresolles et le Vivier.

C^ne de Villeherviers : Moissons dans les champs de Balletan.

Digitized by Google

Cne de Mennetou : Moissons de la rive gauche de l'étang de Veillère.

Cne de Gièvres : Moissons de Bois-Ribaut.

Je l'ai trouvé encore Cnes de Courmemin, — Langon, Maray, — Billy, Gy, Mur.

SPERGULARIA rubra Pers. Mai-septembre.
Lieux sablonneux, C.

Autre espèce du département de Loir-et-Cher.

SAGINA *nodosa* Fenzl. Pré à Fontaines, Cne de Pezou, A.V. (M. Nouel).

ELATINEÆ Camb.

ELATINE paludosa Seub. *(E. Hexandra* D.C.)
Juillet-septembre.
Bords des étangs à fonds sablonneux, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Romorantin : *Étang des Monteaux.*

Cne de Lanthenay : Étangs de Courmin, de Nobière, de la Flandrinière.

Cne de Loreux : Étangs d'En-Bas, Dernier ou Regnier, de Cantinet, de la Harpe.

Cne de Pruniers : Étang de la Châtre.

Cne de Veilleins : Étangs Fleuri, du Lièvre, de la Gravelle.

Cne de Villeherviers : Fosse à Queue-de-Loup.

Cne de La Marolle : Étang de Beaumont.

Cne de Marcilly-en-Gault : Étangs de Vérière, de Pointillon; dans ce dernier étang il y est d'une excessive abondance.

Digitized by Google

Cne de St-Viâtre : Étangs de Marcilly, du Vieux-Marmagne.

ELATINE alsinastrum L. Mai-septembre.

Bords des étangs, mares, fosses à fonds tout à la fois vaseux et sablonneux, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Lanthenay : Fossé d'écoulement à la queue de l'étang de Courmin.

Cne de Loreux : Étangs *des Gasts*, d'En-Bas, Dernier ou Regnier, — fosse à Migereau, — fossé longeant la route de Romorantin à Salbris vers la borne no 10, — gardoir entre l'étang de Masinière et l'étang d'En-Haut, — fosse aux Grandes-Maisons.

Cne de Millançay : Étangs de la Rapinerie.

Cne de Pruniers : Étang de la Pommerie.

Cne de Langon : Val du Cher au bas des Tréchis vis-à-vis Olivet.

Cne de Mur : Fosse dans une chambre d'emprunt bordant au Sud la route de Mur à Soings.

Cne de Lassay : Fosses à l'entrée du château du Moulin.

Cne de Marcilly-en-Gault : Étangs de l'Aunay, C.C., de Vérière, de Pointillon C.C. — de Courcelles, — mare à la Charmois, C.C.

Cne de St-Viâtre : Étangs de Marcilly, du Vieux-Marmagne.

Digitized by Google

LINEÆ D.C.

LINUM gallicum L. Juillet-septembre.

Terres au repos non sablonneuses, A.R.

C^ne^ de Langon : Val du Cher entre la Vieille-Rivière et le chemin du gué de Sauveterre.

C^ne^ de S^t^-Loup : Terres bordant la route entre Sauveterre et S^t^-Loup, plus particulièrement près les bois de la côte du Cher, A.C.

C^ne^ de Villefranche : Val du Cher dans une terre de S^te^-Marthe.

C^ne^ de Gy : Terre entre la Croisne et l'étang de Piedsauvron sur une étendue très-restreinte.

C^ne^ de Pouillé : Abords du grand ravin de Pemin.

═══ **tenuifolium** L. Juin-juillet.

Coteaux pierreux et calcaires, A.R.

C^ne^ de Billy : Talus de la route de Selles-sur-Cher à Blois près de l'embranchement de Selles à Billy, — terres incultes entre Billy et la route de Selles à Blois, — carrières du Tertre-Blanc.

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Environs de la Cave et du pont de Sauldre.

C^ne^ de Ségy : Pentes incultes.

═══ **salsoloides** Lam. (*L. Suffruticosum* G.G.) Mai-juillet.

Coteaux calcaires incultes.

C^ne^ de Noyers : Carrières de Belleroche, C.C.

Digitized by Google

LINUM usitatissimum L. Juin-septembre.
Çà et là parmi les avoines.

catharticum L. Mai-août.
Pacages, pelouses, pâtureaux, bois. C. dans les terrains qui ne sont pas absolument sablonneux.

RADIOLA linoides Gmel. Juin-octobre.
Bords des étangs sablonneux, fossés et chambres d'emprunt humides et sablonneux, C.

Autre Espèce de Loir-et-Cher.

LINUM *Alpinum* L. var. *collinum* (L. *Leonii Schultz*), Avaray, A.B. (M. E. Roger).

TILIACEÆ Juss.

Espèce de Loir-et-Cher.

TILIA *sylvestris* Desf. Bois du Verdelet à Avaray, A.B. (M. E. Roger).

MALVACEÆ Br.

MALVA moschata L. Juin-août.
Pacages et pâtureaux des bords du Cher et de la Sauldre, C. — Çà et là ailleurs.
Varie à feuilles toutes divisées en lanières étroites *(M. Laciniata Desv.)* et à feuilles inférieures réniformes crénelées.

Digitized by Google

MALVACEÆ

MALVA sylvestris L. Juin-août.
Bords des chemins, haies, lieux incultes, C.

═══ **rotundifolia** L. Mai-septembre.
Lieux incultes et bords des chemins dans le voisinage des habitations, C.

ALTHŒA officinalis L. Juillet-août.
Mares, prairies humides, P.C.
Çà et là sur les bords du Cher et de la Sauldre.
Cne de Pruniers : Anciennes fosses dans deux des pâtureaux de la Cornuère, C.
Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger*.
Cne de Selles-sur-Cher : Prés humides au bas du coteau d'Avray, C.

═══ **hirsuta** L. Juin-juillet.
Champs des terrains calcaires, A.R.
Cne de Lanthenay : Terres calcaires des Étrangle-Chiens, A.C.
Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière, de la Gascetière, de la Maison-Blanche, A.C.
Cne de St-Julien : Le pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent, R.R.
Cne de Billy : Environs du Tertre-Blanc.
Cne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy, du Vivier.
Cne de Châteauvieux : Péquignon.
Cne de Châtillon-sur-Cher : La Cave.

Autre Espèce de Loir-et-Cher.

MALVA *alcea* L. var. à feuilles lobées, Avaray, A.B. (M. Roger).

Digitized by Google

MALVA *alcea* L. var. à feuilles divisées jusqu'à la base entre Villavard et Lavardin, A.V. (M. Franchet).

— — var. à feuilles divisées n'atteignant pas la base. Saint-Laurent-des-Eaux, A.B. (M. Roger).

GERANIACEÆ D.C.

GERANIUM columbinum L. Mai-juillet.
Haies, bords des chemins, C.

dissectum L. Mai-juillet.
Haies, champs, principalement des terrains calcaires, C.

molle L. Avril-mai.
Bords des champs, places aux environs des fermes, C.

pusillum L. Avril-juin.
Pieds des murs et des haies, bords des chemins, C.

rotundifolium L. Mai-juin.
Bords des chemins, pieds des murs et des haies, C.

Robertianum L. Mars-juillet.
Haies, vieux murs, C.

Var. **minutiflorum** Jord.
Je l'ai trouvé notamment :
C^ne^ de Romorantin : Haies des Crottés.

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Chemin des Petits-Guideaux, haies du chemin de Loreux, etc.
C^ne de S^t-Loup : Haies du chemin de Mennetou à S^t-Loup.
C^ne de Thoury : Haies autour du bourg.
C^ne de Selles-S^t-Denis : Lieux ombragés près le canal d'irrigation de Migereau.

ERODIUM cicutarium L'her. Mars-juin.
Bords des chemins, murs, C.

= **chœrophyllum** D.C.
Champs, C.

= **Boræanum** Jord.
Val du Cher, val de la Sauldre, pelouses des lieux sablonneux, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Pelouses à Beauvais.
C^ne de Pruniers : Pelouses à la Gascetière, — pied du mur des Beaunes, — le Grand-Village.
C^ne de Langon : Pied des haies près le port Martin.
C^ne de S^t-Julien : Pelouses du chemin de S^t-Julien à Saint-Loup.
C^ne de Villefranche : Bords du Cher à l'Escourioux.
C^ne de Selles-sur-Cher : Bords de la route nationale 76 en arrivant au Bourgeau de Selles.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

GERANIUM *Pyrenaicum* L. Chambord, A.B. (Moi-même).

Digitized by Google

HYPERICINEÆ

GERANIUM *lucidum* L. Entre Vineuil et St-Gervais, A.B. (MM. Rimboux et Moreau).

HYPERICINEÆ D.C.

HYPERICUM perforatum L. Juin-août.
Lieux secs incultes, bords des chemins, bois, pâtures, C.

Var. **Lineolatum** Jord.
Cne de La Chapelle-Montmartin : Abords des Souches.
Cne de Langon : Terres et bois en regard des carrières des Tréchis.
Cne de Selles-St-Denis : Sables au bas de la route de Romorantin à Salbris en amont du pont sur la Sauldre.
Cne de Selles-sur-Cher : Rive gauche de la Sauldre vis-à-vis la cave.

Var. **microphyllum** Jord.
Cne de Billy : Le Tertre-Blanc.
Cne de Noyers : Carrières de Belle-roche.

tetrapterum Fries. Juin-août.
Bords des eaux, des marais surtout, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Villeherviers : Bords du Grand-Fossé, — îles de la Sauldre.
Et encore Cnes de Gièvres, de Pierrefitte.

Digitized by Google

HYPERICINEÆ

HYPERICUM humifusum L. Mai-juillet.
Sables humides, C.C.

═══ **Pulchrum** L. Juin-juillet.
Bruyères, lisières des bois, C.

═══ **hirsutum** L. Juillet.
Val de la Sauldre, val du Cher, lieux ombragés, bois, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Pruniers : Bords de la Sauldre près le bourg de Pruniers, — bords du ruisseau de Marmagne à son confluent.

C^ne^ de Villeherviers : Parc des Roches, — île de Trécy.

C^ne^ de S^t^-Julien : Bois au Sud et près d'Olivet.

C^ne^ de S^t^-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et S^t^-Loup, — bois près le Roulier.

C^ne^ de Villefranche : *Pâtureaux en amont de l'Escourioux.*

═══ **montanum** L. Juillet-août.
Bois montagneux calcaires.

C^ne^ de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche, R.R.

ELODES palustris Spach. Juin-septembre.
Bords des étangs, marais, fossés et lieux tourbeux, C.C.
Dans l'étang de Courcelle, commune de Marcilly, il est extra-abondant.

Digitized by Google

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

HYPERICUM *Linearifolium*, environs de Vendôme, A.V. (M. Nouel).

— *quadrangulum* L. Mondoubleau, A.V. (M. L..Legué).

— *androsæmum* L. Forêt de Blois et Cne de Souday, A.B.V. (MM. Mathonnet et Nouel.)

J'ai toujours vu l'*Hypericum hircinum* autour d'un petit marais dans le bois de la Ratière, commune de Romorantin, mais sa proximité des habitations me permet d'autant moins de l'y considérer comme naturalisé qu'il ne s'y propage pas.

ACERINEÆ D.C.

ACER campestre L. Mai-juillet.

Bois, haies, pâtureaux, C.

AMPELIDEÆ B.K.

VITIS vinifera L. Juin-Juillet.

Assez commun dans les haies du val du Cher et du val de la Sauldre.

Cultivé abondamment autour de Romorantin.

Digitized by Google

OXALIDEÆ D.C.

OXALIS acetosella L. Avril-mai.
Bois montueux et humides, R.R.
Cne de St-Loup : Partie basse du bois du Fondereau sur la rive droite du ruisseau de la Grange, vis-à-vis la ferme de la Grange.

= **stricta** L. Juin-septembre.
Cultures de la vallée du Cher, C., — environs de Romorantin, A.C.

Espèce de Loir-et-Cher à rechercher.

RUTACEÆ Juss.

RUTA *graveoleus*, L. Lunay, A.V. (M. Nouel).
Je doute que cette espèce soit spontanée en Loir-et-Cher.

CELASTRINEÆ R. Br.

EVONYMUS Europœus L. Mai-septembre.
Haies, pâtureaux, A.C.

ILICINEÆ Brong.

ILEX aquifolium L. Mai-octobre.
Haies, bois, buissons, pâtureaux, C.
A l'état d'arbre, ses feuilles sont ovales entières sans dents épineuses ; ainsi :

Digitized by Google

Cne de Loreux : Haie à Rosière, — la Pasterie.
Cne de Pierrefitte : Bois bordant la route vis-à-vis la Gravette.

RHAMNEÆ R.Br.

RHAMNUS cathartica L. Mai-septembre.
Bois, haies, pâtureaux, A.R.
Cne de Romorantin : Ile des Poulies, — bords de la Sauldre (rive gauche) en amont du pont de Longuevalle.
Cne de Pruniers : Bords de la Sauldre au bas du pré de la Cure.
Cne de Villeherviers : Haie à Trécy bordant la prairie, — haie d'un pâtureau à Forez, — bois à la Gaillardière.
Cne de Souesmes : Bois de la rive droite de la petite Sauldre près le moulin de la fosse aux Loups.

frangula L. Mai-septembre.
Bois et pâtureaux humides, C.

PAPILIONACEÆ L.

ULEX Europœus Sm. Décembre et 1er printemps.
Souvent semé en haie, généralement spontané dans les landes où il abonde, surtout dans les Cnes de Pruniers, Gy, Lassay.

Digitized by Google

PAPILIONACEÆ

ULEX nanus Sm. Septembre-octobre.
Landes et bruyères, C.C.

SAROTHAMNUS vulgaris Wimm. (*S. Scoparius Koch*). Mai-juillet.
C.C. Envahit toutes les terres incultes et siliceuses quand elles ont été remuées.

GENISTA sagittalis L. Mai-juillet.
Bois montueux.
C^ne^ de Noyers : Carrières de Belleroche et partie de la forêt de Grosbois y attenant.

═══ **pilosa** L. Mai-juillet, refleurit fin août-septembre.
Coteaux stériles, landes et bruyères, A.R.
C^ne^ de Romorantin : Côte de Piégu.
C^ne^ de Villeherviers : Landes en amont du parc du Portail, R.R.
C^ne^ de Langon : *Landes de Bois-au-Frère.*
C^ne^ de Salbris : Bords de la route de Salbris à Souesmes vers les limites de deux communes.
C^ne^ de Pierrefitte : Bords de la Boute-Vive vers le pont de Cerbois mêlé aux bruyères.
C^ne^ de Souesmes : Landes bordant le chemin qui va de Souesmes au bois du Grand-Clos.
C^ne^ de Gy : *Landes de Chênemoireau.*

═══ **tinctoria** L. Juillet.
Pâtureaux, prés, bois, bords des chemins, C.

═══ **anglica** L. Avril-juin.
Landes et bruyères, terrains incultes, C.C.

Digitized by Google

PAPILIONACEÆ

GENISTA germanica L. Mai-juillet.
Bois et bruyères calcaires.
C^ne de Romorantin : *Bruyères des Montéaux*, C. Le défrichement de ces vastes bruyères laisse à peine subsister quelques pieds sur le chemin qui les traverse.

NOTA. — Lors du défrichement de ces bruyères j'y ai récolté un pied complètement inerme.

C^ne de Pruniers : Bois de l'Abbaye.

ONONIS natrix L. Juillet-septembre.
Champs calcaires et pierreux, bords des chemins.
C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc, A.C.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Clairières du bois de la Cave, R.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche, — bords du chemin entre la croix S^t-Martin et les carrières de Belleroche, — bords du chemin de Noyers à Thésée.
C^ne de Thésée : Bords de la route de Thésée à Noyers.

═══ **procurrens** Wallr. *(O. arvensis Lam.)* Juin-septembre.
Champs, lieux stériles et sablonneux, C.

═══ **columnæ** All. Juin-juillet.
Coteaux pierreux et calcaires.
C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc dans deux endroits :

Digitized by Google

1° Dans la partie la plus orientale R.R.
2° Autour de trous abandonnés et herbeux, R.R.
C^ne de Châteauvieux : *Coteau de Péquignon.*

ANTHYLLIS vulneraria L. Juin-juillet.
Coteaux calcaires, bords des chemins, R.
C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc et bords de la grande route de Blois qui les traverse.
C^ne de Soings : Coteau dominant l'ancien chemin de Soings à Contres au Nord-Ouest du lac.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

MEDICAGO Lupulina L. Mai-octobre.
Champs, prés, bords des chemins, C.C.
Varie à légumes glabres ou velus.

═══ **falcata** L. Juin-septembre.
Prés secs, lieux stériles, plus commun dans les terrains calcaires; ainsi :
C^ne de Pruniers : La Maison-Blanche.
C^ne de Lanthenay : Le Lieu.
C^ne de Villefranche : Levée du canal du Berry.
C^ne de Billy : Champs calcaires.
C^ne de Gièvres : Levée du canal du Berry.
C^ne de Soings : Coteau au Nord du lac.

═══ **media** Pers. *(M. falcato-sativa Rchb.)*
Juin-juillet.
En société des *Medicago falcata* et *sativa.*

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Terres de la Maison-Blanche.

Cne de Gièvres : Champs calcaires des Calabres.

MEDICAGO sativa L. Juin-août.

Généralement cultivé; çà et là subspontané. Levées du canal du Berry, bords des chemins et des champs.

═══ **apiculata** Willd. Juin-septembre.

Bords des chemins, des moissons et des carrières.

Cne de Lanthenay : *Pelouses de la carrière Moureux bordant le chemin de Romorantin à Queue-de-Loup*, R.R.

Cne de Maray : Pelouses bordant les chemins et moissons à Sigonneau, à la Plaudière, à Daluet, à Grammont, A.C.

═══ **maculata** Willd. Mai-août.

Prés, pelouses, lieux herbeux, C.

═══ **minima** Lam. Mai-juin.

Pelouses, bords des chemins, champs au repos, A.C.

Cne de Romorantin : Pelouses à l'extrémité occidentale du Grand-Jardin.

Cne de Lanthenay : Pelouses bordant la rue Creuse.

Cne de Pruniers : Pied du mur des Beaunes, — bords du chemin entre les Brésolles et le pont de Pruniers, — marnières de la Besaudière.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : Terres entourant le pâtureau du Clos-Tion.
C^ne de Gièvres : Chemin de la Loge.
C^ne de Soings : Coteau au Nord du lac.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : La Cave.
C^ne de Châteauvieux : Péquignon.

MELILOTUS officinalis Lam. (*M. arvensis Wallr.*) Juillet-octobre.
Moissons et terres calcaires des environs de Romorantin. A.C.

═══ **macrorhiza** Pers. Juillet-août.
Moissons des terrains calcaires, R.R. Ne se trouve pas tous les ans.
C^ne de Pruniers : Moissons calcaires de la Maison-Blanche, — *clairières du bois de l'Abbaye*, — moissons d'un ancien pâtureau de la Cornuère.

TRIFOLIUM incarnatum L. var. *Molinerii.* Mai-juin.
Prairies, C. surtout dans les prés du val du Cher et de la Sauldre.
C^ne de Romorantin : Prés du bas du faubourg d'Orléans, — prés aux Papillons bordant la route de la Fringale, etc.

═══ **Rubens** L. Juillet.
Bois des terrains calcaires, R.
C^ne de Selles-sur-Cher : Bois taillis traversé par la route de Selles à Blois et par le chemin de fer de Tours, R.R.

Digitized by Google

C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc çà et là, R.R.

C^ne de Gièvres : Bois du Poulinat.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche et partie de la forêt de Grosbois l'environnant.

TRIFOLIUM medium L. Mai-juillet.

Abords des marnières, bois des terrains secs et marneux.

C^ne de Romorantin : Bords des marnières des Monteaux.

C^ne de Pruniers : Marnières de la Besaudière, — bois de l'Abbaye.

C^ne de Villeherviers : Terres au confluent de la Beauce, — pâtureau à Balletan, — lisière d'un bois à la Gaillardière du côté de la prairie du Riau-Mabon.

C^ne de La Chapelle-Montmartin : Bords d'une mare aux Souches, — tailles de Ruines près la Gourdaudière.

C^ne de Langon : Le grand pâtureau de la Fleurière, — terre et bois en regard des carrières des Tréchis.

C^ne de S^t-Julien : Pâtureau d'Olivet appelé le Jardin du Couvent.

C^ne de Villefranche : Levée du canal du Berry (côté gauche) entre Villebrette et l'Escourioux.

pratense L. Mai-juillet.

Prés, bords des chemins, bois, fréquemment semé, C. partout.

Digitized by Google

Varie à fleurs blanches sur la levée du canal du Berry, communes de Villefranche et Gievres, R.R.

TRIFOLIUM ochroleucum Juin-juillet.

Prés secs, pâtureaux, bords des bois, A.C.

C^ne de Lanthenay : Pré aux Étangs.

C^ne de Pruniers : Pâtureaux de Longueville, de la Cornuère.

C^ne de Villeherviers : Bords de la Beauce.

C^ne de Villefranche : Abords de l'Épinière.

Je l'ai trouvé encore notamment :

C^nes de Romorantin, — La Chapelle-Montmartin, Maray, S^t-Julien, S^t-Loup, — Souesmes, — Selles-sur-Cher, Billy, Gy, Soings, — Châtillon-sur-Cher.

═══ **maritimum** Huds. Mai-juillet.

Prairies humides.

C^ne de Lanthenay : Pré aux Étangs, — Pré à l'angle de la rue des Verdons et du chemin de Lassay, C.C. — pré de la Nasse bordant à l'Est la route de Romorantin à Orléans entre la seconde arche et l'allée de Gombault.

C^ne de Villefranche : Partie septentrionale de la grande pièce de pré de l'Escourioux, R.

C^ne de Maray : Prairie au bas de la côte longeant la route de Mennetou à Maray, C.

C^ne de Theillay : Prairie bordant le ruisseau entre la gare et le bourg, R.

Digitized by Google

C^ne de Lassay : Pré entre le château du Moulin et la rivière de Lassay, R.R.

NOTA. — Il a été trouvé commune de Romorantin dans un pré de la Tricanderie, mais je ne l'ai pas vu.

TRIFOLIUM arvense L. Juin-septembre.
Terres incultes et sablonneuses C., affecte diverses formes que je n'ai pas étudiées.

═══ **striatum** L. Juin.
Pelouses, bords des chemins, C.

═══ **scabrum** L. Mai-juin.
Pelouses, bords des chemins plus particulièrement des terrains calcaires, A.R.

C^ne de Pruniers : Pelouses à l'Abbaye, à la Jaudraie.

C^ne de Veilleins : Talus de la chaussée de l'ancien étang Poulet.

C^ne de S^t-Loup : Val du Cher de la rive gauche un peu au-dessous du pont de Mennetou.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Abords de la Brosse.

C^ne de Billy : Bords de la route de Selles-sur-Cher à Blois, C. Le Tertre-Blanc.

C^ne de Soings : Bords de l'ancien chemin de Soings à Contres.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Talus du chemin bas entre le pont de Sauldre et le bois de la Cave.

Digitized by Google

PAPILIONACEÆ

TRIFOLIUM subterraneum L. Mai-juin.
Pelouses et chemins des terrains sablonneux, C.C.

═══ **fragiferum** L. Juin-septembre.
Pelouses et chemins, principalement des terrains argilo-calcaires, C.

═══ **glomeratum** L. Mai-juin.
Pelouses, bords des chemins.
Cne de Lanthenay : Bords du Chemin-Creux près Moscou, — bords du chemin de Romorantin à Queue-de-Loup, 1° vis-à-vis la carrière Moureux, 2° immédiatement avant Queue-de-Loup.
Cne de Pruniers : Talus Nord du chemin de Romorantin à Pruniers entre les Beaunes et le ruisseau qui traverse le chemin, — pelouses près le ruisseau de Bâtarde à l'entrée d'un pré de la Cornuère bordant au Nord le chemin de Longueville.
Cne de Veilleins : Levée de l'ancien étang Poulet.
Cne de Villeherviers : Entrée d'un pré haut de la Chansonnerie faisant suite aux vignes de Moulin-Neuf.
Cne de St-Julien : Bords de la route de La Chapelle-Montmartin à St-Loup principalement vis-à-vis le château de Valette.
Cne de St-Loup : Talus bordant la route à Sauveterre.

Digitized by Google

C^ne de Villefranche : Gazons à l'angle de la route de Nevers à Tours et du chemin de la Parconière à l'Escourioux, — clairières vers l'angle Nord-Est d'un bois taillis de l'Escourioux, — sommet gazonné dominant le canal du Berry entre les bois de l'Escourioux et Villebrette.

C^ne de Gièvres : Bords du chemin de la Loge entre les pins de l'Escourioux et les vignes, — pelouses bordant la route de Selles-sur-Cher vis-à-vis les Bresolles.

TRIFOLIUM lævigatum Desf. *(T. strictum W. et K.)* Mai-juin.

Chemins, pelouses, terres sablonneuses, C.

C^ne de Romorantin : Sur les limites de Villefranche au Sud-Est de la Richaudière.

C^ne de Lanthenay : Terre entre la Pesnière et l'étang de la Noue.

C^ne de Loreux : Sentier de la rive droite de la Sauldre en amont de Migereau.

C^ne de Pruniers : Bords du chemin entre les Bresolles et le pont de Pruniers, — abords du pont de Pruniers.

C^ne de Villeherviers : Chemin du Portail à Forez, — chemin de la taille du marais Thion à la route de la Fringale, — bords de la route de la Fringale près le Riau-Mabon.

C^ne de Mennetou : Terres entre les marnières de la Blatière et l'étang de Veillère.

Digitized by Google

Cne de St-Loup : Terre bordant la rive gauche du Roulier et l'ancien chemin de St-Loup à Maray.

Cne de Villefranche : Bords du chemin entre St-Marc et l'Épinière, — Bords de la route de Tours, vis-à-vis la Parconnière.

Cne de la Ferté-Imbault : Pelouses bordant le canal traversé par la route de Romorantin à Salbris.

Cne de Selles-St-Denis : Parc de Bois-Méan.

Cne de Gièvres : Bords de la route de Villefranche à Selles-sur-Cher, C.C., — pelouses à Bois-Ribault, — bords de la route de Chabris entre la Grange de Rère et la route de Tours à Nevers.

Cne de Soings : Moissons du moulin Hadry contiguës à la source de la Croisne.

TRIFOLIUM repens L. Mai-septembre.
Prairies, pelouses, bords des chemins, C.

Michelianum Savi. Juin-juillet.
Prairies inondées, A.C. surtout dans les années humides.

Cne de Lanthenay : Pré aux Étangs dans la partie mouillée par les écoulements.

Cne de Villeherviers : Prairie bordant au Sud le chemin de la Fringale là où il est traversé par le Riau-Mabon, — Pré de la Gravelle sur la rive droite de la Beauce.

Cne de Langon : Bas-fonds dans le val du Cher vis-à-vis Olivet.

Digitized by Google

Cne de St-Loup : Prés humides de la rive gauche de la Prée bordant la route de Mennetou à St-Loup.

Cne de Villefranche : Prés de la Lavanderie bordant la route de Nevers à Tours où il forme en partie la base de la végétation, — pré de la rive droite du canal du Berry au bas de Ste-Marthe, — partie basse à l'entrée de la grande pièce de pré de l'Escourioux.

Cne de Neung-sur-Beuvron : Abords du pont d'Avignon, R.

Cne de Salbris : Pré Chevalier au bas du Thou.

Cne de Selles-sur-Cher : Pré du val de la Sauldre à St-Lazare.

Cne de Gièvres : Prés de la Parconière contigus à ceux de l'Escourioux.

Cne de Gy : Prairie de la Croisne au bord de la route de Romorantin près le bourg de Gy, R.R.

Cne de Lassay : Pré entre le château du Moulin et la rivière de Lassay, R.R.

TRIFOLIUM filiforme L. *(T. micranthum Savi.)* Mai-juin.

Prairies, pelouses, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Lanthenay : Chemin traversant le Rantin à Queue-de-Loup.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Pré des Beaunes là où il est traversé par un chemin de meunier, — places derrière la ferme de Longueville, — bords des allées de Longueville, de la Cornuère, de Chênemoireau, etc.

C^ne de Villeherviers : Pré de la rive droite de la Sauldre en amont du pont de Villeherviers, — prairie bordant au Sud le chemin de la Fringale là où il est traversé par le Riau-Mabon.

C^ne de Villefranche : Prés de l'Escourioux, — chemin entre la Demanchère et l'Épinière.

C^ne de Gièvres : Pelouses à Bois-Ribaut.

Je l'ai encore trouvé C^nes de Loreux, — de St-Loup, — de Gy, etc.

TRIFOLIUM procumbens L. *(T. minus Sm.)*
Mai-juin.
Pelouses, C.

═══ **patens** Schreb. *(T. parisiense* D.C.)
Juin-août.
C. surtout dans les prairies humides.

═══ **agrarium** L. Poll. (*T. campestre Schreb.*)
Mai-août.
Champs, pelouses, C.

TETRAGONOLOBUS siliquosus Roth. Mai-juillet.
C. dans les pacages marneux un peu frais du côté Sud de la Sauldre depuis les Mon-

Digitized by Google

teaux jusqu'à la Colinière, dans les Cnes de Romorantin, Pruniers, — Villefranche et Gièvres, notamment :

Cne de Romorantin : Pré des Arrogantes, bords de la route de Romorantin à Villefranche vers la borne 43.

Cne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche, bois de l'Abbaye et en outre : Pacages humides entre le Grand-Village et les Vérières au Nord de la Sauldre.

LOTUS angustissimus L. Juin-septembre.

Pelouses, bords des chemins, terres sablonneuses au repos.

La var. **vulgaris** G.G. *(L. Diffusus Sol.)* est la plus commune.

Cne de Romorantin : Çà et là aux bords du chemin de la Fringale.

Cne de Lanthenay : *Autour d'anciennes fosses d'extraction de terres glaises bordant à l'Ouest la route de Romorantin à Vernou.*

Cne de Loreux : Terres du Glandier dépendant aujourd'hui du parc des Piquets.

Cne de Pruniers : Bords du chemin de Romorantin à Lassay à la hauteur du pâtureau des Granges.

Cne de Vernou : Terres de la rive droite de l'étang de Grosaulne.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : *Terres (aujourd'hui en pins) entre la ferme des Gasts et la route de Romorantin à Loreux,* — bords du chemin allant de Putteville à la route de Romorantin à Theillay.

C^ne de Villefranche : Val du Cher, — clairières vers l'angle Nord-Est d'un bois taillis de l'Escourioux, — sommet gazonné dominant le canal à l'Est des bois de l'Escourioux.

C^ne de Neung : Moissons bordant la route de Marcilly-en-Gault près le pont d'Avignon.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Moissons bordant la route de Marcilly à Neung.

C^ne de Selles-S^t-Denis : Parc de Bois-Méan.

Je n'ai trouvé la var. **erectus** G.G. que dans l'ancien pâtureau de S^te-Marthe, C^ne de Villefranche-sur-Cher.

LOTUS hispidus Desf. Juin-juillet.

Moissons maigres, terres incultes et bords des chemins dans les terrains sablonneux, C.

Je l'ai trouvé notamment : C^nes de Romorantin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Veilleins, Vernou, Villeherviers, — Langon, Villefranche, — Salbris, La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, Orçay, Selles-S^t-Denis, Theillay.

corniculatus L. Juin-septembre.

Prés, pâtures, bords des chemins et des haies, C.

Digitized by Google

PAPILIONACEÆ

LOTUS tenuis Kit. Juin-septembre.
Parties desséchées des lits des étangs, C.C.

uliginosus Schkuhr. Juin-juillet.
Pieds des haies et prairies dans les parties humides, C.

ASTRAGALUS glyciphyllos L. Juin-juillet.
Bois, pâtureaux et bords des haies dans les terrains marneux, A.R.
Cne de Pruniers : Bois de la Gascetière, — bois de l'Abbaye.
Cne de St-Julien : Pâtureau de Valette au bas de la Savardière, — bois de la côte du Cher près Chantemerle.
Cne de Selles-sur-Cher : Chemin entre Avrin et la route de Selles-sur-Cher à Meusnes.
Cne de Gièvres : Bois du Poulinat,—Abords d'une maison entourée de larges fossés au-dessous et au Nord de la grange de Rère.

COLUTEA arborescens L. Mai-juillet.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche où il est éloigné de toute habitation, R.R.

VICIA sativa L. Mai-juillet.
Cultivé et communément subspontané.
J'ai trouvé la variété à fleurs blanches :
Cne de Selles-sur-Cher, — Moissons bordant à l'Est la route de Selles à Blois.
Var. **torulosa** *(V. torulosa Jord.)* Mai-juin.
Moissons, prés.

Digitized by Google

C^ne de Romorantin : Pré à mi-côte au climat des Crottés.

VICIA angustifolia Roth. Mai-juillet.
Moissons, pelouses, bois, C.

Var. **uncinata** *(V. uncinata Desv.)* R.

C^ne de Millançay : Bois de la Martière.

C^ne de Villeherviers : Bruyères entre Béjarie et Bruleteau sur le point culminant.

Var. **segetalis** *(V. segetalis Thuill.)* C.

Var. **Bobartii** *(V. Bobartii Forst.)* C.

lathyroides L. Mai-juin.
Pelouses, talus des fossés, terres incultes, A.C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Romorantin : Aux Favignolles.

C^ne de Lanthenay : Talus du chemin bas des Perreux.

C^ne de Pruniers : Terre entre le ruisseau de Bâtarde et la Cornuère, — talus du chemin de Romorantin à Pruniers immédiatement avant les murs des Beaunes, — terre de la Cornuère bordant l'allée qui conduit à Pruniers.

C^ne de Villeherviers : *Pelouses autour de fosses à Bois-Fuseau.*

C^ne de St-Julien : Pelouses près les carrières de la Savardière.

Digitized by Google

C^ne de Gièvres : Pelouses et talus de fossés d'un bois bordant au Nord le chemin de Villefranche à Gièvres un peu avant Jaugy.

VICIA lutea L. Mai-juillet.
Moissons des terrains sablonneux, C.

═══ **sæpium** L. Mai-juin.
Haies, bois, C.
Je l'ai trouvé à fleurs d'un blanc jaunâtre :
C^ne de S^t-Julien : Bois entre le pâtureau d'Olivet dit le jardin du Couvent et Olivet.

═══ **cracca** L. *(cracca major,* G.G.) Juin-août.
Haies, buissons, prés, C.

═══ **tenuifolia** Roth. (*cracca tenuifolia,* G.G.) Juin.
Moissons des terrains calcaires, R.R.
C^ne de Gièvres : Moissons du Vivier.

NOTA. — MM. Franchet et Rimboux l'ont récolté à la Cave, commune de Châtillon-sur-Cher. Je ne l'y ai pas trouvé.

═══ **varia** Host. *(cracca varia,* G.G.) Juin-juillet.
Moissons et champs calcaires ou voisins de la marne, A.R.
C^ne de Selles-sur-Cher : Moissons bordant la route nationale 76.

Digitized by Google

Cne de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.

Cne de Mur : Moissons bordant la route de Mur à Soings dans la partie limitrophe de la commune de Soings.

Cne de Soings : Moissons des environs de Soings principalement sur le coteau situé au Nord du lac, — moissons du moulin Hadry.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

Cne de Rougeou : Moissons près le bourg.

ERVUM hirsutum L. Juin.
Moissons, Champs cultivés, C.

═══ **tetraspermum** L. Mai-juin.
Haies, lieux cultivés, C.

═══ **gracile** D.C. Juin-juillet.
Champs et moissons des terrains calcaires, R.

Cne de Pruniers : Moissons de la Besaudière.

Cne de Gièvres : Moissons de Jaugy.

Cne de Châteauvieux : Moissons de Péquignon.

LATHYRUS aphaca L. Juin-juillet.
Moissons, A.C. plus particulièrement dans les terrains calcaires.

Cne de Maray : Moissons de la Pelaudière et de Daluet.

Cne de Villefranche : Terres du Pérou dépendant de la Gaudinière, — moissons bordant la route entre St-Marc et la Demanchère.

Cne de Billy : Moissons calcaires de Billy.

Digitized by Google

Cnes de Mur et de Soings : Moissons bordant la route de Mur à Soings.

LATHYRUS nissolia L. Juin-juillet.

Bords des prés, pâtureaux, moissons, R.

Cne de Maray : Moissons et pré séparés par un large fossé au bas de la Pelaudière.

Cne de Villefranche : *Pâtureau de la Parconière*, — ancien pâtureau de Ste-Marthe, — bois de la rive droite du canal du Berry un peu en amont de l'Escourioux.

Cne de Selles-sur-Cher : Moissons entre le village de la Thizardière et la Sauldre.

Cne de Gièvres : Bords du canal du Berry aux environs de la Genetière.

═══ **hirsutus** L. Juin-juillet.

Moissons, A.C. notamment :

Cne de Pruniers : Moissons de la rive droite de la Sauldre au Sud des Vérières.

Cne de Gièvres : Terres du Vivier.

Je l'ai trouvé en outre : Cnes de Maray, St-Loup, Villefranche, — Selles-sur-Cher, Billy, Gy.

═══ **tuberosus** L. Juin-Juillet.

Champs et moissons, A.R.

Cne de Lanthenay : Moissons bordant le chemin des Grands-Guideaux, — moissons bordant le chemin des Petits-Guideaux, — pré haut bordant la route départementale nº 7 au Nord des Granges.

Digitized by Google

Cne de Maray : Moissons au bas de la Pelaudière, — moissons à Daluet, A.C.
Cne de Villefranche : Bords de la chaussée de la rive droite du canal du Berry un peu en amont de l'Escourioux, R.
Cne de Billy : Moissons calcaires bordant la route de Selles-sur-Cher à Blois.
Cne de Gièvres : Rive gauche du même canal en aval du pont de l'Escourioux, R.

LATHYRUS palustris L. Juin-août.
Prairies tourbeuses, R.R.
Cne de Villeherviers : Rive droite de la Sauldre immédiatement en aval du bourg de Villeherviers, — rive gauche de la Sauldre immédiatement en amont du parc du Portail.

═══ **pratensis** L. Mai-juin.
Haies, prairies, C.

═══ **angulatus** L. Mai-juin.
Moissons des terrains sablonneux C.
Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Romorantin : Moissons des Cheminets.
Cne de Pruniers : Moissons de la Cornuère, — des Bresolles.
Cne de Vernou : Moissons de la rive droite de l'étang de Grosaulne.
Cne de Villeherviers : Terres des Tourneux.
Cne de Villefranche : Moissons bordant la route départementale nº 7 vers la borne 45, — moissons bordant le chemin entre

Digitized by Google

St-Marc et la Demanchère, — pentes dominant la rive droite du canal du Berry entre les bois de l'Escourioux et Villebrette.

Cne de Selles-sur-Cher : Moissons entre le village de la Thizardière et la Sauldre.

Cne de Gièvres : Moissons de la Berrerie, — des Bresolles.

Cne de Mur : Moissons bordant la route de Mur à Soings.

Cne de Soings : Moissons bordant la route de Mur à Soings.

Je l'ai trouvé encore communes de Loreux, — Marcilly-en-Gault, — Gy.

LATHYRUS sphæricus Retz. Juin.

Moissons, R.R.

Cne de Soings : Moissons du moulin Hadry contiguës à la source de la Croisne, R.R.

OROBUS tuberosus L. Avril-mai.

Bois, pâtureaux, A.C. Trouvé notamment :

Cne de Lanthenay : Bords d'un fossé perpendiculaire à la route de Veilleins vis-à-vis le pâtureau de Rangereux.

Cne de Loreux : Forêt de Bruadan.

Cne de Millançay : Forêt de Bruadan.

Cne de Pruniers : Bois de l'Abbaye, pâtureau de la Pommerie.

Cne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines.

Cne de St-Julien : Bois taillis des Terres-Rouges.

Digitized by Google

Cne de La Ferté-St-Cyr : Bois de La Ferté.

OROBUS niger L. Juin.

Bois, R.R.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

CORONILLA varia L. Juin-juillet.

Champs et terrains calcaires, A.C.

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche.

Cne de Selles-sur-Cher : Bords de la route de Selles à Blois.

Cne de Billy : Le Tertre-Blanc.

Cne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy et du Vivier.

ORNITHOPUS ebracteatus Brot. Fin mai-juillet.

Bords des routes, pelouses des chemins, moissons et terres sablonneuses, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Courmemin : Terres de la Bretèche, C.C.

Cne de Pruniers : Allée de la Cornuère allant à Pruniers, etc.

Cne de Veilleins : Allée des Levées.

Cne de Villefranche : Bords de la route de Villefranche à Selles-sur-Cher.

Cne de Gièvres : Bords de la route de Villefranche à Selles-sur-Cher.

Cne de Lassay : Bords de la route de Romorantin à Lassay avant d'arriver à l'étang Paris.

Digitized by Google

Et encore Cnes de Romorantin, Lanthenay, Loreux, Millançay, Vernou, Villeherviers, — Neung-sur-Beuvron, — La Ferté-Imbault, Selles-St-Denis, — Gy, Mur, Rougeou, Soings.

ORNITHOPUS perpusillus L. Mai-juillet.
Champs et pelouses des terrains sablonneux, C.

═══ **compressus** L. Mai-août.
Champs et bords des chemins sablonneux, A.R.

Cne de Pruniers : Extrémité méridionale des bords de l'allée allant de la Cornuère au chemin de Chènemoireau, — bords de l'ancien chemin des Thiveaux près la route de Pruniers à Romorantin, — chemin de Pruniers à Chènemoireau en se rapprochant de la Robinière, — val de la Sauldre rive droite, en aval du confluent du ruisseau de Bâtarde.

Cne de Gièvres : Terre près les Bresolles bordant le chemin des Bresolles au pont de Pruniers, C.

Cne de Gy : Terre de la rive droite de la Croisne entre le bourg et la Pichonnière près d'un marécage.

Cne de Soings : Coteau à l'Ouest du lac.

NOTA.— J'ai trouvé en 1865 et 1866, commune de Pruniers, dans les moissons

Digitized by Google

bordant la rive droite de la Sauldre au confluent du ruisseau de Bâtarde, un *ornithopus* dont les pédoncules sont beaucoup plus longs que les feuilles et qui pour le surplus est intermédiaire entre l'*O. perpusillus* et l'*O. compressus*.

HIPPOCREPIS comosa L. Mai-juillet.
Pelouses et prés hauts, principalement des terrains calcaires, C.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

CYTISUS *supinus* Jacq. C^ne^ de Celettes, A.B. (M. Franchet).

LUPINUS *linifolius* Roth. C^ne^ des Montils, A.B. (M. Franchet).

MEDICAGO *ambigua* Jord. C^nes^ de Chitenay et de Mazangé, A.B.V. (MM. Franchet et Nouel).

— *gerardi* Wild. C^ne^ de St-Laurent-des-Eaux, A.B. (M. Roger).

TRIGONELLA *monspeliaca* L. C^ne^ d'Avaray, A.B. (M. Roger).

MELILOTUS *alba* Lam. Environs de Blois, A.B. (M. Mathonnet).

TRIFOLIUM *elegans* Savi, C^ne^ de Chou, A.V. (M. Em. Desvaux).

GALEGA *officinalis* L. C^ne^ de Pont-Levoy, A.B. (M. Franchet).

VICIA *villosa*. C^ne^ d'Azé, A.V. (M. Nouel).

Ces 4 dernières espèces sont-elles spontanées?

LATHYRUS *sylvestris* L. C^ne^ de Candé, A.B. (M. Franchet).

CORONILLA *minima* L. C^ne^ de Marcilly, A.V. (M. Peltereau).

Digitized by Google

Les Robinia *acacia* et Onobrychis *sativa*, cultivés en grand aux environs de Romorantin, y sont souvent subspontanés.

On y cultive également en grand les Pisum *sativum* L. et Phaseolus *vulgaris* L.

AMYGDALEÆ Gr.

PRUNUS fruticans Weihe fl. avril, fr. septemb.
Haies, çà et là.
C^ne^ de Romorantin : Haie septentrionale de la rue du Lys entre les chemins des Petits et des Grands-Guideaux.
C^ne^ de Lanthenay : Haie orientale de la route départementale n° 1 au Dreuillet.
C^ne^ de Loreux : Haie méridionale du jardin des Gasts.
C^ne^ de Pruniers : Haie du taillis bordant le chemin qui longe le jardin de Longueville.
C^ne^ de Villeherviers : Haie au Nord de la route de Salbris séparant les terres de Trécy des marnières et des prés de la Beauce au pont Gitton.
C^ne^ de Gièvres : Haie du chemin de la Loge.

spinosa L. fl. avril, fr. septembre.
Haies, buissons, C.C.
Se présente sous deux formes différentes aux environs de Romorantin : 1° avec des fleurs d'un blanc pur; 2° avec des fleurs d'un blanc jaunâtre moitié plus petites.

Digitized by Google

PRUNUS avium L. Avril-juin.
Bois.
C^ne^ de Pierrefitte-sur-Sauldre : Bois de la rive gauche de la Sauldre entre le pont de Pierrefitte et Longate, R.R.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

PRUNUS *domestica* L. Parc du château des Montils, A.B. (M. Franchet).
— *insititia* L. Forêt de Russy, A.B. (M. Franchet).
— *Mahaleb* L. Bois d'Uchigny, A.V. (M. Peltereau).
On cultive dans les jardins et les vignes de Romorantin et des environs :
AMYGDALUS *communis* L. (amandier).
— *persica* L. (pêcher).
PRUNUS *armeniaca* L. (abricotier).
— *cerasus* L. (cerisier).

ROSACEÆ Juss.

SPIRÆA filipendula L. Juin.
Prairies, pâtureaux, C.
C^ne^ de Romorantin : Pré à Chat-Lièvre, prés aux Arrogantes.
C^ne^ de Lanthenay : Prés aux Verdons, R.
C^ne^ de Pruniers : Prés de la rive droite de la Sauldre aux Bardineaux.
Se trouve particulièrement dans les prés et pâtureaux du val du Cher, communes de Mennetou, Langon, Villefranche, etc.

Digitized by Google

ROSACEÆ

SPIRÆA ulmaria L. Juillet.
Bords des ruisseaux et prés humides, C.

GEUM urbanum L. Juin-août.
Pied des haies, bois, pâtureaux, C.

POTENTILLA fragariastrum Ehrh. Avril.
Pied des haies, bois, pâtureaux, C.

═══ **splendens** Ram. Fin avril-juin.
Landes, R.R.
Cne de Pruniers : Landes au Nord-Est des marnières de Longueville, — bruyères et bords d'un pâtureau traversé par l'allée allant de Longueville à la Cornuère, — landes entre l'étang de Longueville et le pré des Beaunes, C. dans ces deux dernières localités.

═══ **verna** L. Mars-mai.
Pelouses sèches, C.C.

═══ **tormentilla** Nestl. Mai-octobre.
Bois, bruyères, C.C.
Je l'ai trouvé à 5 pétales :
Cne de Courmemin : Terre aux environs de l'étang de la Grande-Bretèche.

═══ **reptans** L. Mai-août.
Bords des chemins, pâtureaux, C.

═══ **anserina** L. Mai-août.
Bords des eaux, pelouses marécageuses, C.

═══ **supina** L. Juillet-septembre.
Sables des bords des étangs R., moins rare quand ils sont à sec.

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Étangs de Courmin, de la Flandrinière.

C^ne de Pruniers : Étang de Bâtarde.

C^ne de Lassay : Étang du Rotay.

POTENTILLA argentea L. Juin-septembre.
Pelouses sèches, bords des sentiers, C.

J'ai cru reconnaître parmi les formes variées de cette espèce les *P. argentata* Jord. — *P. tenuiloba* Jord. — *P. conftnis* Jord.

COMARUM palustre L. Juin-juillet.
Marais tourbeux, R.

C^ne de Pruniers : ancien étang Facy.

C^ne de Gy : Nombreux marais de la rive droite de la Croisne entre le bourg de Gy et la Demangère.

C^ne de S^t-Viâtre : Marécages à la queue de l'étang de Favelle.

FRAGARIA vesca L. Avril-juin.
Bois, pâtureaux, haies, C.

==== **collina** Ehrh. Mai-juin.
Pied des haies, pâtureaux, bois, A.R.

C^ne de Villefranche, dans le val du Cher : Haie septentrionale de la grande pièce de pré de l'Escourioux, — entrée méridionale du pâtureau de la Lavanderie, — haie septentrionale d'un pré de la Grange.

C^ne de Gièvres : Pâtureau de Jaugy, entrée Nord-Est.

Digitized by Google

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave dans la partie haute.

Var. **Hagenbachiana** Lang.

C^ne de Gièvres : Entrée Nord-Est du pâtureau de Jaugy parmi les buissons.

FRAGARIA magna Thuill. Mai-juin.

Bois, R.R.

C^ne de Maray : Bois contigu au jardin potager de la Pelaudière.

RUBUS cæsius L. Juin-juillet.

Haies, bords des champs et des bois, A.C.

Var. **serpens** *(Rubus serpens*, G.G.) Juin-juillet.

Haies et bois.

C^ne de Lanthenay : Haie aux environs du Grand-Vauvert.

C^ne de Villeherviers : Haie de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail.

C^ne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines.

═══ **nemorosus** Hayne. Mai-août.

Haies, pâtureaux, A.C.

C^ne de Romorantin : Haie de la rive gauche de la Sauldre à Longuevalle.

C^ne de Villeherviers : Haie d'un bois longeant le Rantin à Queue-de-Loup.

═══ **hirtus** Var. **gracilis** G.G. *(R. Menkei W. et N.)* Juin-juillet.

Bois.

Digitized by Google

C. dans la partie de la forêt de Bruadan traversée par l'allée du Roi.

RUBUS discolor W. et N. Juin-août.
Haies, C.

J'ai récolté aux environs de Romorantin d'autres formes de *Rubus* que je ne rapporte qu'avec doute à des espèces d'une valeur contestable et je préfère les passer sous silence.

ROSA gallica L. fl. juin, fr. septembre.
Bois, R.R.

Fleurs généralement à plus de 5 pétales, spontanéité douteuse.

C^ne^ de Lanthenay : Petite futaie du Dreuillet, — *taille de la Gérandière.*

C^ne^ de Dhuizon : Bois bordant à l'Est la route de Romorantin à Dhuizon, R.R.

═══ **arvensis** L. Juin.
Haies, bois, buissons, C.

Var. **bracteata** *(R. bibracteata Bast.)*
Haies, A.C.

═══ **stylosa** Desv. Mai-juin.
Haies, A.R.

C^ne^ de Courmemin : Rive gauche de l'étang de la Grande-Bretèche.

C^ne^ de Lanthenay : Pacage inculte entre la route de la forêt et les tailles du Lieu, presque à l'entrée de ces tailles en venant de Romorantin.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Haie orientale du petit pâtureau de la Cornuère.

ROSA canina L. Mai-juin.

Haies et buissons.

Var. à feuilles luisantes (*R. nitens Desv.*) C. et à feuilles glauques (*R. glaucescens Desv.*) C.

Je l'ai trouvé à divisions du calice presque simples :

Cne de Lanthenay : Haie septentrionale d'un bois de pins entre Gombault et Grange-Neuve.

Var. **dumalis** *(R. dumalis Bechst.)* Mai-juin.

Haies, buissons, bois, A.C.

Cne de Lanthenay : Haie du chemin de la Malicorne.

Cne de Langon : Haie du val du Cher.

Cne de Gièvres : Haie du val du Cher près l'Escourioux.

Cne de Selles-St-Denis : Parc de Bois-Méan.

Var. **andegavensis** *(R. andegavensis Desv.)* Mai-juin.

Haies, bois, buissons, A.C. notamment :

Cne de Lanthenay : Taille de la Gérandière bordant la route de Romorantin à Vernou.

Cne de Langon : Pâtureau de Nocfond.

Cne de Villefranche : Bords du Cher en amont de l'Escourioux.

Cne de Gièvres : Haie du chemin de la Loge.

Digitized by Google

Var. **Deseglisei** *(R. Deseglisei Bor.)* fl. mai-juin, fr. septembre.
Haies, buissons, R.R.

C^ne de Lanthenay : Haie près du Rantin en allant du Petit-Queue-de-Loup au Grand-Vauvert.

C^ne de Villeherviers : *Haie au Nord du chemin de Romorantin à Loreux à la suite des bois de Pins de Queue-de-Loup.*

Var. **dumetorum** (*R. dumetorum Thuill.*) Mai.
Haies, pâtureaux, A.C.

ROSA tomentosa Sm. fl. mai-juin, fr. septemb.
Haies, pâtureaux, A.C. notamment :

C^ne de Romorantin : Haies aux Crottés.

C^ne de Lanthenay : Haies de la rue Creuse, — haies au Dreuillet.

C^ne de Villeherviers : Haie de la taille du Marais-Thion, — haie du chemin allant de Forez à Fontenils.

C^ne de Langon : Pâtureau de Nocfond.

C^ne de Montrieux : Bords d'un fossé au Sud-Ouest et près de la Damonerie.

═══ **rubiginosa** L. Mai-juin.
Haies.

C^ne de Villefranche : Haie du clos des Pintardes bordant la route de Romorantin à Villefranche.

Digitized by Google

Cne de Thoury : Haie bordant la route de Dhuizon près le bourg de Thoury.

Var. **umbellata** *(R. umbellata Leers.)* Juin.

Haies, buissons.

Cne de Lanthenay : Bords du chemin allant de Mer à la route de la forêt.

Cne de Villefranche : Haie septentrionale de la route de Nevers à Tours près l'embranchement de Ste-Marthe.

Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.

Var. **Lemanii** *(R. Lemanii Bor.)* Juin.

Haies, A.C. notamment :

Cne de Lanthenay : Bords de la route de Romorantin à Vernou.

Cne de St-Julien : Haie du chemin faisant suite au chemin des Terres-Rouges de l'autre côté de la route de Romorantin à Graçay.

Cne de Gièvres : Haie du chemin de la Loge.

Var. **comosa** *(R. comosa Rip.)* fr. septembre.

Cne de Langon : Grand pâtureau de la Fleurière où je n'ai trouvé qu'un seul pied.

Var. **Jundzilliana**(*R. Jundzilliana Bess.*) fl. juin, fr. juillet, fr. mur octobre.

Haies, buissons, pâtureaux, A.R.

Digitized by Google

C^ne de S^t-Loup : Pâtureau du val de la Prée à l'angle du chemin de S^t-Loup à Mennetou et d'un chemin remontant vers le Sud.

C^ne de Selles-sur-Cher : Taillis traversé par la route de Blois n° 156.

C^ne de Gièvres : Haies et buissons de la côte du Cher entre le pont de l'Escourioux et Jaugy.

Var. **sæpium** *(R. sœpium Thuill.)* fl. juillet, fr. août.

Haies, C.

J'ai trouvé sur la rive gauche du Néant, C^ne de Vernou, en amont du pâtureau de Nardillay, un *R. sœpium* dont les fruits étaient couronnés par les sépales persistants et dressés.

J'ai récolté aux environs de Romorantin d'autres formes de *Rosa*, mais je ne les rapporte qu'avec doute à des espèces d'une valeur très contestable et je les omets volontairement.

AGRIMONIA eupatoria L. Juin-août.

Prés, pâtureaux, bords des chemins, C.

POTERIUM dictyocarpum Spach. Mai-juin.

Pelouses des coteaux, des bois et des chemins, C.

J'ai trouvé la var. hérissée *(P. Guestphalicum Boenn.)* dans les terrains calcaires seulement :

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Chemin des Grands-Guideaux.
Cne de Villefranche : Terres calcaires de la Gaudinière.
Cne de Soings : Coteau au Nord du lac.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

POTERIUM muricatum Spach. Juin-Juillet.
Pelouses sèches, chaussées et berges du canal du Berry, C.

SANGUISORBA officinalis L. Juillet-août.
Prés humides, C.
Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Romorantin : Bruyères des Monteaux, — prés des Arrogantes.
Cne de Lanthenay : Prés de la Nasse près la 1re arche, — prés du Rantin à Queue-de-Loup.
Cne de Pruniers : *Pré des Vérières*, — Prés du ruisseau de Bâtarde.
Cne de Villeherviers : Prés de la Sauldre.
Cne de Gièvres : Bords du canal du Berry entre l'Escourioux et Jaugy.
Cne de Gy : Prés de la Croisne.
Cne de Pierrefitte : Bords de la Boute-Vive.

ALCHEMILLA arvensis Scop. Juin-septembre.
Moissons et champs sablonneux, C.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

RUBUS *tomentosus* Borck. Vendôme, A.V. (M. Franchet).

Digitized by Google

J'ai reçu en outre de mon ami M. Franchet des formes nombreuses de *Rubus* et de *Rosa* dans lesquelles il ne voit plus aujourd'hui que des variétés ou des variations. Pour me conformer à son désir, je n'en parle pas.

M. Franchet considère comme naturalisés dans le parc des Montils les *R. pimpinellifolia* Ser. et *pomifera* Herm., mais il ne regarde pas comme naturalisé dans l'ancien cimetière de Blois le *Potentilla recta* indiqué par M. Boreau et je ne crois pas non plus à la naturalisation dans une haie d'Herbilly du *Rosa lutea* cité par le même auteur.

POMACEÆ Bartl.

MESPILUS germanica L. fl. mai, fr. août.

Haies, pâtureaux, A.C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Lanthenay : Autour de Romorantin.

C^ne^ de S^t^-Loup : Pentes boisées entre la ferme et le ruisseau de la Grange.

C^ne^ de S^t^-Viâtre : Pâtureau bordant le Méan.

CRATÆGUS oxyacantha L. fl. mai, fr. septembre.

Haies et buissons, C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Romorantin : Haies de la rue Creuse.

C^ne^ de Courmemin : Bords de l'étang de la Grande-Bretèche.

C^ne^ de Lanthenay : Haie du chemin de la Malicorne, — *haie aux Étangs*.

Digitized by Google

C^ne de Millançay : Haíes à Villechenay.
C^ne de Neung : Buisson bordant la route départementale n° 1 un peu au Nord du pont d'Avignon.
C^ne de Billy : Haie du val de Sauldre.
C^ne de Gièvres : Haies à Jaugy.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Haies près la Cave, et encore :
C^ne de Veilleins, — Forêt de Bruadan.

CRATÆGUS monogyna Jacq. fl. mai, fr. septembre.
Haies et buissons, C.C.

PYRUS communis L. fl. mai-juin, fr. septemb.
Pâtureaux.

Var. **achras** et **pyraster**, A.C.

═══ **cordata** Desv. Mai.
Bois, buissons, R.R.
C^ne de Pruniers : Bois de l'Abbaye.
C^ne de Selles-S^t-Denis : Bords du canal de Migereau entre le barrage de la Sauldre et Bois-Méan.

═══ **malus** L. *(malus communis Poir.)* Mai.
Bois, haies, pâtureaux, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :
C^ne de Pruniers : Pâtureau au Nord-Est de Longueville.
C^ne de Gièvres : Pâtureau de Jaugy.

═══ **acerba** D.C. *(malus acerba Mérat.)* Mai.
Haies, bois, pâtureaux, A.R.

Digitized by Google

C^ne de S^t-Julien : Bois au Sud de la route de S^t-Julien à S^t-Loup vis-à-vis Olivet.

C^ne de Villefranche : *Pâtureaux de la Parconière dans le val du Cher.*

SORBUS domestica L. Mai.
Bois, pâtureaux, A.R.

C^ne de Millançay : Pâtureau de la Martière, — forêt de Bruadan.

C^ne de S^t-Loup : Bois à Sauveterre.
Souvent planté près des habitations.

═══ **aucuparia** L. Mai-septembre.
Bois, R.R.

C^ne de Pierrefitte-sur-Sauldre : Bois bordant la route de Salbris à Pierrefitte, vis-à-vis la Gravette.

C^ne de Souesmes : Bois de la rive gauche de la Sauldre entre le pont de Pierrefitte et Longate.

═══ **torminalis** Crantz. fl. mai, fr. septemb.
Bois, R.

C^ne de Millançay : Pâtureau de la Martière, — forêt de Bruadan.
Quelquefois planté près des habitations.

ONAGRARIÆ D.C.

EPILOBIUM palustre L. Juillet-août.
Marais tourbeux, R.R.

C^ne de Pruniers : Marais Chaunet.

Digitized by Google

ONAGRARIÆ

EPILOBIUM tetragonum L. Juillet-août.
Marécages, C.

Je l'ai récolté à feuilles très étroites sessiles et à feuilles plus larges pétiolées supérieurement.

═══ **roseum** L. Juillet-août.
Lieux humides.

Cⁿᵉ de Neung : Je n'ai trouvé qu'un seul individu dans un fossé du parc de Villemorand.

═══ **montanum** L. Juillet-octobre.
Bois, R.

Varie à tiges simples ou rameuses et à feuilles atténuées ou arrondies à la base plus ou moins pétiolulées.

Cⁿᵉ de Sᵗ-Julien : Pentes d'un bois traversé par un ruisseau, au Sud et près de la route de Sᵗ-Loup, vis-à-vis Olivet, — garenne de Valette.

Cⁿᵉ de Sᵗ-Loup : Parties basses des bois de la côte du Cher entre Sauveterre et Sᵗ-Loup, C., — val du ruisseau de la Grange dans le bois du Fondereau.

Cⁿᵉ de Ségy : Rouère du Coupe-Gorge.

═══ **lanceolatum** Seb. et Maur. Juillet-septembre.
Bords des chemins et fossés, bois, A.R.

Cⁿᵉ de Lanthenay : Bords d'un fossé de la route de Blois, près Romorantin.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Ados du fossé oriental du bois de Longueville, — pied de la haie du jardin de la ferme en regard de ce bois.

C^ne de Langon : Bords du chemin entre la Fleurière et Bois-au-Frère.

C^ne de S^t-Julien : Bords du chemin entre le bourg et l'église près le ruisseau, — talus du fossé du chemin en allant de Valette à La Chapelle-Montmartin.

C^ne de S^t-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et S^t-Loup, — Bords des chemins ombragés descendant vers le Cher et vers la Prée en allant de S^t-Loup à Mennetou.

C^ne d'Orçay : Bords d'un fossé dans le bourg.

C^ne de Pouillé : Lisière d'un bois près d'un ravin.

EPILOBIUM parviflorum Schreb. Juillet-septembre.

Marécages, bords des eaux, C.

= **hirsutum** L. Juin-juillet.

Bords des eaux, C. Plus particulièrement aux bords du canal du Berry et des fosses d'emprunt qui le bordent.

= **angustifolium** L. Juin-juillet.

Bois, R.R.

C^ne de Loreux : *Forêt de Bruadan sur le côté oriental de l'allée du Roi entre deux ronds-points sur une petite étendue.*

Digitized by Google

ONAGRARIÆ

Cne de Marcilly-en-Gault : *Forêt de Bruadan sur le côté Sud de la route de Millançay à Marcilly dans une clairière marécageuse.*

ŒNOTHERA biennis L. Juin-août.
Val du Cher, val de la Sauldre, A.C.

ISNARDIA palustris L. Juin-août.
Ruisseaux, fossés inondés, bords des étangs, C. notamment :

Cnes de Lanthenay et de Villeherviers : Le Rantin à Queue-de-Loup.

Cne de Pruniers : Le ruisseau de Bâtarde près la Cornuère.

Cne de Vernou : Étang de Grosaulne.

Cne de Villeherviers : Le grand fossé au-dessous de la Doubletière.

Cne de Langon : Gardoir de Bois-au-Frère.

Cne de Villefranche : Contre-fossé du canal du Berry entre les ponts de l'Escourioux et de Villebrette.

Cne de Gièvres : Marécages aux Petits-Étangs.

Cne de Lassay : Fossé d'écoulement du trop plein de l'étang Paris.

Cne de La Ferté-Imbault : Marécages précédant la queue de l'étang de Bièvre au bas de Boiquillon.

Je l'ai trouvé encore Cnes de Loreux,— Neung-sur-Beuvron, — La Ferté-Imbault, Theillay, — Gy.

Digitized by Google

CIRCÆA lutetiana L. Juillet-août.

Haies et bois humides, A.R.

C^ne de Loreux : Haie d'un pré à l'angle des chemins de Rosières à la Gravelle et de Lavau à la Gravelle, R.R.

C^ne de Pruniers : *Haie du grand pâtureau de la Cornuère.*

C^ne de Villeherviers : Bas du parc du Portail.

C^ne de S^t-Julien : Garenne de Valette, — bords du ruisseau dans le bois sis au Sud et près de la route de Saint-Loup vis-à-vis Olivet.

C^ne de S^t-Loup : Parties basses des bois de la côte du Cher entre Sauveterre et S^t-Loup, — bords du ruisseau de la Grange.

HAROLAGEÆ R. Br.

MYRIOPHYLLUM verticillatum L. Juin-juillet.

Fosses, A.R.

C^ne de Lanthenay : Fosse communiquant avec la Sauldre près et en amont du moulin de Longuevalle.

C^ne de Pruniers : Fosse du val de la Sauldre entre Beauvais et les Quatre-Roues.

C^ne de Villefranche : *Fosse dans l'île de l'Escourioux*, — contre-fossé du canal du

Digitized by Google

Berry (rive droite) entre le pont de l'Escourioux et celui de Villebrette.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Fosse communiquant avec la Sauldre près et en amont du pont-canal.

MYRIOPHYLLUM spicatum L. Juin-août.

A.C. Eaux paisibles.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Romorantin : Fosse entre les marnières et l'étang des Monteaux.

Cne de Lanthenay : Marnières de la Dabinerie, — étang de Courmin.

Cne de Villefranche : Contre-fossé du canal du Berry, rive droite, entre le pont de l'Escourioux et celui de Villebrette.

Cne de Soings : Lac de Soings.

═══ **alterniflorum** D.C. Mai-juillet.

Étangs et fosses, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Loreux : Étang de Masinière, — fosse contiguë à l'étang Dernier.

Cne de Vernou : *Étang de Grosaulne.*

Cne de Pruniers : Étang de la Pommerie, — fosse dans des bruyères sises entre les Landes et la Chapelle, — fosse dans le val de la Sauldre entre Beauvais et les Quatre-Roues, — la Sauldre au gué des Moulins-Neufs.

Cne de Villeherviers : *Étang Bardin,* — fosse dans un pâtureau du Clos-Thion près les Fontenils.

Digitized by Google

C^ne de Lassay : Petit étang dans des bruyères près et en amont du château du Moulin.

C^ne de Mur : Fosse bordant la route de Mur à Soings.

Je l'ai trouvé encore communes de Millançay, Veilleins, — Salbris.

TRAPA natans L. Juin-septembre.

Étangs.

C^ne de Loreux : Étang d'En-Haut, R., — étang d'En-Bas, — étang Dernier ou Regnier, C.C.

C^ne de Pruniers : *Étang de la Pommerie.*

C^ne de Vernou : Petit étang près et à l'Est des Nardillays.

C^ne de Lassay : Étang-Neuf.

HIPPURIDEÆ Link.

HIPPURIS vulgaris L. Mai-juillet.

C^ne de Villefranche : Trouvé trois fois à trois endroits différents dans le canal du Berry entre le pont de l'Escourioux et celui de Villebrette.

CALLITRICHINEÆ Link.

CALLITRICHE stagnalis Scop. Mai-juin.

Eaux tranquilles et ruisseaux, C.

verna Kütz. Mai-juin.

Eaux tranquilles et ruisseaux, C.

Digitized by Google

Varie à fruits sessiles et pédonculés (*C. pedunculata* D.C.) sous cette dernière forme je l'ai observé notamment :

C^ne de Lanthenay : Fossé du chemin longeant les terres de la Dabinerie immédiatement avant l'allée de Longueville, — fossé du chemin près la Malicorne, — bords desséchés de l'étang de Courmin sur le sable où il affectait la forme de l'*Elatine paludosa*.

C^ne de Pruniers : Fossé de l'allée de Longueville en allant à la Cornuère.

CALLITRICHE hamulata Kütz.

C^ne de Loreux : Large fossé longeant au Nord la route de Romorantin à Salbris vers la borne n° 10. Je l'y ai trouvé abondamment mais, par suite du développement des arbres qui entourent ce fossé, il est possible qu'il disparaisse.

CERATOPHYLLEÆ Gray.

CERATOPHYLLUM submersum L. Septemb. Eaux dormantes, R.

C^ne de Pruniers : Fossé entre le jardin et la maison d'habitation de Champleroy.

C^ne de Selles-sur-Cher : Lit du Cher dans une fosse isolée au bas du parc du château.

C^ne de Gièvres : Angle Nord-Ouest d'un large fossé d'enceinte au-dessous et au Nord de la Grange de Rère.

Digitized by Google

CERATOPHYLLUM demersum L. Juillet-août.
Étangs, mares, fosses, C.
Ne fructifie pas toujours.
Je l'ai récolté en fruits notamment :
C^ne de Lanthenay : Étang de la Pesnière, — fosse communiquant avec la Sauldre immédiatement en amont du moulin de Longuevalle.

LYTHRARIEÆ Juss.

LYTHRUM salicaria L. Juillet-août.
Bords des eaux et lieux humides, C.
= **hyssopifolia** L. Juillet-septembre.
Lieux humides et surtout aux bords des étangs.
Varie à tiges radicantes, R. et à tiges non radicantes, A.C. ainsi :
C^ne de Lanthenay : Fossé oriental de la route de Romorantin à Vernou près la Pesnière.
C^ne de Pruniers : Bords de l'étang de la Châtre.
C^ne de Veilleins : Bords de l'étang Fleuri.
C^ne de Villefranche : Bords d'une mare à la Bezardière, — val du Cher.
C^ne de Marcilly-en-Gault : Bords de l'étang de Bièvre.
C^ne de S^t-Viâtre : Bords de l'étang de Marcilly.
Je l'ai en outre observé communes de Loreux, — Langon, — La Ferté-Imbault, Theillay, — Gy, Lassay.

Digitized by Google

PEPLIS portula L. Juillet-septembre.
Bords des marais, des ruisseaux, des étangs, fossés humides, C.C.

CUCURBITACEÆ Juss.

BRYONIA dioica Jacq. Mai-juillet.
Haies, buissons, C.
On cultive à Romorantin et aux environs les
Cucurbita maxima D. (citrouille).
Cucumis sativus L. (cornichon).
Cucumis melo L. (melon).

PORTULACEÆ Juss.

PORTULACA oleracea L. Juin-septembre.
Jardins, vignes, lieux cultivés, C.

MONTIA minor Gmel. Avril-août.
Moissons sablonneuses et humides, C.C.

rivularis Gmel. Mai-juin.
Fossés aquatiques et filets d'eau, R.
C^ne^ de Romorantin : Aux Berthets dans le fossé Sud du chemin de la Fringale.
C^ne^ de Pruniers : Fossé oriental de la route entre Beauvais et les Quatre-Roues.
C^ne^ de Souesmes : Marais au Sud de Falaze, — ruisseau descendant dans la Sauldre en amont du pont de Pierrefitte.

Digitized by Google

PARONYCHIEÆ St-Hil.

POLYCARPON tetraphyllum L. Juin-octobre.
Cour de ma maison à Romorantin où il persiste depuis 1861 malgré un pavage nouveau et à ciment. Je ne l'ai pas rencontré ailleurs si ce n'est dans deux jardins m'appartenant : l'un contigu à ma cour et l'autre peu éloigné et où les graines auront été introduites comme elles l'ont été vraisemblablement dans ma cour. C'est tout au plus une espèce naturalisée.

ILLECEBRUM verticillatum L. Juillet-octob.
Terrains siliceux et humides, C.C. surtout dans les années humides.

HERNIARIA glabra L. Mai-septembre.
Grèves des rivières et étangs, lieux sablonneux, C.

═══ **hirsuta** L. Mai-septembre.
Grèves des rivières et étangs, lieux sablonneux, C.

CORRIGIOLA littoralis L. Juin-octobre.
Champs sablonneux et frais, grèves des rivières et des étangs, C.

SCLERANTHUS annuus L. Mai-octobre.
Moissons et terrains sablonneux, C.C.

═══ **perennis** L. Mai-octobre.
Lieux sablonneux et incultes, bords des routes, C.

Digitized by Google

CRASSULACEÆ D.C.

TILLÆA muscosa L. Mai et juin, reparaît en septembre et octobre.

Vignes, chemins, terrains sablonneux incultes et humides, A.C.

C^ne^ de Romorantin : Allées de mon jardin où il résiste au cerclage.

C^ne^ de Lanthenay : Sentiers des vignes entre le chemin des Morts et le ruisseau de la Nasse, — bords du chemin bas allant du Petit-Queue-de-Loup au Grand-Vauvert.

C^ne^ de Loreux : Chaussée entre les étangs d'En-Haut et d'En-Bas.

C^ne^ de Pruniers : Chemin de Romorantin à Pruniers au-delà du ruisseau des Beaunes, — terre des Landes bordant le chemin de Romorantin à Bâtarde.

C^ne^ de Villeherviers : Chemin du Liot, — pelouses près la Doubletière.

C^nes^ de Villefranche et de Gièvres : Sables contigus aux pins de l'Escourioux.

C^ne^ de Gy : Chemin entre Lassay et le moulin Tardieu ou Lardilleux.

Je l'ai trouvé encore communes de Millançay, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, Selles-St-Denis.

SEDUM telephium L. Août-septembre.

Lieux frais, haies, bois, A.C.

C^ne^ de Romorantin : Val du Rantin.

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Vigne à l'angle de la route de Salbris et du chemin allant de Longue-valle à Queue-de-Loup.

C^ne de Pruniers : Val de la Sauldre à Champleroy.

C^ne de Villefranche : haies du val du Cher en amont de l'Escourioux.

C^ne de Selles-sur-Cher : En bas de la Colinière.

C^ne de Gièvres : Haies du val du Cher.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Forêt de Bruadan.

SEDUM cepæa L. Juillet-août.

Pieds des haies de Romorantin et des environs, C.

═══ **rubens** L. Juillet-août.

Bords des chemins, talus gazonnés, pieds des haies, C.

═══ **pentandrum** Bor. *(S. Villosum* var. *pentandrum* G.G.) mai-juin.

Fossés, moissons et champs des terrains humides et sablonneux, C.

═══ **album** L. Juin-juillet.

Vieux murs et toitures non réparées, C.

═══ **micranthum** Bast. Juillet.

Grèves et oseraies bordant le Cher en amont de l'Escourioux. Je ne l'ai pas observé ailleurs.

═══ **acre** L. Mai-juin.

Bords des chemins, lieux pierreux, murs, C.

Digitized by Google

CRASSULACEÆ

SEDUM reflexum L Juin-juillet.

Bords des chemins, lieux pierreux incultes, C. notamment :

C^ne de Lanthenay : Bords du chemin de Rioubert bordant à l'Est un pré de la Pesnière à son embranchement sur la route de Romorantin à Vernou.

═══ **elegans** Lej. Juin.

Clairières des bois, A.R.

C^ne de St-Julien : Bois entre le château de Valette et la route de St-Julien à La Chapelle-Montmartin.

C^ne de St-Loup : Bois de la rive droite du Roulier près la ferme du Roulier.

C^ne de Selles-sur-Cher : Clairières du bois traversé par la route nationale de Selles à Blois n° 156.

C^ne de Soings : Bords de l'ancien chemin de Soings à Mur près d'un taillis.

═══ **albescens** Haw. Juillet.

C^ne de Villefranche : Grèves et oseraies bordant le Cher en amont de l'Escourioux. Je ne lai pas observé ailleurs.

SEMPERVIVUM tectorum L. Juillet.

Toitures en chaume où il se présente fréquemment. Le nombre des toits de chaume diminue chaque année.

Digitized by Google

Autre Espèce de Loir-et-Cher.

SEDUM *boloniense* Lois. Avaray, A.B. (M. Roger).

GROSSULARIEÆ D.C.

RIBES uva-crispa L. fl. avril, fr. juillet.
Haies, C.

═══ **nigrum** L. Avril-mai.
Haies et buissons.
C. dans le val du Cher.
A.C. dans le val de la Sauldre.
R. ailleurs : C^ne^ de La Ferté-S^t^-Cyr près Villabry.

SAXIFRAGEÆ Juss.

SAXIFRAGA granulata L. Fin Avril-juin.
Prés hauts et secs, bords des bois, ados des fossés, C.C.

═══ **tridactylites** L. Avril-juin.
Champs sablonneux, et surtout toitures des maisons, C.C.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

CHRYSOSPLENIUM *oppositifolium*. Sargé, A.V. (M. Léon Legué).

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ Juss.

DAUCUS carota L. Juin-octobre.
Prés, pâtureaux, champs, C.C.

TURGENIA latifolia Hoffm. Juin-juillet.
Moissons des terrains calcaires, A.C.
Ne se trouve pas ailleurs.
C^ne^ de Romorantin : Moissons de la Richaudière.
C^ne^ de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière.
C^ne^ de Maray : Moissons à Daluet.
C^ne^ de Villefranche : Moissons de la Gaudinière au Pérou.
C^ne^ de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.
C^ne^ de Gièvres : Moissons calcaires du Vivier, — du champ des Calabres.
C^ne^ de Châteauvieux : Moissons à Péquignon.

CAUCALIS daucoides L. Mai-juillet.
A.C. mais dans les moissons des terrains calcaires seulement.
Mêmes localités que le *Turgenia* et de plus :
C^ne^ de Lanthenay : Moissons aux Petits-Guideaux.
C^ne^ de Pruniers : Moissons calcaires de la Maison-Blanche.

TORILIS anthriscus Gmel. Juillet-août.
Haies, buissons, C.

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ

TORILIS helvetica Gmel. Juillet-août.
Haies, buissons, C.

nodosa Gœrtn. Juin-juillet.
Pied des haies, lieux secs et incultes, A.R.
C^ne^ de Lanthenay : Talus bordant le chemin creux près Moscou, — talus gazonnés bordant le chemin des Verdons en se rapprochant de Mousseaux.
C^ne^ de Pruniers : Abords de l'église.
C^ne^ de Villefranche : Pentes méridionales entre Villebrette et le canal.
C^ne^ de Gièvres : Environs de Jaugy, — champs des Calabres.

LASERPITIUM latifolium L. Var. *asperum*
Juillet-août.
Bois.
C^ne^ de Noyers : Forêt de Grosbois près et au Nord des carrières de Belleroche, R.R.

ANGELICA sylvestris L. Juillet-août.
Bords des eaux, prés et pâtureaux humides, C.C.
C^ne^ de Villeherviers : Bords du Grand-Fossé.
C^ne^ de Maray : Bords du ruisseau de Daluet.
C^nes^ de Villefranche et de Gièvres : Bords du canal du Berry et val du Cher.
C^ne^ de Gy : Val de la Croisne.

PEUCEDANUM parisiense D.C. Juillet-octob.
Bois, landes, pâtureaux, C.

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ

PEUCEDANUM oreoselinum Mœnch. Août. Bois, buissons, pâturages, A.C.

C^ne de Romorantin : Bord septentrional de la route de Romorantin à Theillay entre la Ratière et Longuevalle, R.R., — Terres à l'Ouest des marnières des Monteaux, C., — bruyères des Monteaux.

C^ne de Pruniers : Val de la Sauldre (rive droite) dans un pâtureau de Marmagne, — id. dans une terre des Moulins-Neufs, — lisière d'un bois aux Vérières, C.

C^ne de Villeherviers : Val de la Sauldre (rive gauche), vis-à-vis Moulin-Neuf.

C^ne de Gy : Dans la région des nombreux marais de la rive droite de la Croisne.

palustre Mœnch. Juillet-septembre. Marais et bords des étangs et ruisseaux marécageux, A.C.

C^ne de Vernou : Bords du Néant près le château de Villeneuve.

C^ne de Villeherviers : Marais de la rive gauche de la Sauldre, à mi-côte, vis-à-vis l'île de Trécy, R.R.

C^nes de Salbris, La Ferté-Imbault et S^t-Viâtre : Bords du Méant, A.C.

C^ne de La Ferté-Imbault : Bords de l'étang de l'Écluse.

Digitized by Google

Cne de Pierrefitte : Rive droite de la Boute-Vive entre le pont et le gué de Cerbois, R.

Cne de St-Viâtre : Marécages à la queue de l'étang de Favelle.

Cne de Gy : Marais nombreux de la rive droite de la Croisne, en se rapprochant de Piedsauvron, C.C.

PASTINACA sativa L. Var. *sylvestris* D.C. Août-septembre.
Terrains frais et calcaires, R.

Cnes de Romorantin et Lanthenay : Terres calcaires sur les limites des deux communes aux Verdons et aux Chailloux.

Cne de Gièvres : Large fossé d'enceinte au-dessous et au Nord de la Grange de Rère.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bords du chemin bas près le bois de la Cave.

HERACLEUM sphondylium L. Juillet-octobre.
Prés humides, fossés humides, bords du canal du Berry, C.

TORDYLIUM maximum L. Juillet-août.
Moissons, bords des haies, A.C. aux environs de Romorantin.

Cnes de Romorantin, Lanthenay, Villeherviers, — La Chapelle-Montmartin, Saint-Julien, Villefranche, — Selles-St-Denis, — Gièvres.

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ

SILAUS pratensis Bess. Juillet-septembre.
Prés, pâtureaux, pacages, C.

SESELI montanum L. Août-septembre.
Pelouses sèches, R.
C^ne^ de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, R.
C^ne^ de Noyers : Carrières de Belleroche, A.C.

═══ **coloratum** Ehrh. Août-octobre.
C^ne^ de Romorantin : Bruyères des Monteaux, C.C.
Depuis leur défrichement la plante n'existe plus que dans le chemin qui les traverse.

FÆNICULUM vulgare Gœrtn. Juillet-août.
Coteaux stériles, R.R.
C^ne^ de Selles-sur-Cher : Bords du chemin faisant suite au hameau de la Thizardière, sur la hauteur, entre deux écluses, R.R.
C^ne^ de Noyers : Carrières de Belleroche.
Çà et là auprès des habitations où il n'est pas spontané.

ÆTHUSA cynapium L. Juillet-septembre.
Jardins, cultures, voisinage des habitations, pieds des haies, C.

ŒNANTHE pimpinelloides L. Juin-juillet.
Prés, pâtureaux, pacages, A.C.
C^ne^ de Pruniers : Prés de la rive gauche du ruisseau de Bâtarde en amont et près du pont de Marmagne.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Prés de la Sauldre au Portail et à Trécy, R.

Cne de la Chapelle-Montmartin : Bois bordant le chemin de St-Julien à la Chapelle-Montmartin, — bois au Sud du bourg, — parties basses des tailles de Ruines.

Cne de St-Julien : Prés du val du Cher.

Cne de St-Loup : Bois, pâtureaux et prés de la côte et du val du Cher, — bois de la rive droite du Roulier près la ferme de ce nom.

Cne de Villefranche : Prés et pâtureaux du val du Cher à l'Escourioux et en amont.

Cne de Gièvres : Val du Cher, — prés hauts à Jaugy, — pâtureau de la Chesnaye.

Je l'ai trouvé en outre Cne de Gy.

ŒNANTHE Lachenalii Gmel. Juillet-août.
Prés tourbeux ou humides.

Cne de Romorantin : Fossés et *Bruyères des Monteaux*.

Cne de Pruniers : Prés humides du ruisseau de Bâtarde près la Cornuère et la Besaudière, C. — *Pré des Vérières*, C.

Cne de Villeherviers : Prés tourbeux de la Sauldre, particulièrement en amont du parc du Portail.

peucedanifolia Poll. Mai-juin.
Prés, pacages humides, C.

fistulosa L. Juin-juillet.
Marécages, fossés marécageux, C.

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ

ŒNANTHE phellandrium L. Juillet-août.
Marais, étangs, C.

BUPLEURUM protractum Link et Hoffm. Juin-juillet.
Moissons calcaires.
C^ne de Châteauvieux : Moissons de Péquignon.

═══ **tenuissimum** L. Août.
Terres incultes et pelouses dénudées dans le voisinage du calcaire, R.
C^ne de Pruniers, val de la Sauldre : 1° *pacages incultes aux Vérières ;* 2° parties dénudées de la pelouse au gué des Moulins-Neufs.
C^ne de Villeherviers : Terre entre les grandes marnières des Roches et la route de Romorantin à Theillay, C.

BERULA angustifolia Koch. Août-novembre.
Marais et fossés fangeux, C.

PIMPINELLA magna L. Juillet-septembre.
Prés, haies et bois humides, A.R.
C^ne de Pruniers : Pâtureau des Bresolles.
C^ne de Maray : La Pelaudière, — Daluet.
C^ne de Salbris : Prés de la rive droite de la Sauldre au Thou.
C^ne de Gièvres : Côté occidental d'un large fossé d'enceinte au-dessous et au Nord de la Grange de Rère.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

═══ **saxifraga** L. Juillet-octobre.

Digitized by Google

Pâtureaux, bruyères, pelouses sèches, bords des chemins, C.C.

BUNIUM verticillatum G.G. *(carum verticillatum Koch.)* Juillet-septembre.
Bois, pâtureaux, bruyères, prés et pacages humides, C.

═══ **bulbocastanum** L. Juin.
Je l'ai trouvé une seule fois
C^ne^ de Gièvres : Champ calcaire des Calabres.

SISON amomum L. Juillet-septembre.
Haies humides, bords des champs et sentiers boisés dans les terrains calcaires.
C^ne^ de Lanthenay : Haie et fossé de la rue des Verdons vers son milieu, R.R., — chemin entre la rue des Verdons et l'ancien petit pâtureau de la Dabinerie, R.R.
C^ne^ de Mennetou : Pied de la haie de la route de Nevers à Tours près et à l'Ouest de Mennetou, R.
C^ne^ de S^t^-Julien : *Sentier dans le bas de la garenne de Valette.*
C^ne^ de Gièvres : Bords d'un large fossé d'enceinte au-dessous et au Nord de la Grange de Rère.
C^ne^ de Rougeou : Pied d'une haie à Bois-Biffault sur les limites de Rougeou et de Chémery.

HELOSCIADIUM nodiflorum Koch. Juillet-septembre.
Ruisseaux, fossés, C.C.

Digitized by Google

UMBELLIFERÆ

HELOSCIADIUM inundatum Koch. Mai-juin. Mares, fossés, étangs, C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Romorantin : Mare bordant à l'Est le chemin de Romorantin à S^t^-Marc.

C^ne^ de Lanthenay : Fosses d'extraction de terres glaises près et à l'Ouest de la route de Romorantin à Vernou, — marais au Sud de l'étang de Courmin, — étang de la Pesnière, — fosse entre les tailles du Lieu et la route de la forêt presque vis-à-vis l'allée de la ferme des Bruyères, etc.

C^ne^ de Pruniers : Fosses dans des bruyères entre les Landes et la Chapelle, — marais dans des bruyères contiguës aux marnières de la Cornuère.

C^ne^ de Villeherviers : Fossés dans des bruyères du Portail en amont du parc, — le Riau-Mabon près la route de la Fringale.

C^ne^ de Langon : Gardoirs de Bois-au-Frère.

C^ne^ de Villefranche : Fossés dans les prés et pacages bordant à l'Ouest la terre du Pérou, C.C.

C^ne^ de la Ferté-Imbault : Canal traversé par la route de Romorantin à Salbris entre le pont sur la Sauldre et la Ferté-Imbault.

Je l'ai trouvé encore : C^nes^ de Loreux, Veilleins, Vernou, — Mennetou, — Salbris, Selles-S^t^-Denis, — Selles-s-Cher, Gièvres, Lassay, Mur.

Digitized by Google

PETROSELINUM segetum Koch. Août.

C^ne^ de Romorantin : Haie orientale du chemin des Petits-Guideaux près des limites de la commune, R.R.

C^ne^ de Lanthenay : *Haies du chemin des Grands-Guideaux.*

Je l'ai trouvé une fois abondamment dans des moissons bordant le chemin de la Malicorne; il n'y a pas reparu depuis.

SCANDIX pecten-veneris L. Mai-juillet.

Moissons, C. surtout dans les terrains calcaires.

ANTHRISCUS vulgaris Pers. Avril-juin.

Pied des haies, vieux murs, A.C. notamment :

C^ne^ de Romorantin : Les Crottés, le Bas-Mail, le Grand-Jardin.

C^ne^ de Lanthenay : le Chemin-Creux au-delà de Moscou.

C^ne^ de Pruniers : Haie du chemin entre le ruisseau de Bâtarde et la Cornuère.

CHŒROPHYLLUM temulum L. Mai-juillet.

Haies, C.C.

CONIUM maculatum L. Juin-septembre.

Voisinage des habitations, terrains frais et décombres, A.C., notamment :

C^ne^ de Romorantin : Rue des Haies, — extrémité de la rue de Beauvais, — le Galop, — les Crottés, etc.

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Cour des Granges.
Cne de Maray : Grammont.

HYDROCOTYLE vulgaris L. Juin-septembre.
Bords des marais, des étangs et fossés, C.

ERYNGIUM campestre L. Juillet-octobre.
Bords des chemins, lieux incultes, C.

SANICULA Europœa L. Mai-juin.
Bois, A.C.
Cne de St-Julien : Garenne de Valette, C.
Cne de St-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup, — bois bordant le ruisseau de la Grange.
Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger*.
Cne de Billy : Parc du château de Billy.
Cne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère*.
Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.
Cne de St-Aignan : Parc du Château.
Cne de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche.
Je l'ai trouvé encore : Cnes de Loreux, Millançay, — Châteauvieux, Ségy.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

ORLAYA *grandiflora*, Hoffm. Cnes de Contres et Tour-en-Sologne, A.B. (M. Franchet).
SELINUM *carvifolia* L. Marais de Poulines, A.V. (M. Peltereau).
ANETHUM *graveolens* L. Cne de Cour-Cheverny, A.B. (M. Franchet).

Digitized by Google

ARALIACEÆ

PEUCEDANUM *cervaria* Lapey. Bois des Beauvoirs, A.V. (M. Rolland).

— *carvifolium* Vill. Avaray, A.B. (M. Roger).

BUPLEURUM *rotundifolium* L. Avaray, A.B. (M. Roger).

— *aristatum* Bart. Chaussée St-Victor, A.B. (Dr Monin).

— *falcatum* L. environs de Blois, A.B. (Dr Monin).

SIUM *latifolium* L. Candé, A.B. (M. Franchet).

ÆGOPODIUM *podagraria*, L. Blois, A.B. (M. Mathonnet).

AMMI *majus* L. Avaray, A.B. (M. Roger).

FALCARIA *Rivini* Host. La Chapelle, A.V.(M. Mathonnet).

HELOSCIADIUM *repens* Koch. De St-Quentin à Montoire, A.V. (M. Peltereau).

CICUTA *virosa* L. Tour-en-Sologne, A.B. (MM. Mathonnet et Franchet).

ANTHRISCUS *sylvestris* Hoffm. Avaray, A.B. (M. Roger).

CONOPODIUM *denudatum* Koch. Azé, A.V. (M. L. Legué).

NOTA. — L'*Apium graveolens* L. paraît naturalisé dans un fossé du jardin de Montauger, commune de Villefranche près Romorantin, il y croît abondamment et on ne se souvient pas qu'il y ait été planté.

J'ai reçu le *Smyrnium olusatrum* récolté sur la terrasse du jardin de l'Évêché de Blois où il a été introduit.

ARALIACEÆ Juss.

HEDERA helix L. Septembre-fevrier.
Bois, troncs d'arbres, vieux murs, C.C.

Digitized by Google

CORNEÆ D.C.

CORNUS sanguinea L. Mai-juin.
Haies, C.

Autre Espèce de Loir-et-Cher.

CORNUS *mas*. L. Forêt de Russy, A.B. (M. Moreau).
— Naturalisé aux Montils, A.B. (M. Franchet).

LORANTHÆ Juss. et Rich.

VISCUM album L. fl. mars-avril, fr. novemb.
Parasite particulièrement sur les *Pyrus*, *Malus*, *Sorbus*, *Populus*, C.

NOTA. — M. Franchet l'a trouvé sur le *Quercus sessiliflora* dans le parc de Cheverny (Loir-et-Cher).

CAPRIFOLIACEÆ Rich.

ADOXA moschatellina L. Avril.
Haies et pâtureaux, R.R.
Cne de St-Julien : Garenne et pâtureau de Valette, C. — Partie haute et occidentale d'un taillis à l'Est d'Olivet. — Angle d'un bois longeant à l'Est la route de Graçay entre St-Julien et les Terres-Rouges.
Cne de la Ferté-St-Cyr : Haies et bois aux environs de Villabry.

Digitized by Google

CAPRIFOLIACEÆ

SAMBUCUS ebulus L. Juillet-août.

Champs stériles et frais des terrains un peu calcaires.

C. seulement dans le canton de Mennetou et le val du Cher, R. ailleurs.

C^ne^ de Romorantin : *Pré de la maison Martin-Taillarda, faubourg d'Orléans.*

═══ **nigra** L. Mai-août.

Haies, C.

La variété *Laciniata* se trouve :

C^ne^ de Romorantin : Haie à l'angle de la rue du Lys et du chemin des Petits-Guideaux.

C^ne^ de Lanthenay : *Bords de la route de Romorantin à Salbris.*

VIBURNUM lantana L. Mai-juillet.

Pâtureaux, bois, A.C., mais seulement dans la région calcaire, notamment :

C^ne^ de Pruniers : Bois de la Gascetière, — Bois de l'Abbaye.

C^ne^ de Villeherviers : Pâtureau des Pelleteries, — pâtureau bordant la prairie de la rive droite de la Sauldre en arrivant aux Roches.

C^ne^ de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*

C^ne^ de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère.*

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

C^ne^ de Noyers : Abords des carrières de Belleroche.

Digitized by Google

VIBURNUM opulus L. fl. juin, fr. août.
Bois et pâtureaux humides, bords des eaux, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Ile du moulin des Bruyères.
C^ne de Lanthenay : Presqu'île de Longuevalle.
C^ne de Villeherviers : Haie de pâtureau à Forêts, — val de la Sauldre en amont du Portail, — bords du grand fossé à la Doubletière.
C^ne de St-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup.
C^ne de Neung-sur-Beuvron : Bois à Villemorand.
C^ne de Gy : Val de la Croisne à Piedsauvron.

LONICERA periclymenum L. Juin.
Haies, bois, buissons, C.

RUBIACEÆ Juss.

GALIUM cruciata Scop. Avril-juillet.
Prés, haies, buissons, pâtureaux, C.

═══ **verum** L. Juin.
Prés, pelouses, bords des chemins, C.

═══ **elatum** Thuill. *(mollugo L.)* Mai-juin.
Haies, buissons, prairies, C.

═══ **erectum** Huds. Mai-juin.
Bois.
Forêt de Bruadan.

Digitized by Google

RUBIACEÆ

GALIUM sylvestre Poll. Juin-juillet.
Bois, pelouses, A.R.
Varie à tiges et feuilles glabres et velues.
Cne de Pruniers : Terres de la Philippière.
Cne de St-Loup : Pelouses au pied des bois bordant le Roulier près la ferme du Roulier.
Cne de Billy : Le Tertre-Blanc.
Cne de Gièvres : Bois du Poulinat.
Cne de Mur : Chaussée d'un ancien étang près et à l'Ouest de la route de Romorantin à Blois entre l'arche des Rois et Mur.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

═══ **commutatum** Jord. Juin.
Cne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon, R.R.

═══ **palustre** L. Mai-juin.
Marais, fossés, C.

Var. **rupicola** Desm.
Cne de Loreux : Forêt de Bruadan près la Favorite.

═══ **elongatum** Presl. Juillet.
Marais, fossés.
Cne de Villeherviers : Bords du grand fossé à la Doubletière.

═══ **debile** Desv. Juillet.
Marais, C., notamment :
Cne de Lanthenay : Marais entre les étangs de Courmin et de Nobière.

Digitized by Google

RUBIACEÆ

GALIUM uliginosum L. Juillet-août.
Lieux marécageux.
C^ne de Romorantin : Bords d'une mare dans des bruyères de la rive gauche de la Sauldre entre la ferme du Portail et le moulin des Bruyères.
C^ne de Villeherviers : Prés spongieux de la Sauldre en amont du parc du Portail et du pont de Villeherviers.

= **aparine** L. Mai-juillet.
Haies, buissons, C.

= **tricorne** With. Juin-juillet.
Moissons, C. seulement dans les terrains calcaires.
C^ne de Pruniers : Moissons de la Maison-Blanche, de l'Abbaye.
C^ne de Maray : Moissons de Daluet.
C^ne de Villefranche : Terres calcaires de la Gaudinière.
C^ne de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.
C^ne de Gièvres : Champs des Calabres, — Moissons du Vivier, C.C.
C^ne de Châteauvieux : Moissons de Péquignon.
C^ne de Thésée : Val du Cher vis-à-vis la vallée de Chantereine.

ASPERULA cynanchica L. Juin-juillet.
Pelouses sablonneuses et incultes, C.

SHERARDIA arvensis L. Juin-août.
Pelouses, moissons, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Champs des Crottés.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Terres de la Philippière.
Cne de Veilleins : Bords de la route de Romorantin à Vernou, près Montgiron.
Cne de Langon : Val du Cher, C.
Cne de Maray : Val du Cher.
Cne de Châtillon-sur-Cher : Terres aux environs de la Cave.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

RUBIA *peregrina* L. Cnes de Celettes et Lavardin, A.B. et V. (M. Franchet et moi-même).
GALIUM *decolorans* G.G. Cour-Cheverny, A.B. (M. Franchet).
— *ambiguum* G.G. Cour-Cheverny, A.B. (M. Franchet).
— *parisiense* L. Avaray, A.B (M. Roger).
ASPERULA *odorata* L. Choue, A.V. (M. L. Legué).
— *arvensis* L. Avaray, A.B. (M. Roger).
CRUCIANELLA *angustifolia* L. Mer, A.B. (M. L. Legué).

NOTA. — J'ai trouvé l'*Asperula arvensis* à Daluet, commune de Maray, mais au pied des bâtiments et je n'ai pu dès lors l'y considérer comme spontané.

J'ai reçu de MM. Moreau et Mathonnet le *Rubia tinctorum* L. récolté à Blois. Sa proximité des habitations me fait croire qu'il y a été introduit.

VALERIANEÆ D.C.

VALERIANA officinalis L. Mai-juin.
Bois humides, C. notamment :

Digitized by Google

Cnes de Millançay et Loreux : Forêt de Bruadan.

Cne de Vernou : Bois aux Augères.

Cne de Villeherviers : Taille du Marais-Thion, — taille bordant le chemin de la Fringale à l'angle du chemin des Fontenils, — taillis de la rive gauche du Rantin au-dessus de Queue-de-Loup.

Cne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère.*

Je l'ai trouvé encore Cnes de Langon, St-Loup, Villefranche, — Gy.

VALERIANA dioica L. Avril-juin.

Prés marécageux, bois et pâtureaux humides, A.C., notamment :

Cne de Pruniers : Prés du ruisseau de Bâtarde voisins de la Besaudière et de la Cornuère, — *pré des Vérières.*

Cne de Villeherviers : Bas du parc du Portail, — bords de la Sauldre en aval et en amont du pont de Villeherviers.

Cne de Souesmes : Parc du château de Souesmes.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Prés humides de la Sauldre.

Je l'ai trouvé encore Cnes de Maray, St-Loup, — Gièvres, Mur.

VALERIANELLA olitoria Poll. Avril-mai.

Lieux cultivés, C.

Digitized by Google

VALERIANEÆ

VALERIANELLA carinata Lois. Avril.
Lieux cultivés, pied des haies, C.

═══ **auricula** D.C. Juin-juillet.
Moissons, C.C.
Varie à fruits glabres et pubérulents.

═══ **Morisonii** D.C. Juillet.
Moissons, R.
C^ne^ de Romorantin : Bords du chemin de la Richaudière à Villefranche près la Richaudière.
C^ne^ de Villefranche : Moissons calcaires de la Gaudinière où il varie à fruits glabres et pubérulents.
C^ne^ de Selles-S^t^-Denis : Moissons entre la route de Theillay et la Rère un peu à l'Ouest des Anges.

═══ **eriocarpa** Desv. Mai-juin.
Moissons, terres et champs calcaires ou voisins du calcaire.
C^ne^ de Romorantin : Cultures dans la rue des Limousins, R.R.
C^ne^ de Pruniers : Terres calcaires de la Gascetière, — de la Maison-Blanche, — de l'Abbaye.
C^ne^ de Billy : Terres calcaires du Tertre-Blanc.
C^ne^ de Gièvres : Terres calcaires des Calabres, — du Vivier, — de Jaugy.

═══ **coronata** D.C.
Moissons calcaires, R.

Digitized by Google

Cne de Soings : Moissons au Nord du lac et principalement celles bordant la nouvelle route de Soings à Contres vers la borne no 6, C.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Moissons au Sud de la route de Selles à Noyers vers les limites de Billy.

Cne de Thésée : Val du Cher, moissons vis-à-vis la vallée de Chantereine, R.R.

NOTA. — J'ai trouvé le *Centranthus ruber* D.C. sur les murs des fossés du château de La Ferté-Imbault. Je ne l'y crois pas spontané.

DIPSACEÆ D.C.

DIPSACUS sylvestris Mill. Août-octobre.
Bords des chemins, champs incultes, C.

KNAUTIA arvensis Koch. Août-octobre.
C. dans les terrains calcaires seulement.

SCABIOSA columbaria L. Juillet-septembre.
Prés secs et bruyères, C.

succisa L. Juillet-septembre.
Prés humides, clairières marécageuses des bois et pâtureaux, C.C.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

CEPHALARIA *pilosa* G.G. *(Dipsacus pilosus* L.) Vendôme, A.V. (M. Peltereau).

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

NOTA. — J'ai observé plus d'une fois le *Dipsacus fullonum* Mill. dans les îles et aux bords ds la Sauldre, communes de Romorantin et Lanthenay, mais il n'y était qu'accidentel et provenait de graines échappées des fabriques de draps.

SYNANTHEREÆ Rich.

1. — CORYMBIFERÆ Juss.

EUPATORIUM cannabinum L. Juillet-août.
Fossés, bords des eaux, Bois humides, C.

PETASITES officinalis Mœnch. Avril.
Cne de Gièvres : Levées de la rive droite et surtout de la rive gauche du Berry au bas du village de Gièvres et un peu en amont.
NOTA. — Croît aux bords de l'eau dans la cour du château de Chaon, canton de Lamotte, d'où je l'ai reçu.

TUSSILAGO farfara L. fl. mars-avril fr. mai.
Pentes des anciennes marnières et terrains calcaires et humides, A.C. notamment :
Cne de Romorantin : Terre calcaire située à l'extrémité du chemin des Arrogantes, — marnières des Monteaux.
Cne de Lanthenay : Pentes des anciennes marnières aux environs de Romorantin.
Je l'ai trouvé encore Cnes de Pruniers, — St-Loup, Maray, etc.

SOLIDAGO virga-aurea L. Septembre.
Bruyères, berges du chemin de fer du Centre, C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

ERIGERON Canadensis L. Juillet-août.
Champs, C.C.

——— acris L. Mai-juin, Septembre-octobre.
Bruyères, pelouses, bords des chemins, C.

BELLIS perennis L. Avril-octobre.
Pelouses, prairies, C.C.

ARNICA montana L. fin mai-juin.
Landes, pâtureaux, pacages, clairières et bords des bois, C., se trouve accidentellement à feuilles alternes et à feuilles verticellées par trois.

C^ne^ de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

C^ne^ de Lanthenay : *Bruyères de la rive gauche du Rantin au-dessous de Queue-de-Loup.*

C^ne^ de Pruniers : Pâtureau de Longueville, — pâtureau de la Petite-Robinière, — landes bordant à l'Est l'étang de la Pommerie, — bruyères bordant l'allée de Longueville en allant à la Cornuère, R., — Clairières des bois au Sud-Ouest de Bâtarde.

C^ne^ de Villeherviers : *Bruyères de la rive droite de l'étang de Cornilly*, — bruyères en arrivant à Béjarie, C.C., — pâtureau du Clos-Thion près les Fontenils, C.C.

C^ne^ de Dhuizon : Bois bordant la route de Romorantin à Dhuizon.

Digitized by Google

Cne de la Ferté-St-Cyr : Bois bordant la route de Dhuizon à la Ferté-St-Cyr.

Cne de Thoury : Bruyères bordant le chemin de Dhuizon à Thoury vers les limites des deux communes.

Cne de Marcilly-en-Gault : Bords de la prairie entre les étangs de l'Aunay et de Courcelles.

Cne de Souesmes : Pré haut de la rive droite de la Boute-Morte bordant l'ancien chemin de Pierrefitte à Souesmes, — bruyères de la rive gauche de la petite Sauldre vers les limites du département.

Cne de Theillay : Bruyères bordant le chemin de Romorantin à Theillay près le château de Rère, — bruyères de la rive droite de la Rère en amont et près le pont de la Loge.

Cne de Gièvres : Pacage de la Berrerie contigu au pré du Chêne-Rabâteux.

SENECIO vulgaris L. Avril-octobre.
Lieux cultivés, C.C.

viscosus L. Juin-octobre.
Grèves et champs sablonneux, A.C., notamment :

Cne de Romorantin : Terres aux Monteaux, R.

Cne de Pruniers : Champs sablonneux et incultes bordant la route de Romorantin à Selles près des Quatre-Roues.

Digitized by Google

Cnes de la Chapelle-Montmartin, Mennetou, St-Julien, Villefranche : Grèves du Cher.

Cne de la Ferté-Imbault : Terre vis-à-vis les Jumeaux.

Cne de Gièvres : Clairière bordant la route de Gièvres aux Nouïes à l'entrée des bois des Nouïes.

Cne de Gy : Abords de Piedsauvron.

SENECIO sylvaticus L. Juin-octobre.

Bois, bords des champs, C., C.C. dans la forêt de Bruadan.

Je l'ai trouvé en outre, notamment :

Cnes de Courmemin, Pruniers, Veilleins, — Langon, — Neung, Montrieux, — Pierrefitte, Selles-St-Denis, — Lassay.

aquaticus Huds. Juin-juillet.

Prairies humides, A.C., notamment :

Cne de Lanthenay : Prés du Rantin.

Cne de Pruniers : Prés du ruisseau de Bâtarde.

Cne de Villeherviers : Prairies de la Sauldre.

Cne de Gièvres : Prairies de la Colinière bordant la route de Romorantin à Selles-sur-Cher.

Var. **erraticus** *(S. erraticus Bert).*

Cne de Gièvres : Large fossé près le bois du Poulinat.

Cne de Villefranche : Prés et val du Cher.

Cne de Pruniers : Confluent du ruisseau de Bâtarde.

Cne de Souesmes : Bois de la rive droite de la

Digitized by Google

petite Sauldre au moulin de la Fosse-aux-Loups.

SENECIO Jacobea L. Juin-août.
Bords des chemins, prés, pacages.
Levée du canal du Berry, C.

═══ **erucifolius** L. Août-septembre.
Bords des champs, des bois et pâtureaux, A.C. surtout dans les terrains un peu calcaires, notamment :
C^ne de Romorantin : Terres calcaires aux Arrogantes et aux Monteaux.
C^ne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche.
C^ne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger*, etc.
C^ne de Gy : Terres voisines du moulin de la Strèze, rive gauche de la Croisne.

ARTEMISIA vulgaris L. Août-octobre.
Haies, bords des rivières, C.

═══ **campestris** L. Août-septembre.
C. dans le val et les pentes du val du Cher, A.C. dans le val et les pentes du val de la Sauldre., C. sur les coteaux au Nord et au Nord-Ouest du lac de Soings. Ça et là ailleurs.

LEUCANTHEMUM vulgare Lam. Juin-juillet.
Prés, bois, C.C.

MATRICARIA chamomilla L. Juin-juillet.
Moissons.

Digitized by Google

Cne de Maray : Moissons, C.C.

Cne de St-Loup : Moissons de Sauveterre bordant la route de St-Loup, — moissons bordant la route de St-Loup à Maray, C. Çà et là ailleurs.

MATRICARIA inodora L. Juin-juillet.
Champs, moissons, A.R.

Cne de Maray : Abords de Daluet.

Cne de Salbris : Champ bordant la route de Toulouse au Sud et près de Salbris.

Cne d'Orçay : Bords de la route dans le bourg.

Cne de Theillay : Terre de la rive droite de la Rère en amont et près le pont de la Loge.

CHAMOMILLA nobilis Godr. Juillet-octobre.
Pelouses des chemins frais, des bords des étangs, du val de la Sauldre et du val du Cher, C.C.

═══ **mixta** God. et Gr. Juin-octobre.
Champs sablonneux, C.C. dans les moissons où il remplace souvent l'*Anthemis cotula*.

ANTHEMIS arvensis L. Juin-juillet.
Je ne l'ai trouvé que sur les grèves de la Sauldre et du Cher.

Cne de Romorantin : Ile de Mousseaux.

Cne de Selles-sur-Cher : Grèves du Cher au bas du parc du château.

═══ **cotula** L. Juillet-octobre.
Moissons, C.C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

ACHILLEA millefolium L. Juin-septembre.
Bords des chemins, prés secs, C.

═══ **ptarmica** L. Juin-août.
Terrains et prés humides, C.

BIDENS tripartita L. Août-septembre.
Bords des eaux, fossés, C.C.

═══ **radiata** Thuill. *(B. fastigiata Mich.)*
Août-septembre.
Cne de Pruniers : Parties desséchées de l'étang de Bâtarde.

═══ **cernua** L. Août-septembre.
Bords des eaux, fossés fangeux, A.C., notamment :
Cne de Pruniers : Étang de Bâtarde, — trou de bonde de l'étang des Landes, — *les Bardineaux dans le fossé bordant la route de Romorantin à Pruniers.*
Cne de Loreux : *Réservoir et étang de Rosière.*
Cne de Veilleins : Mare à la ferme des Levées, — marais du Pavillon.
Cne de Villefranche : Mare de Ste-Marthe.
Cne de Marcilly-en-Gault : Étang de l'Aunay, — étang s'écoulant dans l'étang de Courcelles.
Cne de Gièvres : Fossé de la route de Romorantin à Chabris longeant le pâtureau de la Grange de Rère.
Cne de Gy : Abords du moulin Tardieu ou Lardilleux.

Digitized by Google

C^ne de Lassay : Queue de l'Étang-Neuf.

C^ne de Soings : Bords du lac de Soings, C.C.

CORVISARTIA Helenium Mérat. Juillet-août. Bords des prairies et pâtureaux humides, A.R.

C^ne de Lanthenay : Bords d'une fosse au Dreuillet.

C^ne de Loreux : Les Gasts derrière les bâtiments des bestiaux et au pied de la haie qui sépare le jardin de la prairie.

C^ne de Pruniers : Bords de la prairie au-dessous du jardin de la Touche.

C^ne de Villeherviers : Pâtureau de la Gravelle bordant la rive gauche de la Beauce, C.

C^ne de Maray : Bords de la prairie au bas de Maray à l'angle de la route de Mennetou.

C^ne de Villefranche : Jardin et *pâtureau de Montauger*.

C^ne de Lassay : Petit pré marécageux à la Bretonnière.

INULA conyza D.C. Août-septembre. Bords des chemins, terres incultes et calcaires, A.C. notamment :

C^ne de Lanthenay : Au Nord-Est du Lieu, — bords de la route de Romorantin à Salbris vers la borne 2.

C^ne de Selles-sur-Cher : Pentes incultes entre le canal du Berry et le Cher en aval de la Thizardière.

Digitized by Google

C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, C.C.

C^ne de Gièvres : Talus d'un large fossé d'enceinte au-dessous et au Nord de la Grange de Rère.

INULA salicina L. Juillet.

Pâturages et prés tourbeux ou humides, A.C. notamment :

C^ne de Romorantin : Bruyères des Monteaux, etc.

C^ne de Lanthenay : Prés aux Étangs, — à la 1^re arche.

C^ne de Pruniers : Prés du ruisseau de Bâtarde près la Besaudière et la Cournuère, — *Pré des Vérières.*

C^ne de Villeherviers : Bords du large fossé qui clôt à l'Est le parc du Portail.

C^ne de Gièvres : Fossé au Poulinat.

C^ne de Gy : Val de la Croisne près le moulin de Lastrèze.

═══ **britannica** L. Juillet-août.

Bords des eaux et principalement du Cher et de la Sauldre, P.C.

C^ne de Romorantin : Fossé d'écoulement entre les Arrogantes et S^t-Marc.

C^ne de Lanthenay : Bords de la Sauldre dans la presqu'île de Longuevalle.

C^ne de Pruniers : Bords de la Sauldre (rive droite) en amont du bourg, — champs humides au Sud des Brezolles.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : Bas-fonds dans la prairie de la rive droite de la Sauldre vis-à-vis les Roches.

C^ne de St-Julien : Val du Cher à Valette.

C^ne de Villefranche : Près la Richaudière aux bords du chemin allant rejoindre la route de Villefranche à Romorantin, — bords du Cher à l'Escourioux.

C^ne de Selles-sur-Cher : Val du Cher entre la Thizardière et le confluent de la Sauldre.

C^ne de Gièvres : Bords du Cher au bas de l'écluse de Jaugy.

PULICARIA dysenterica Gœrtn. Septembre-octobre.
Fossés, haies des terrains frais, C.

vulgaris Gœrtn. Septembre-octobre.
Lieux fangeux, bords des étangs et des mares, — grèves du Cher, C.

CUPULARIA graveolens G. et G. Septembre.
Stations variables : terrains frais, bords des routes, C. notamment :

C^ne de Lanthenay : *Terres bordant la route de Romorantin à Blois entre la Grange et l'ancien étang du Ponceau, — bords du chemin de Romorantin à Veilleins entre la Lande et Rangereux.*

C^ne de Loreux : Bords de l'étang de la Harpe et environs, — bords du chemin de Loreux à Marcilly, — bords du chemin de la forêt

Digitized by Google

vis-à-vis l'étang des Fourneaux, — allée de la route de Loreux aux Gasts.

C^ne de Pruniers : Terre de Bâtarde bordant la route de Romorantin à Lassay, — terres de la Cornuère contiguës à celles du Rotay.

C^ne de Veilleins : Terres près la Pingottière, — terres des Levées près l'étang de la Gravelle, — terre près Tréfontaine.

C^ne de Villeherviers : Allée des Gasts à la route de Loreux.

C^ne de la Ferté-Imbault : Terre vis-à-vis la ferme des Jumeaux.

C^ne de Gy : Environs du moulin de la Strèze, C.

C^ne de Lassay : Abords du Rotay.

C^ne de Mur : Terres bordant la route de Mur à Soings, — de Mur à Bracieux, C.

Je l'ai trouvé encore C^nes de Courmemin et Vernou.

GNAPHALIUM luteo-album L. Juillet-août. Champs sablonneux et un peu humides, C.C.

═══ **uliginosum** L. Juillet-août. Fossés, bords des eaux, C.C.

FILAGO spathulata Presl. Juin-septembre. Camps calcaires, R.

C^ne de Maray : Terres calcaires de Daluet.

C^ne de Villefranche : Terres calcaires bordant le chemin allant de la Richaudière à la route de Romorantin à Villefranche.

C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc.

Digitized by Google

C^ne de Gièvres : Terres calcaires du Vivier, — id. de la Colinière.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.
C^ne de Thésée : Terres incultes du bourg bordant le Cher.

FILAGO germanica L. Juin-novembre.
Champs, bords des chemins, C.
Varie à tomentum blanc jaunâtre ayant les involucres à pointes rouges, R. *(G. Lutescens Jord.)* et à tomentum blanchâtre ayant les involucres à pointes pâles. *(G. canescens Jord.)* C.

═══ **arvensis** L. Juillet-septembre.
Lieux sablonneux, C.

═══ **minima** Fries. Juillet.
Terres incultes et sablonneuses, C.

LOGFIA subulata Cass. Juillet-août.
Moissons, A.C., notamment :
C^ne de Lanthenay : Moissons près et au Nord du village, — bords de l'étang de la Flandrinière, — environs de Courmin, — terre à la Lande.
C^ne de Loreux : Moissons des Gasts près la ferme.
C^ne de Villeherviers : Moissons de Balletan.
C^ne de Gy : Moissons bordant la route de Gy à Rougeou.

MICROPUS erectus L. Juin-juillet.
Terres calcaires et incultes, R.R.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Terre à l'Ouest du bois de la Gascetière qui l'encadre de trois côtés.
C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Clairières de la Cave.

CALENDULA arvensis L. Mai-octobre.
Vignes, jardins, R.R.
C^ne de Lanthenay : Vigne bordant au Sud-Ouest la route de Romorantin à Lassay sur une très-petite étendue.
C^ne de Pruniers : Jardin de la Cornuère, — jardin du presbytère.
C^ne de Thésée : Vignes bordant la route de Thésée à Noyers.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

DORONICUM *plantagineum* L. C^ne de Candé, A.B. (M. Franchet).
TANACETUM *vulgare* L. Berges de la Loire, A.B. (Moi-même).
CHRYSANTHEMUM *segetum* L. C^nes de Cour-Cheverny, Pezou, A.B.V. (MM. Franchet et Nouel).
GNAPHALIUM *sylvaticum* L. C^ne de Marchenoir, A.B. (M. Roger).
ANTENNARIA *dioica* Gœrtn., A.V. (M. Emile Desvaux).
On cultive en grand l'*helianthus tuberosus* principalement C^ne de Vernou au château de la Borde et C^ne de Selles-S^t-Denis dans la terre des Anges.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

2. — CYNAROCEPHALÆ Juss.

SILYBUM marianum Gœrtn. Juin.
Bords des chemins, R.R.
C^ne^ de Villeherviers : Abords du chemin descendant de Villeherviers à la Sauldre. Je l'y ai toujours vu et il y persiste malgré les travaux qui auraient dû le détruire. Spontanéité douteuse.
C^ne^ de Maray : *Abords de Daluet,* accidentel.
C^ne^ de Villefranche : *Place restreinte au Sud des bâtiments de Villebrette.*

ONOPORDON acanthium L. Juillet-août.
Lieux incultes, bords des chemins, C.

CIRSIUM lanceolatum Scop. Juillet-août.
Bords des chemins, C.

═══ **eriophorum** Scop. Juillet-septembre.
Bords des chemins des terrains calcaires, R.R.
C^ne^ de Selles-sur-Cher : Chemin au pied de la montée d'Avray, R.R.
C^ne^ de de Gièvres : Bords de la route de Villefranche à Gièvres en arrivant à la Planche-Morand, R.R.
C^ne^ de Couffy : Bord de la route de Selles à S^t^-Aignan entre Couffy et Seigy, A.C.

═══ **palustre** Scop. Juillet-août.
Lieux marécageux, C.C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

CIRSIUM spurium Del. *(Anglico-palustre God. et Gr.)* Juin.

Lieux marécageux.

C^ne^ de Gy : Bords d'un marécage boisé de la rive droite de la Croisne dans le voisinage de Piedsauvron. Je n'ai trouvé que deux pieds.

= **anglicum** Lob. Mai-juillet.

Marécages et prés humides, C.C.

Uniflore et souvent pluriflore rarement à fleurs blanches; feuilles parfois pinnatifides; racines parfois renflées.

= **acaule** All. Juillet-août.

Pelouses, pacages, C.C.

= **arvense** Scop. Juillet.

Moissons, C.C.

CARDUUS tenuiflorus Curt. Mai-juin.

Bords des chemins, C.C. aux environs de Romorantin.

= **nutans** L. Juin-juillet.

Bords des chemins, terres au repos, C.

Je l'ai trouvé à pédoncules courts, à fleurs rapprochées et à écailles des anthodes dressées.

CENTAUREA amara L. août.

Terrains secs, R.R.

Digitized by Google

Cne de Veilleins : Talus extérieur du fossé limitant les Caes de Mur et de Veilleins sur les bords de l'ancien étang Poulet, R.R.

CENTAUREA Jacea L. Juin-juillet.
Prés, C.C.

═══ **serotina** Bor. Juillet-août.
Prés, A.C.
Je l'ai observé notamment :
Cne de Pruniers : Pré des Vérières.
Cne de Villeherviers : Prairies de la rive gauche de la Rère en amont du pont de la route de Romorantin à Theillay, C.
Les trois espèces ci-dessus doivent-elles être distinguées?

═══ **nigra** L. Juillet-août.
Buissons, bords des haies et des bois, A.C. notamment :
Cne de Veilleins : Haies au-dessous de l'étang de Bordebure.
Cne de Villeherviers : Rives du Grand-Fossé, — bords d'un taillis à Queue-de-Loup, — bois entre les Gasts et la Coudre.
Cne d'Orçay : Bords du chemin d'Orçay au Grand-Village.
Cne de Gy : Environs du moulin Tardieu ou Lardilleux.

═══ **cyanus** L. Juin-juillet.
Moissons, C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

CENTAUREA scabiosa L. Juin-juillet.

Moissons, A.C. mais seulement dans les terrains calcaires.

C^ne de Lanthenay : Moissons calcaires bordant le chemin des Petits-Guideaux.

C^ne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière, — de la Maison-Blanche.

C^ne de S^t-Julien : Moissons bordant la route de S^t-Julien à S^t-Loup.

C^ne de Billy : Moissons calcaires du Tertre-Blanc.

C^ne de Gièvres : Moissons calcaires du Vivier, — de Jaugy, — du Champ des Calabres, etc.

Je l'ai trouvé également C^nes de Selles-sur-Cher et Soings.

═══ **calcitrapa** L. Juillet-août.

Bords des chemins, C.C.

Une variété à fleurs blanches se retrouve ordinairement C^ne de Lanthenay : rue des Verdons.

KENTROPHYLLUM lanatum D.C. Juillet-août.

Bords des chemins A.C., mais seulement dans les terrains calcaires.

C^ne de Lanthenay : Abords de l'ancienne ferme des Étangs.

C^ne de Pruniers : Abords de la Maison-Blanche.

C^ne de Selles-sur-Cher : Bords de la route de Selles à Blois.

Digitized by Google

C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc.

C^ne de Gièvres : Bords du chemin de la Loge avant d'arriver à Jaugy.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Abords de la Cave.

SERRATULA tinctoria L. Août-septembre.
Bois, pâtureaux, bruyères, C.

CARLINA vulgaris L. Juillet-septembre.
Bords des chemins, lieux secs et pierreux, C.

LAPPA minor D.C. Juillet-août.
Bords des chemins, voisinage des habitations, C.

=== major Gaertn. Juillet-octobre.
Bords des chemins, voisinage des habitations, R.

C^ne de Lanthenay : Le Lieu.

C^ne de Gièvres : Entre le pont de Pruniers et la Berrerie, — Jaugy et le val du Cher en amont de Jaugy.

XERANTHEMUM cylindraceum Sibth. et Sm. Août-septembre.
Pentes arides et calcaires, R.R.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Pentes dominant le chemin bas entre le pont de Sauldre et la Cave, là où le chemin commence à border la prairie et, surtout, environs de la Cave.

Digitized by Google

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

ECHINOPS *sphaerocephalus* L. C^ne de Mondoubleau, A.V. (M. Moreau). Spontanéité douteuse.

CIRSIUM *oleraceum* Scop. C^ne de Verdes, A.B. (découvert par M. Goussard).

— *bulbosum* D.C. C^ne de Cour-Cheverny, A.C. (M. Franchet).

CARDUUS *crispus* L. C^ne de Lavardin, A.V. (M. Peltereau).

CARDUNCELLUS *mitissimus* D.C. C^nes de Chitenay et Nouray, A.B.V. (M. Franchet).

CENTAUREA *maculosa* Lam. accidentel, C^ne de Montlivault, (M. Franchet).

— *myacantha* D.C. accidentel, C^ne de Huisseau-en-Beauce, A.V. (M. Nouel).

— *trichacantha* D.C. accidentel, C^ne de Vendôme, A.V. (M. Nouel).

— *solstitialis* L. Pl. introduite, C^ne de Cheverny, A.B. (M. Franchet).

SYNANTHEREÆ

3. — LIGULIFLOREÆ Eudl.

CICHORIUM intybus L. Août.
Terrains incultes, bords des chemins, C. dans les terrains calcaires, ne se trouve pas dans les sables.

ARNOSERIS pusilla Gaertn. Juin-septembre.
Moissons des terrains sablonneux, C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

LAMPSANA communis L. Juin-juillet.
Haies, C.

HYPOCHŒRIS glabra L. Juin-juillet.
Moissons et champs sablonneux, C.

═══ **radicata** L. Mai-Juillet.
Prés, bois, bords des champs, C.C.

═══ **maculata** L. Juin-juillet.
Lisières des bois, pâtureaux, bruyères, A.C. notamment :

C^ne^ de Romorantin : *Bruyères des Monteaux,* C.C.

C^ne^ de Lanthenay : Lisière orientale des tailles du Lieu près des vignes.

C^ne^ de Pruniers : *Pâtureau des Granges,* — pâtureau de Longueville, — pâtureau de la petite Robinière, — bruyères bordant l'allée de Longueville en allant à la Cornuère.

C^ne^ de Villeherviers : Pâtureau du Clos-Thion près les Fontenils, C. — taillis bordant l'allée des Gasts à la route de Loreux.

C^ne^ de Dhuizon : Bois bordant la route de Romorantin à Dhuizon.

C^ne^ de Thoury : Bruyères bordant la route entre Dhuizon et Thoury vers la limite des deux communes.

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Bande de bruyères large de 1 mètre à peine bordant la route de Nevers à Tours entre les bornes 144 et 145.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

THRINCIA hirta Roth. Octobre.
Pelouses, champs de trèfle.

Je n'ai pas recherché cette plante précisément à cause de sa vulgarité et je ne l'ai observée que

C^ne^ de Lanthenay : Terre de la Lande au milieu des *Trifolium hybridum* cultivés et, encore, C^ne^ de Villeherviers.

LEONTODON autumnalis L. Octobre.
Pacages, lieux incultes, grèves du Cher, C.

proteiformis Vill. *(Hispidus L.)*.
Prés, pacages, levée du canal du Berry, C.

PICRIS hieracioides L. Octobre.
Lieux incultes et pierreux, A.C. mais seulement dans les terrains calcaires.

SCORZONERA humilis L. Mai-juin.
Prés, pâtureaux et bois humides, C.C.

PODOSPERMUM laciniatum D.C. Juin.
Terrains calcaires et incultes.

C^ne^ de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, R.R.

C^ne^ de Gièvres : Terrains incultes de la Colinière bordant la route de Romorantin à Selles à 9 kilomètres environ de Romorantin, R.R.

TRAGOPOGON pratensis L. Juin.
Prés et pacages, C. seulement dans les terrains calcaires.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

TRAGOPOGON orientalis L. Mai-juin.
Prés et pacages calcaires, R.R.
C^ne de Maray : Pacages bordant un ruisseau sur la limite de Daluet et de Grammont.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

═══ **major** Jacq. Juin.
Prés et pacages, P.R.
(Le renflement du pédoncule est assez variable).
C^ne de Lanthenay : Prés aux Étangs.
C^ne de Mennetou : Bords de la route de Selles-St-Denis en descendant à Mennetou.
C^nes de Villefranche et de Gièvres : Berges du canal du Berry.
C^ne de Châtillon-sur-Cher : Prairies de la Sauldre en amont de la Cave.

CHONDRILLA juncea L. Juillet-août.
Lieux sablonneux et incultes, C.C.

TARAXACUM dens-leonis Desf. Avril-octobre.
Var. **officinale** *(T. officinale Wigg.)*.
Prés, pelouses, C.C.
Var. **erythrospermum** *(T. erythrospermum Andrez.)*.
Prés, pelouses, C.C.
Var. **palustre** *(T. palustre* D.C.*)*.
Prés humides, C.C.

LACTUCA saligna L. Juin-juillet.
Bords des chemins et des champs pierreux et calcaires, A.C. notamment :

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Terrains calcaires aux Verdons et aux Étangs.

C^ne de Mennetou : Bords de la route de Mennetou à Châtres.

C^ne de Selles-sur-Cher : Bords de la Sauldre près de son confluent.

C^ne de Gièvres : Terres de la Colinière bordant la route de Romorantin à Selles-sur-Cher.

LACTUCA scariola L. Juillet-septembre.
Lieux incultes et pierreux, C.

═══ **virosa** L. Juillet-août.
Bords des chemins, R.R.
Je ne l'ai trouvé que

C^ne de Lanthenay : Bords du chemin qui de Queue-de-Loup va rejoindre la route de Salbris presque vis-à-vis Longuevalle.

═══ **muralis** Fresen. Juillet-août.
Bois, murs, A.C. notamment :

C^ne de Lanthenay : Taillis de la rive droite de l'ancien étang du Lieu.

C^ne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines.

C^ne de S^t-Loup : Bois de la rive gauche du Roulier, etc.

C^ne de La Ferté-Imbault : Murs du parc du château.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Forêt de Bruadan.

C^ne de Pouillé : Bois longeant un ravin.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

LACTUCA perennis L. Juillet.

Terrains pierreux et calcaires, A.R.

C^ne^ de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière et de la Maison-Blanche.

C^ne^ de Billy : Le Tertre-Blanc.

C^ne^ de Gièvres : Champ des Calabres, — terres calcaires de Jaugy.

C^ne^ de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

SONCHUS oleraceus L. Juin-septembre.

Lieux cultivés, C.

═══ **asper** Vill. Juin-septembre.

Lieux cultivés, principalement dans les terrains calcaires, C.

═══ **arvensis** L. Juillet.

Moissons et lieux cultivés, presque exclusivement dans les terrains calcaires, R.

C^ne^ de Romorantin : Vignes aux Grands-Guideaux.

C^ne^ de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière, — pâtureau défriché à la Cornuère, — terres de Bâtarde bordant la route de Romorantin à Gy.

C^ne^ de Lamotte-Beuvron : Bords du Beuvron près et en amont du pont dans le bourg.

C^ne^ de Maray : Moissons au bas de la Pelaudière.

C^ne^ de Gièvres : Champ des Calabres.

CREPIS taraxacifolia Thuill. Mai-juin.

Prés, C. dans les terrains calcaires seulement, notamment :

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Terres des Etrangle-Chiens, C.C.

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche, etc.

Var. **glandulosa.**

Cne de Maray : Prairie artificielle bordant la route de Maray à Genouilly un peu avant Daluet.

CREPIS setosa Hall. Juin-juillet.

Pelouses, R.R.

Cne de Selles-St-Denis : Pelouses à l'entrée des Anges, C. Vraisemblablement introduit.

═══ **fœtida** L. Juin-juillet.

A.C. dans les terrains incultes et calcaires notamment :

Cne de Lanthenay : Abords de la carrière Moureux.

Cne de Villeherviers : Terre à l'Ouest de l'enclos de Moulin-Neuf.

Cne de Gièvres : Environs de Jaugy, — champs des Calabres, etc.

Cne de Billy : Chemin du pont de Sauldre.

Cne de Noyers : Moissons près le bourg, bords de la route, C.C.

═══ **virens** Vill. Juillet-octobre.

Champs, prés, C.C.

HIERACIUM pilosella L. Mai-octobre.

Pelouses, bords des chemins, pacages secs, C.C.

Digitized by Google

Var. **pilosissimum** *(H. peleterianum Mérat.)* Juin-juillet, R.R.

C^ne de Pruniers : Champ sablonneux bordant la route de Gy, près Bâtarde.

C^ne de Villefranche : Emplacement d'anciens bois de pins à l'Escourioux.

HIERACIUM Schultesii F. Sch. Juin-juillet.

Pacages, R.R.

C^ne de Loreux : Pelouse à Migereau bordant la Sauldre.

C^ne de Pruniers : *Pâtureau de la Cornuère,* — pacage très-restreint situé à l'extrémité du jardin de la Cornuère appelé jardin de la Besaudière. Il s'y maintient depuis 1860, époque où je l'ai observé. — Chemin entre la Robinière et Chènemoireau se dirigeant vers le Nord.

C^ne de St-Julien : Pelouse à Valette.

C^ne de Villefranche : Bords du canal entre l'Escourioux et le pont de l'Escourioux.

NOTA. — Je sais que cette espèce, vraisemblablement hybride des *H. auricula* et *pilosella*, a été en outre récoltée par M. Max. Cornu à la Chansonnerie et par M. Legendre aux bords du chemin de Longueville, dans la partie longeant les vignes de la Dabinerie.

auricula L. Juin-juillet.

Prés, bords des chemins, pelouses des talus de fossés, C.C.

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

HIERACIUM murorum L. Mai.
Bois, C.

═══ **sylvaticum** Lam. Mai-juin.
Bois, pâtureaux, C.

═══ **boreale** Fries. Septembre-octobre.
Lisière des bois et bruyères, A.C. notamment :
C^ne^ de Romorantin : Bruyères des Monteaux.
C^ne^ de Pruniers : Fossé de la Miltière bordant la route de Romorantin à Gy.
C^ne^ de Vernou : Bois aux Augères.
C^ne^ de La Ferté-Imbault : Fossé au Sud-Ouest des Jumeaux.
C^ne^ de Villefranche : Levée du canal du Berry (rive droite) entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux.

Var. **obliquum** *(H. obliquum Jord.)*
C^ne^ de Pruniers : Bords oriental et septentrionnal de la taille de Longueville.
C^ne^ de Marcilly-en-Gault : Fossés d'un bois sis à droite de la route allant de Loreux à Marcilly aux environs de Bourg-Nouveau.

═══ **umbellatum** L. Août-septembre.
Bois, bruyères, C.
J'omets volontairement d'autres formes de *hieracium* que je ne puis rapporter qu'avec doute à des espèces litigieuses.

ANDRYALA sinuata L. Juillet-août.
Je ne l'ai trouvé que

Digitized by Google

SYNANTHEREÆ

C^ne de Gièvres : Talus de la route de Gièvres à Selles dominant le canal dans les bois des Nouïes.

SCOLYMUS Hispanicus L. Juillet-octobre.

Bords des chemins, prés secs.

C^ne de Romorantin : Bords de la route de Romorantin à Theillay entre la Roche et la Ratière, C., — extrémité occidentale du Grand-Jardin dans la partie inculte servant à étendre le linge, — entrée du jardin de l'hospice bordant la Sauldre, — *rue des Limousins où les constructions et, en 1872, les trottoirs ont fait disparaître les derniers pieds, — le Haut-Mail d'où la voirie l'a chassé, — la route de Romorantin à Orléans d'où les travaux de la voirie ont fini par le détruire, — entrée de la rue des Petits-Guideaux où il a été détruit par l'érection d'un mur.*

C^ae de Lanthenay : Route de Romorantin à Salbris où riverains et cantonniers s'acharnent à sa destruction sans y être parvenus jusqu'à ce jour, A.C., — rue Creuse où il tend à disparaître, — chemin des Lices derrière le cimetière de Romorantin, localité restreinte, — chemin bas conduisant à Longuevalle.

C^ne de Villeherviers : Prés secs de la Chansonnerie sur une petite étendue.

Digitized by Google

Cnes de Pruniers et de Gièvres : Rive gauche de la Sauldre aux environs de la Berrerie sur les limites des deux communes.

Douze kil. environ séparent la Chansonnerie de la Berrerie et la présence du *Scolymus* sur des points aussi éloignés alors que chacun, loin de le cultiver, le traite en ennemi, est un certificat d'indigénat que lui donnait déjà en 1803 Dubois dans sa méthode éprouvée, page 396. Cet indigénat d'ailleurs est bien moins extraordinaire que celui des *Viola stagnina, pumila, stricta,* de l'*Arnica montana* et surtout du *Carex Buxbaumii.*

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

HELMINTHIA *echioides* Gaertn. Parc de Cheverny, naturalisé, A.B. (M. Franchet).

CREPIS *biennis* L. Cne de Courbouzon, A.B. (M. E. Roger).

— *nicœensis* Balb. Cne de Cour-Cheverny, A.B. (M. Franchet).

— *pulchra* L. Cne des Roches et environs de Blois, A.V. et B. (MM. Franchet et Mathonnet).

AMBROSIACEÆ Link.

XANTHIUM spinosum L. Août-septembre. Décombres, terrains remués.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Environs de Champléroy où je l'observe depuis 1860. Tend à disparaître, espèce évidemment introduite.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

XANTHIUM *strumarium* L. Chouzy, A.B. (M. Franchet).
— *macrocarpum* D.C. Grèves de la Loire, A.B. (M. Roger).

LOBELIACEÆ Juss.

LOBELIA urens L. Juin-septembre.
Bruyères humides, C.

CAMPANULACEÆ Juss.

JASIONE montana L. Juin-octobre.
Lieux secs et sablonneux, C.

PHYTEUMA spicatum L. Mai-juin.
Bords de la Sauldre, R.R.
Cne de Villeherviers : Bas du parc du Portail, — *bords de la Beauce à son confluent*, — Ile de Trécy.

= **nigrum** Sm. Mai-juin.
Je ne l'ai trouvé que
Cne de St-Loup : Parties basses et découvertes des bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup, R.R.

Digitized by Google

Cette espèce n'est-elle pas une simple variété du *P. spicatum* ?

SPECULARIA speculum Alp. D.C. Juin-juillet. Moissons, C. dans les terrains calcaires ou voisins du calcaire.

C^ne de Romorantin : Champs aux Guideaux.

C^ne de Thoury : Moissons aux abords du bourg.

C^ne de Selles-sur-Cher : Moissons bordant la route de Romorantin à Selles-sur-Cher, C.C.

C^ne de Billy : Moissons calcaires, C.C.

C^ne de Soings : Moissons, C.C. J'y ai trouvé quelques individus à fleurs blanches.

═══ **hybrida** Alp. D.C. Mai. Moissons, A.R.

C^ne de Pruniers : Moissons calcaires de la Maison-Blanche, — de l'Abbaye.

C^ne de Villeherviers : Moissons entre le Clos-Thion et Chenon.

C^ne de St-Julien : Moissons bordant la route de St-Julien à St-Loup entre le bourg de St-Julien et Chantemerle.

C^ne de Billy : Terres de la rive droite de la Sauldre entre le moulin de Larey et la route de Selles à Blois.

C^ne de Gièvres : Champs des Calabres, — Terres du Vivier.

CAMPANULA glomerata L. Juillet-août. Bois, pacages et pâtureaux des terrains calcaires, A.C. notamment :

Digitized by Google

C^ne de Romorantin : Bruyères des Monteaux.
C^ne de Pruniers : Bois de l'Abbaye, — pâtureau des Bresolles, — marnières abandonnées entre la Pommerie et le chemin de Longueville à la Cornuère.
C^ne de Villefranche : *Pâtureau de la Parconière.*
C^ne de Gièvres : Bois du Poulinat et environs, — talus de la chaussée du canal du Berry entre l'Escourioux et Jaugy.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche et forêt de Grosbois aux environs de ces carrières.

CAMPANULA trachelium L. Juillet-août.
Haies, bois, pâtureaux, C.

═══ **rotundifolia** L. Août.
Pacages et pâtureaux.
Je ne l'ai trouvé que
C^ne de Pierrefitte : Sur la rive gauche de la Boute-Vive entre le pont de Cerbois et le moulin Sarrazin ou de la Boute.

═══ **rapunculus** L. Juin-août.
Prés, haies, C.

═══ **patula** L. Juillet.
Bois et haies, A.R. (découverte par le docteur Soulez dans la forêt de Bruadan).
C^ne de Lanthenay : Haie à Courmin.
C^ne de Villeherviers : Haies entre la Chansonnerie et la Jarrie.

Digitized by Google

Cne de Marcilly-en-Gault : Bords de la route de Millançay à Marcilly dans la partie de la forêt de Bruadan voisine de l'étang Meuné, — près Boisquillon, — bords de la route de Loreux à Marcilly près Marcilly.

Cne de Gy : Fossé méridional parallèle à la route de Gy à Rougeou et débouchant dans un marais à moins de 1 kilom. de Gy.

Varie dans ce fossé à fleurs bleues et à fleurs blanches.

Je l'ai trouvé en outre Cne de Theillay.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

PHYTEUMA *orbiculare* L. Marais de Poulines, A.V. (MM. Franchet et Peltereau).

CAMPANULA *rapunculoides* L. Cne de Josnes, A.B. (M. Roger).

— *persicifolia* L. Les Roches, A.V. (MM. Nouel et Franchet).

VACCINIEÆ D.C.

Espèce de Loir-et-Cher à rechercher.

VACCINIUM *Myrtillus* L. Cne du Plessis-Dorin A.V. (MM. Nouel et Legué).

ERICINEÆ Desv.

CALLUNA vulgaris Salisb. Août-septembre. Landes, lieux stériles, bois secs, C.C.

ERICA vagans L. Juillet-septembre. Landes, R.R.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : Les grandes marnières des Roches, — *bruyères de la rive gauche de la Sauldre près le pont de Moulin-Neuf sur une très-petite étendue.*

ERICA tetralix L. Juin-septembre.
Landes humides, C.C.

═══ **cinerea** L. Juillet-août.
Landes, lieux secs et stériles, C.C.

═══ **scoparia** L. Juin.
Landes, bords des chemins.

Malgré les nombreux défrichements opérés, il occupe encore de grands espaces dans les C^nes de Romorantin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Veilleins, Villeherviers, — Langon, S^t-Julien, S^t-Loup, Villefranche, — Neung-sur-Beuvron, Dhuizon, La Ferté-S^t-Cyr, Thoury, — Selles-S^t-Denis, etc.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

ERICA *ciliaris* L. Forêt de Choussy, A.B. (M. Franchet).

MONOTROPEÆ Natt.

MONOTROPA hypopithys L. Juin-juillet.
Bois.

C^ne de Veilleins : Bois vis-à-vis le jardin de Montgiron.

C^ne de Villeherviers : Bois entre la Chansonnerie et le bourg de Villeherviers.

Digitized by Google

NOTA. — M. Dubois l'a trouvé commune de La Ferté-Saint-Cyr, au Nord-Est et près du bourg.

LENTIBULARIEÆ L.C. Rich.

PINGUICULA Lusitanica L. Juin-août.

Fondrières et bruyères humides, C.,

C^ne^ de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

C^ne^ de Lanthenay : *Bords d'un marais entre les étangs de Nobière et de Courmin*, — bruyères humides des deux côtés de la levée de l'étang de Nobière.

C^ne^ de Pruniers : Marécages autour de l'ancien étang Facy, — marécages bordant la route entre Beauvais et les Quatre-Roues.

C^ne^ de Veilleins : Bruyères spongieuses entre Tréfontaine et les levées, — écoulements spongieux autour de l'étang de Bordebure.

C^ne^ de Villeherviers : Bruyères humides de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail.

C^ne^ de La Ferté-Imbault : Bords de l'étang de l'Écluse et du marais qui s'y déverse.

C^ne^ de Souesmes : Fondrières de la rive gauche de la grande Sauldre en amont et en aval du pont de Pierrefitte, — fondrières de la rive gauche de la petite Sauldre près des limites du département.

C^ne^ de Gy : Brandes de Chênemoireau et de Boureau autour des marais.

Digitized by Google

Je l'ai trouvé encore Cnes de Vernou, — Dhuizon, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, Selles-St-Denis, Theillay, — Gièvres, Mur.

UTRICULARIA vulgaris L. Juin-août.

Eaux stagnantes, mares, fossés des étangs, marnières, C.

Variable de grandeur dans toutes ses parties.

═══ **intermedia** Hayn. Juillet.

Eaux stagnantes.

Cne de Pruniers : Fosses du val de la Sauldre (rive gauche), au-dessous de Beauvais. Trouvé en 1867; il n'a pas reparu depuis.

NOTA. — M. Max. Cornu l'avait trouvé en feuilles au mois d'octobre 1866 dans un ancien lit de la Rère près le pont de la route de Theillay où il n'a pas reparu.

═══ **Bremii** Heer. Juillet.

Eaux stagnantes des terrains spongieux.

Cne de Lanthenay : Rive gauche de l'étang de Nobière, — *marais entre les étangs de Nobière et de Courmin.*

Cne de Millançay : Bords de l'étang de la Meunerie, — fondrières entre l'étang de la Meunerie et celui de la Noue — fondrières au Nord-Est de l'étang de Malzoné.

Cne de Veilleins : Au bas de la chaussée de l'étang Fleuri, — écoulements spongieux autour de l'étang de Bordebure, — Fon-

Digitized by Google

drières du Pavillon à leur extrémité du côté de l'étang de la Noue.

C^ne de Gièvres : *Marais de Villefondue.*

UTRICULARIA minor L. Juillet-août.

Eaux stagnantes des terrains spongieux.

C^ne de Veilleins : Fondrières du Pavillon à leur extrémité du côté de l'étang de la Noue, mêlé parfois aux *Bremii* et *vulgaris*.

C^ne de La Ferté-Imbault : Marais en amont de l'étang de l'Écluse.

C^ne de Souesmes : Fossé d'un pré de la rive gauche de la Sauldre en aval du pont de Pierrefitte.

C^ne de Pierrefitte : Fossé parallèle à la Boute-Vive dans un pré de la rive gauche de cette rivière en amont du pont de Cerbois.

L'*Utricularia minor* de cette dernière localité rappelle, quant à la grandeur de toutes ses parties, l'*Utricularia Bremii*. — Sont-ce deux espèces véritables?

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

PINGUICULA *vulgaris* L. C^ne de Villerable, A.V. (MM. Peltereau et Le Grand).

UTRICULARIA *neglecta* Lehm. C^ne de Tour-en-Sologne, A.B. (M. Franchet).

PRIMULACEÆ Vent.

HOTTONIA palustris L. Mai-juin.

Mares, fosses, marnières, C., notamment:

Digitized by Google

C^ne de Romorantin : Mare dans le bois de la Ratière, — fosse bordant la route de Romorantin à Selles devant le jardin de Beauvais, — rouère de l'ancien étang de Beauvais.

C^ne de Lanthenay : Fosse au Sud de l'étang de Courmin, — petites fosses à l'Est de Longuevalle.

C^ne de Pruniers : Marnières de Longueville.

C^ne de Veilleins : Marais de la Pingottière.

C^ne de Villeherviers : le grand fossé depuis la Doubletière jusqu'au chemin longeant le parc des Roches, — fossé entre la Sauldre et le bourg de Villeherviers, etc.

C^ne de Villefranche : Contre-fossé du canal du Berry entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux, etc.

C^ne de Gy : Marais de la rive droite de la Croisne près Gy.

Je l'ai trouvé en outre C^nes de La Chapelle-Montmartin, — Salbris, Marcilly-en-Gault, S^t-Viâtre, — Selles-sur-Cher, etc.

PRIMULA grandiflora Lam. Mars-avril.

Pacages, bois et bords des prés.

C^ne de Courmemin : Tailles de l'Imbertière du côté de Banguin.

C^ne de Loreux : Forêt de Bruadan près la Favorite.

Digitized by Google

Cne de Millançay : Abords de Varennes, C., — forêt de Bruadan contiguë à Varennes jusqu'à la limite de Millançay et de Loreux.

Cne de Veilleins : Bois et lisières des bois au Nord et à l'Est de Veilleins, C.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Bois près Villabry, R.R.

Cne de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche, R.R.

PRIMULA officinalis Jacq. Mars-avril.
Prés, pâtureaux, bois, C.

═══ **variabilis** Goupil. Avril.

Cne de Veilleins : *Pied de haie d'un pré sis à la queue de l'étang du Lièvre et au Sud de Veilleins parmi les P. officinalis et à 200 mètres environ des P. grandiflora.* C'était vraisemblablement le *P. grandifloro-officinalis.*

═══ **elatior** Jacq. fl. avril, fr. juin.
Bois et pâtureaux, R.

Cne de Maray : Bois entre Belair et Doulcay.

Cne de St-Loup : Rives boisées du ruisseau de la Grange, particulièrement dans le bois du Fondereau, C.

Cne de Souesmes : Val de la petite Sauldre, notamment entre les Vannes et le moulin de la Fosse-aux-Loups où il remplace le *P. officinalis.*

Digitized by Google

PRIMULACEÆ

LYSIMACHIA vulgaris L. Juillet.
Lieux humides, bords des eaux, C.

═══ **nummularia** L. Juillet.
Haies et fossés humides, C.

CENTUNCULUS minimus L. Juillet-septemb.
Bords des étangs, A.C. notamment :
Cne de Lanthenay : *Au bas de la chaussée de l'étang de Courmin.*
Cne de Loreux : Bords de l'étang Dernier, du côté de la chaussée.
Cne de Pruniers : Bords de l'étang de Longueville, — bords de l'étang de la Cornuère.
Cne de Veilleins : Bords de l'étang Fleuri.
Cne de Villeherviers : Bords du grand fossé aux abords du pont de Juillet.
Cne de St-Viâtre : Bords de l'étang de Marcilly du côté de l'étang de Favelle.
Je l'ai trouvé encore Cnes de Marcilly-en-Gault, — Mur.

ANAGALLIS arvensis L. Juillet.
Lieux cultivés, C.

Var. **Phœnicea** *(A. Phœnicea Lam.)*.
Lieux cultivés, C.

Var. **cærulea** *(A. cærulea Lam.)*.
Terrains calcaires.

═══ **tenella** L. Juin-juillet.
Lieux marécageux des terrains sablonneux, C., notamment :

Digitized by Google

C^ne de Millançay : Fondrières au-dessous de l'étang de la Meunerie, C.C., etc.

C^ne de Pruniers : Bords de l'étang de Bâtarde, de l'ancien étang Facy, etc.

C^ne de Gy : Autour des nombreux marais de la rive droite de la Croisne, etc., et en outre :

C^nes de Loreux, Vernou, Villeherviers, — La Ferté-S^t-Cyr, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, Souesmes, — Gièvres, Mur.

SAMOLUS Valerandi L. Juin-juillet.

Lieux humides, fossés, A.C., principalement dans les terrains calcaires.

C^ne de Pruniers : Anciennes marnières de la Besaudière.

C^ne de Villeherviers : Bords de la Rère près le pont de la route de Theillay, — fossé dans les bruyères de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail.

C^ne de Gièvres : Fossé voisin du champ des Calabres.

C^ne de Soings : Autour du lac.

Et encore C^nes de Romorantin, — Gy, etc.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

ANDROSACE *maxima* L. Les Grouëts, près Blois, A.B. (Moi-même).

LYSIMACHIA *nemorum* L. C^ne de Souday, A.V. (M. Nouel).

M. Legué m'a envoyé deux *Primula* des environs de Mondoubleau, A.V., que M. Grenier et lui considèrent comme hybrides, l'un des *Primula officinalis* et *clatior*, l'autre du *grandiflora* et de l'*elatior*.

Digitized by Google

OLEACEÆ Lindl.

FRAXINUS excelsior L. fl. mars-avril fr. juill.
Pâtureaux et bois frais, C. dans le val du Cher, — A.C. dans celui de la Sauldre, — A.R. ailleurs.

LIGUSTRUM vulgare L. fl. juin, fr. août.
Haies, C.

JASMINEÆ R. Br.

Espèce de Loir-et-Cher.

JASMINUM *fruticans* L. Rocher entre Blois et la Chaussée, A.B. (M. Moreau). Spontanéité douteuse.

NOTA. — Le *J. fruticans* publié dans les *Reliq. Maillianæ* sous le 373 est indiqué à Romorantin, mais à tort.

APOCYNACEÆ Lindl.

VINCA minor L. Mars-avril.
Haies, bois, C.

major L. Mai.
Haies, R.

C^ne^ de Pruniers : Haie du jardin du presbytère, — haie entre le jardin et des pâtureaux de la Cornuère.

C^ne^ de Villeherviers : Haie d'une vigne bordant la route de Romorantin à Villeherviers près le bourg.

Digitized by Google

Cne de La Ferté-Imbault : Bords de la route de Salbris au pied du mur du parc du château, là où ce mur forme un coude.

Dans tous ces endroits la plante a été vraisemblablement introduite.

ASCLEPIADEÆ R. Br.

VINCETOXICUM officinale Mœnch. Juin-août.
Bois, coteaux incultes, A.R.

Cne de Pruniers : Bois de l'Abbaye.

Cne de Villeherviers : Bas du parc du Portail, — pâtureau à Forez.

Cne de Langon : Bruyères de Bruleteau, R.R.

Cne de Selles-sur-Cher : Pentes incultes du canal du Berry à mi-chemin entre la Thizardière et le pont-canal, R.R.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

GENTIANACEÆ Lindl.

ERYTHRÆA pulchella Horn. Juillet-août.
Bords des étangs, pacages humides, A.C.

Cne de Pruniers : Anciennes marnières de la Besaudière.

Cne de Villeherviers : Bords du grand fossé aux abords du pont de Juillet.

Cne de Gièvres : Prés marécageux du val du Cher entre l'Escourioux et Jaugy.

Digitized by Google

GENTIANACEÆ

ERYTHRÆA Centaurium Pers. Juin-août.
Prés, pâtureaux, C.

CICENDIA filiformis Delarb. Juillet-septemb.
Bords des étangs, bruyères humides, C.
C^ne de Lanthenay : *Bruyères de Courmin.*
C^ne de Loreux : Bords de l'étang de la Harpe, — de l'étang Dernier.
C^ne de Pruniers : Bords des étangs de Longueville, de la Châtre, *du Ponceau.*
C^ne de Veilleins : Bords des étangs Fleuri, de l'Ardrole, de la Roche, etc.
C^ne de Villeherviers : Bords des étangs des Gasts, Preneau, etc.
C^ne de Marcilly-en-Gault : Bords des étangs de la Prée, des Gasts, de Bièvre, de Courcelles.
C^ne de Mur : Bords des étangs de la ferme de la Chaussée, etc.
C^ne de Soings : Autour du lac.
Je l'ai trouvé également C^nes de Millançay, — Lassay, etc.

═══ **pusilla** Griseb. Juillet-septembre.
Bords des étangs, bruyères humides, C.
C^ne de Lanthenay : Bords de l'étang de Courmin, — *marais au bas de la chaussée de l'étang de Courmin.*
C^ne de Loreux : Bords des étangs de la Harpe, Dernier.
C^ne de Millançay : Bords des étangs de Malzonné, de la Rapinerie.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Bords des étangs de Longueville, de la Châtre.

Cne de Veilleins : Bords des étangs de Bordebure, du Lièvre, de la Meunerie, de la Roche, — fossé gauche de la route de Romorantin à Veilleins.

Cne de Villeherviers : Bords des étangs des Gasts, Preneau.

Je l'ai trouvé également Cnes de Marcilly-en-Gault, — Lassay et généralement là où se trouve le *Cicendia filiformis*.

CHLORA perfoliata L. Juillet-août.

Pelouses, bords des bois des terrains calcaires, A.R.

Cne de Romorantin : Pâtureau de la Guillotière.

Cne de Pruniers : Environs de la Maison-Blanche, — environs de la Philippière, — bois de l'Abbaye, — Pâtureau de la Pommerie, — petit pâtureau de la Cornuère.

Cne de Villefranche : Bords des fossés et des pelouses calcaires de la Gaudinière.

Cne de Gièvres : Pré du Chêne-Rabâteux.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

imperfoliata L. Août.

Terres un peu humides, R.R.

Cne de Pruniers : Terre au Sud du pré des Vérières, — *pourtour d'un petit marais à l'Ouest du bois de l'Abbaye,*

Digitized by Google

— terre sur les limites de Pruniers et de Gièvres au Sud des Bresolles.

GENTIANA pneumonanthe L. Juillet-octob. Bruyères et prés humides, C. notamment :

C^ne de Pruniers : Prés humides du ruisseau de Bâtarde.

C^ne de Villeherviers : Prés de la Sauldre.

Se trouve C^nes de Veilleins, — Pierrefitte, Souesmes, etc., etc.

MENYANTHES trifoliata L. Mai-septembre. Bords des cours d'eau paisibles et marais tourbeux, A.C.

C^ne de Pruniers : Ancien étang Facy, — marais Chaunet.

C^ne de Veilleins : Fondrières du Pavillon, C.

C^ne de Villeherviers : La Beauce entre le pont Gitton et Trécy, — bords de la Sauldre et plus particulièrement vers le confluent de la Beauce, — dans les prés de la Chansonnerie, C.C., — de Moulin-Neuf et en avant du parc du Portail.

C^ne de Neung : *Marais faisant suite à l'étang de Beaumont près Villemorand.*

C^ne de Pierrefitte : Bords de la Boute-Vive aux environs de Cerbois.

C^ne de S^t-Viâtre : Rive gauche du Néant en amont du pont de la route de S^t-Viâtre à Chaumont.

C^ne de Theillay : Bords de la Rère en amont du pont de la Loge.

Digitized by Google

C^ne de Gy : Nombreux marais de la rive droite de la Croisne.

LIMNANTHEMUM nymphoides Link. Juillet-août.
Fosses, rivières.
C^ne de Langon : La vieille rivière, C.
C^ne de Pouillé : Le Cher vis-à-vis Thésée.
C^ne de Thésée : Le Cher près le bac.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

GENTIANA *cruciata* L. Lavardin, A.V. (Moi-même).

CONVOLVULACEÆ Vent.

CONVOLVUS sepium L. fl. juin, fr. août.
Haies et buissons des lieux frais, C.

= **arvensis** L. Mai-octobre.
Jardins, cultures, C.C.

CUSCUTA densiflora Soy-Will. Juin.
Cultures de lin.
C^ne de Pruniers : La Cornuère où ses ravages ont déterminé le fermier à ne plus cultiver le lin. Je ne l'ai pas observé ailleurs.

= **Epithymum** L. Juillet-août.
Ajoncs, bruyères, thym, genêts, C.C.

= **Trifolii** Babingt. Juillet-septembre.
Prairies artificielles de trèfle, C.

Digitized by Google

BORAGINEÆ Juss.

BORRAGO officinalis L. Mai-juin.

Cultures, surtout dans le voisinage des habitations, C.

SYMPHYTUM officinale L. Juillet-août.

Bords des eaux, prés humides, C.

ANCHUSA italica Retz. Juin.

Moissons des terrains calcaires, A.C.

C^ne^ de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière, — de la Maison-Blanche.

C^ne^ de Selles-sur-Cher : Moissons bordant la route de Selles-sur-Cher à Blois.

C^ne^ de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.

C^ne^ de Gièvres : Moissons de Jaugy, du Vivier, du champ des Calabres, de la Colinière.

═══ **arvensis** Avril-mai.

Champs, terres incultes, jardins, C.

LITHOSPERMUM officinale L. fl. juin, fr. août.

Bois et pâtureaux des terrains calcaires, P.C.

C^ne^ de Pruniers : Bois de l'Abbaye.

C^ne^ de Villeherviers : Bords de l'allée de Trécy.

C^ne^ de Langon : Pâtureau de Nocfond.

C^ne^ de S^t^-Julien : Garenne, pâtureau et pelouses calcaires à Valette, — pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.

C^ne^ de Villefranche : *Pâtureau de Montauger*.

C^ne^ de Gièvres : Terres calcaires de la Grange de Rère.

Digitized by Google

BORRAGINEÆ

LITHOSPERMUM arvense L. Mai.
Moissons, C.C.

ECHIUM vulgare L. Mai-juillet.
Bords des chemins et des champs, vieux murs, C.C., rarement à fleurs roses.
La var. **Wierzbickii** se trouve seulement dans les terrains calcaires.

PULMONARIA tuberosa Schrk. Avril-mai.
Bois et pâtureaux frais, prairies et talus de fossés humides, C.

MYOSOTIS palustris Wither. Mai-août.
Marais, bords des eaux, C.C.
Var. **genuina** *(M. palustris Rchb.)*
Var. **strigulosa** *(M. strigulosa Rchb.)*
Var. **repens** *(M. repens Rchb.)*

lingulata Lehm. Juin.
Lieux marécageux.
C^ne^ de Gy : Marécages contigus au biez du moulin Lardilleux, — pâtureau marécageux contigu à l'étang de Piedsauvron.

stricta Link. Avril-mai.
Moissons des terrains sablonneux, A.C.
C^ne^ de Pruniers : Coteau de la Gascetière dominant la route de Romorantin à Selles-sur-Cher.
C^ne^ de Gièvres : Bois de pins de l'Escourioux.
C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Terres au-dessus du bois de la Cave.

versicolor Pers. Mai-juin.
Champs sablonneux, C.

Digitized by Google

BORRAGINEÆ

MYOSOTIS hispida Schlecht. Mars-mai.
Bords des chemins, lieux sablonneux et secs, C.

intermedia Link. Mai-juin.
Bois frais, lieux cultivés, C.

ECHINOSPERMUM Lappula Lehm. Août-septembre.
Vignes et champs voisins du calcaire.
Cne de Pruniers : Vignes au Nord du bourg, R.
Cne de Billy : Vignes au milieu des carrières du Tertre-Blanc, R.R.
Cne de Gièvres : Vignes bordant au Nord le chemin de la Loge vers la limite des affleurements calcaires, — vignes bordant la route de Romorantin à Selles-sur-Cher aux environs de la Colinière, — vignes bordant la route de Gièvres à Selles-sur-Cher entre Villedieu et les Petits-Étangs.
Cne de Soings : Coteaux au Nord du lac.

CYNOGLOSSUM pictum Ait. Juin-septembre.
Lieux arides, bords des chemins dans le voisinage du calcaire, R.R.
Cne de Selles-sur-Cher : Bords du chemin entre Selles et la Thizardière, A.C.
Cne de Gièvres : Champ pierreux de la Morandière bordant la route de Villefranche à Gièves, R.R.

officinale L. Juin.
Lieux incultes, voisinage des habitations, A.C.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Abords de la Cornuère.
C^ne de Gièvres : Abords de Jaugy.

HELIOTROPIUM Europæum L. Août-septembre.
Bords des chemins, cultures dans les terrains calcaires ou voisins du calcaire, R.R.
C^ne de Pruniers : Bords du chemin entre les Quatre-Roues et la Maison-Blanche.
C^ne de S^t-Julien-sur-Cher : Jardin à Valette.
C^ne de Gièvres : Bords de la route à Villedieu.
C^ne de Thésée : Dans le bourg.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

SYMPHYTUM *tuberosum* L. Au bas du coteau entre Chailles et S^t-Gervais, A.B. (M. Moreau).
ANCHUSA *sempervirens* L. C^ne de Thoré, A.V. (M. Mathonnet).
LITHOSPERMUM *purpureo-cœruleum* L. C^ne de Celettes, A.B. (M. Franchet).
PULMONARIA *saccharata* Mill. C^ne de Seur, A.B. (M. Franchet).

SOLANEÆ Juss.

LYCIUM barbarum L. Août.
Çà et là dans les haies aux environs des habitations, surtout aux abords de Romorantin. Je ne le suppose pas spontané.

SOLANUM nigrum L. Septembre-octobre.
Pied des murs, décombres, C. avec les variétés suivantes :

Digitized by Google

Var. **genuinum.**

Var. **chlorocarpum** *(S. ochrolencum Bast.)*

Var. **miniatum** M. et K. *(Solanum miniatum Willd.)*. Cette dernière variété est commune à Romorantin.

SOLANUM dulcamara L. Juin-juillet.
Bois et haies humides, C.

PHYSALIS Alkekengi L. Juin-juillet.
Vignes et cultures des terrains calcaires, R.R.

C^ne^ de Lanthenay : Vignes bordant le chemin des Verdons.

C^ne^ de Mennetou : Cultures bordant la route entre Préjeux et Mennetou.

C^ne^ de Châteauvieux : Moissons à Péquignon.

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Moissons contiguës au bois de la Cave.

DATURA Stramonium L. Juillet-octobre.
Décombres, voisinage des habitations, A.C.
Var. **genuina.**

C^ne^ de Romorantin : Dans le bas du faubourg de Blois.

C^ne^ de Villeherviers : Abords de la Chansonnerie, — des Roches.

C^ne^ de Salbris : Dans le bourg.

C^ne^ de Selles-S^t^-Denis : Bords de la route de Romorantin.

C^ne^ de Gièvres : Bords du chemin de la Loge.

Et encore C^nes^ de Loreux, Pruniers, etc.

Digitized by Google

Var. **Chalibea** Koch. *(D. Tatula* L.).

C^ne de Lanthenay : Mousseaux, — la Dabinerie.

C^ne de Pruniers : Le bourg de Pruniers, — Marmagne, — la Cornuère.

C^ne de Villeherviers : Les Roches.

C^ne de Gièvres : Ferme de Jaugy.

HYOSCIAMUS niger L. Mai-juin.

Décombres, bords des chemins, voisinage des habitations, C.

Var. **pallidus** *(H. pallidus Kit.)*.

C^ne de Villeherviers : Bords de la route à la sortie du bourg. Il y avait été observé en 1866 par M. Legendre et je l'y ai retrouvé, mais à un autre endroit, en 1867. Depuis je ne l'ai pas revu.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

ATROPA *Belladona* L. C^ers de Chailles et Fréteval, A.B.V. (MM. Moreau et Nouel).

Le SOLANUM *tuberosum* est cultivé en grand dans tout l'arrondissement de Romorantin.

VERBASCEÆ Bartl.

VERBASCUM Thapsus L. Juillet-août.

Champs incultes, bords des chemins, C.

montanum Scrad. Août.

Bords des chemins, R.R.

C^ne de Romorantin : Bords d'un sentier aux Crottés (un seul pied).

Digitized by Google

C^ne de Millançay : Chemin bas entre Boussavie et Lallay, le 1^er à gauche de la route de Millançay à Montrieux après l'allée de Marcheval, A.C.

VERBASCUM Phlomoides L. Juillet-août.
Terres incultes, C.

Thapsiforme Schrad. Juillet-août.
Lieux incultes, C.C.

Var. **gymnostemum** Fr. *(V. crassifolium Hoffm. et L.)* Août.

C^ne de Pruniers : Terres sablonneuses entre la Sauldre et l'allée de Champleroy où je l'ai observé en 1866 et 1872.

Australe Scrhad. Juillet-août.
Terres incultes, C.

Var. **gymnostemum** Fr.

C^ne de Pruniers : Terres sablonneuses entre la Sauldre et Champleroy où je n'ai trouvé qu'un seul pied.

NOTA.— Je crois que la décurrence plus ou moins grande des feuilles ne suffit pas pour différencier des espèces et c'est ainsi que, de l'avis de M. Franchet, je réunirais volontiers le *V. montanum* au *V. Thapsus* et les *V. Thapsiforme* et *Australe* au *V. Phlomoides*.

pulverulentum Vill. *(V. floccosum W. et K.)* Juin-septembre.
Bords des chemins, champs incultes, C.C.
Var. **gymnostemum.**

Digitized by Google

Je n'en ai trouvé qu'un seul pied
C^ne de Soings : Pentes au bas de la ferme du Chatelier.

VERBASCUM Lychnitis L. Juillet-septembre.
Bords des chemins, champs incultes, C.C.
Var. à fleurs blanches, C.
Var. à fleurs jaunes, R.R. Trouvé seulement :
C^ne de Mur : Bords de la route à l'arche des Rois, — terre au Nord et près de l'ancien étang Poulet.

═══ **nigrum** L. Juillet-septembre.
C^ne de Gièvres : Bords du chemin de Gièvres aux Nouïes. Cette localité unique est menacée d'une destruction complète par le cantonnier de la route.

═══ **Blattaria** L. Juin-juillet.
Bords des chemins et des champs, C. surtout dans le val du Cher et dans celui de la Sauldre.

═══ **virgatum** With. Juin et mois suivants, parfois jusqu'en décembre.
Bords des chemins, lieux frais et incultes, plus commun que le *Blattaria*.

VERBASCUM HYBRIDES.

═══ **Lemaitrei** Bor. *(Thapsus+virgatum.)*
Juillet. Avec les parents.
C^ne de Villeherviers : Champ bordé par la Sauldre, la route de Villeherviers et un mur de Moulin-Neuf, — bords de la route

Digitized by Google

de Romorantin à Villeherviers vers la borne n° 2. — Un seul pied dans chaque endroit.

VERBASCUM nothum Koch. *(Thapsiforme+ pulverulentum.)* Juin-septembre, avec les parents, C.

Varie à poils violets et à poils blancs sur les filets des étamines, varie également à feuilles longuement ou à peine décurrentes, avec tous les intermédiaires dans la couleur des poils et dans la décurrence.

C^ne de Romorantin : Bords de la route vis-à-vis Beauvais.

C^ne de Pruniers : Le Grand-Village, — Marmagne, — les Vérières, — les Bresolles, Champleroy, — les Quatre-Roues, etc.

C^ne de Villeherviers : Pont-Gitton, — la Repenellerie, — Trécy, — le Portail, etc.

C^ne de Mennetou : Bords de la route entre Langon et Mennetou près Mennetou.

C^ne de St-Julien : Bords de la route près Olivet.

C^ne de Villefranche : Bords de la route entre la Commanderie et Villefranche.

C^ne de Salbris : Forges de Belleville près Salbris, — bords de la route de Salbris à Souesmes.

C^ne de Pierrefitte : Bords de la route près la forge de l'Ardoise.

C^ne de Selles-St-Denis : Bords de la route de Romorantin à Selles-St-Denis.

Digitized by Google

C^ne de Gièvres : Abords de la gare du chemin de fer, — chemin près les Nouïes, — chemin de la Loge, — bords de la route de Villefranche à Gièvres près le Chesnay.

VERBASCUM ramigerum Link *(V. Thapsiforme + Lychnitis.)* Août. Avec les parents.
C^ne de Pruniers : Champ bordant le chemin de Romorantin à Pruniers, presque vis-à-vis Marmagne. 1 seul pied.

═══ **heterophlomos** Franchet *(V. Lychnitis + Thapsiforme.)* Juillet.
C^ne de Villeherviers : Champ bordant au Sud la route de Salbris entre Trécy et le Pont-Gitton. 5 à 6 pieds.

═══ **adulterinum** Koch. *(V. Thapsiforme + nigrum.)* Juillet, avec les parents.
C^ne de Gièvres : Bords de la route entre Gièvres et Villedieu à moitié chemin. 1 seul pied.

═══ **Thapsiformi-virgatum** *(V. Martini Franchet.)* Juillet.
3 pieds au milieu de nombreux *V. virgatum* entourés eux-mêmes de *V. Thapsiforme*
C^ne de Romorantin : Champ dans le bas du faubourg d'Orléans.

═══ **virgato-thapsiforme**. Août.
1 seul pied au milieu des *Verbascum Thapsiforme* sans autres *Verbascum* aux environs.
C^ne de Pruniers : La Cornuère.

Digitized by Google

VERBASCEÆ

NOTA. — Ce *Verbascum* réunit les caractères du *V. virgatum* et du *V. Thapsiforme* et diffère légèrement du *V. Martini Fr.*. Vraisemblablement des graines émanant d'un même individu ont donné naissance et à cet hybride et aux *V. Thapsiforme* qui l'entouraient, et j'en conclus que la mère de cet hybride est un *V. Thapsiforme*. Le même raisonnement me fait supposer que les trois pieds du *V. Martini Franch.* avaient également une origine commune avec les *V. virgatum* au milieu desquels ils étaient nés, et qu'ainsi le *V. Martini* a pour mère un *V. virgatum*. De là les dénominations que j'ai cru pouvoir donner à ces deux hybrides.

VERBASCUM Euryale Franchet *(V. pulverulentum + Lychnitis.)* Juillet-août. Avec les parents.

Poils des étamines passant du violet au blanc.

C^ne^ de Pruniers : Champ inculte bordant la rive gauche de la Sauldre un peu au-dessous de Champleroy (7 ou 8 pieds atteignaient au moins 2 mètres de hauteur et formaient de la base au sommet une pyramide composée de plus de 50 branches au milieu de *V. Lychnitis* nombreux et à quelque distance de *V. pulverulentum*.

C^ne^ de Villeherviers : Places de la ferme de Trécy.

= **Regelianum** Wittg. *V. Nisus* Franchet *(V. Lychnitis + pulverulentum.)* Juillet. A proximité des parents.

Digitized by Google

Mêmes localités que pour le *V. Euryale* dont il ne diffère que par son tomentum.

VERBASCUM Schottianum Schr. *(V. pulverulentum + nigrum.)* Août. Avec les parents.
C^ne^ de Gièvres : Bords de la route de Gièvres à Villedieu.

= **furcipilum** Franchet inéd. *(Blattaria + pulverulentum)* à proximité des parents. Juillet.
C^ne^ de Villeherviers : Bords de la route vis-à-vis Trécy, 1 seul pied.

= **Schiedeanum** Koch. *(Lychnitis + nigrum.)* Juillet-août. Avec les parents.
C^ne^ de Gièvres : Bords de la route de Gièvres aux Nouïes dans la traversée des bois.

Autres Espèces hybrides de Loir-et-Cher.

VERBASCUM *Godronii* Bor. *(Thapsus + pulverulentum)*, C^ne^ de Cheverny, A.B. (M. Franchet).
— *spurium* Koch. *(Thapsus + Lychnitis)*, C^ne^ de Thoré, A.V. (M. Franchet).
— *pterocaulon* Franchet. *(Thapsus + Blattaria)*, C^ne^ de Chemery, A.B. (M. Franchet).
— *macilentum* Franchet *(pulverulentum + Blattaria)*, C^ne^ de Tour-en-Sologne, A.B. (M. Franchet).

Digitized by Google

SCROPHULARIACEÆ Beuth.

SCROPHULARIA nodosa L. Juin-juillet.
Fossés, bords des mares, terrains humides, C.

═══ **aquatica** L. Juin-juillet.
Bords des eaux, C., moins cependant que le *S. Nodosa*.

ANTIRRHINUM Orontium L. Juin-octobre.
Cultures et moissons, C., R. à fl. blanches.

═══ **majus** L. Juin-septembre.
Vieux murs, R.R.
C^ne^ de La Ferté-Imbault : Murs des fossés du château de La Ferté-Imbault.
C^ne^ de Selles-sur-Cher : Murs du parc du château regardant le Cher.

ANARRHINUM Bellidifolium Desf. Juin-août.
Champs incultes, bords des chemins, parmi les genêts et dans les clairières des bois sablonneux, A.C.
C^ne^ de Villefranche : Bords de la route de Nevers à Tours entre la Lavanderie et la Parconnière, A.C.
— clairières des bois à l'Escourioux, R.R.
C^ne^ de Pierrefitte : Champs entre la route et la Sauldre près l'Ardoise, A.C.
C^ne^ de Selles-S^t^-Denis : Terre inculte de la rive droite de la Sauldre au bas et au Nord de la route de Romorantin à Salbris en arrivant au pont sur la Sauldre, R.

Digitized by Google

C^ne de Souesmes : Bords de la route de Salbris à Souesmes surtout entre les bornes 32 et 33, C.C.

C^ne de Gièvres : Bois taillis entre le bourg et la route de Romorantin à Chabris, — champs des Genêts à l'Est de la Morandière, C.

LINARIA spuria Mill. Juin-octobre.

Champs calcaires, moissonsdu val du Cher, P.C.

C^ne de Lanthenay : Les Étangs.

C^ne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière, etc.

C^ne de Villefranche : Grèves et Moissons du val du Cher.

═══ **Elatine** Desf. Juillet.

Moissons, C.

═══ **vulgaris** Mœnch. Juillet-septembre.

Champs, Bords des chemins, C.C.

J'ai trouvé dans le val de la Sauldre à Longuevalle, près Romorantin, 4 ou 5 pieds dont les étamines étaient transformés en pétales.

═══ **Pellisseriana** D.C. Septembre.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Terre de l'Hermitagë contiguë au bois de la Brosse où il m'a été indiqué par M^mes de Villars, R.R.

NOTA. — M. Max. Cornu l'avait récolté quelques jours auparavant tout auprès de la Brosse. Je l'y ai vainement cherché depuis.

Digitized by Google

SCROPHULARIACEÆ

LINARIA striata D.C. Juillet-septembre.
Bords des fossés, des haies et des bois, lieux pierreux et sablonneux, C.

═══ **supina** Desf. Mai-septembre.
Terres sablonneuses, C.

═══ **minor** Desf. Juin-octobre.
Champs des terrains calcaires, grèves du Cher, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Terrains défrichés dans les bruyères des Monteaux, — terre calcaire bordant le chemin de la Richaudière à Villefranche.
C^ne de Villeherviers : Terre au Nord des grandes marnières des Roches.
C^ne de Langon : Moissons en regard des carrières de Tréchis.
C^ne de Villefranche : Terres calcaires de Montauger et des environs, — grèves du Cher à l'Escourioux dans une dépression de terrain couverte par les grandes eaux.
C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc.
C^ne de Gièvres : Terres calcaires du Vivier.
C^ne de Thésée : Moissons du val du Cher vis-à-vis la vallée de Chantereine.

GRATIOLA officinalis L. Mai-septembre.
Bords des étangs, fossés fangeux, prés marécageux, C.C.

VERONICA Teucrium L. Mai-juin, octobre.
Val du Cher, de la Sauldre et pelouses des terrains calcaires, A.C.

Digitized by Google

Var. **vestita** G.G. *(V. Bastardi Bor.)*
C^ne^ de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.

VERONICA Chamædrys L. Avril-mai.
Haies, prés secs, C.C.

═══ **Beccabunga** L. Mai-septembre.
Bords des eaux, fossés marécageux, C.

═══ **Anagallis** L. Mai-septembre.
Bords des eaux, fossés aqueux, C.

═══ **Anagalloides** Guss. Juillet.
Bords des eaux, endroits marécageux.
C^ne^ de Pruniers : Grèves de la Sauldre au gué des Moulins-Neufs, — partie marécageuse du chemin allant de Marmagne aux communs des Vérières.

═══ **scutellata** L. Juin-septembre.
Bords des étangs et marais, C.C.

═══ **montana** L. Mai-juin.
Bois, R.R.
C^ne^ de S^t^-Loup : Partie basse du bois de Fondereau en regard de la ferme des Granges.

═══ **officinalis** L. Mai-juillet.
Bois et pâtureaux, C.

═══ **serpyllifolia** L. Avril-août.
Pelouses, pacages et lieux humides, C.

═══ **arvensis** L. Avril-mai.
Champs, pied des haies, C.C.

═══ **acinifolia** L. Avril-mai.
Terrains humides, A.C., notamment :

Digitized by Google

Cne de Romorantin : Parties basses dans les Quintaines.

Cne de Lanthenay : Vignes bordant les tailles du Lieu, — bords du chemin entre le Petit-Vauvert et la Gaucherie, — vignes bordant le chemin qui va de Queue-de-Loup à Longuevalle, etc.

Cne de Villefranche : Champs près Montauger, etc. et encore :

Cnes de Loreux, Villeherviers, — Langon, St-Loup, — Selles-sur-Cher, Billy, — Châtillon-sur-Cher, etc.

VERONICA triphyllos L. Avril-mai.

Vignes, moissons un peu humides, A.C.

Cne de Romorantin : Les Crottés, — vignes à la Lambinière.

Cne de Lanthenay : Vignes entre les routes de Romorantin à Salbris et de Romorantin à Loreux, — terres entre Mousseaux et la Dabinerie.

Cne de Pruniers : Moissons de la Pesière, — terres à Champleroy, etc., et encore :

Cnes de Selles-sur-Cher, Billy, — Châtillon-sur-Cher, etc.

= **præcox** All. Avril-mai.

Cne de Noyers : Terre contiguë aux carrières de Belleroche et à la forêt de Grosbois, chemin entre

= **agrestis** L. Mars-octobre.

Lieux cultivés, pelouses, C.C.

Digitized by Google

SCROPHULARIACEÆ

VERONICA didyma Ten. Mars-octobre.
Lieux cultivés, beaucoup moins commun que le *V. agrestis*. Je l'ai surtout observé dans le val du Cher.

═══ **hederæfolia** L. Mars-juin.
Vignes, bords des haies, cultures, C.C.

LIMOSELLA aquatica L. Juillet-octobre.
Bords des rivières, des étangs, des mares, R.
C^ne de Lanthenay : Bords de l'étang de Courmin, R.R. — bords de l'étang de la Flandrinière, R.
C^ne de Loreux : Mare de la Pinauderie bordant la route de Loreux à Marcilly, R., — bords de l'étang d'En-Haut, R.
C^ne de Villeherviers : Bords d'une mare à Champvioux, R.R.
C^ne de Villefranche : Grèves du Cher dans des bas-fonds en amont de l'Escourioux, R.R.

DIGITALIS purpurea L. Juin-juillet.
Champs siliceux et incultes, lieux secs et sablonneux, C.C.

═══ **lutea** L. Juillet.
C^ne de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche. Localité assez abondante mais très-restreinte.

EUPHRASIA officinalis L. Juillet-août.
Prés hauts, pâtureaux, R.R.
C^ne de Vernou : Le grand pâtureau des Nardillais, — prés hauts de la rive gauche du

Digitized by Google

Néant en amont du grand pâtureau des Nardillais.

Var. **campestris** *(E. campestris Jord.)*.

C^ne de Souesmes : Prairie au confluent du Riau et de la petite Sauldre.

═══ **nemorosa** Pers. Juin-août.

Pâturages, bruyères, C.

ODONTITES rubra Pers. Juin.

Moissons, A.C. surtout dans les terrains calcaires.

═══ **serotina** Rchb. Juillet-août.

Moissons, A.C.

EUFRAGIA viscosa Benth. Juin-juillet.

Moissons, prés, champs sablonneux et frais, C., notamment :

C^ne de Romorantin : Moissons entre le Galop et l'extrémité de la rue de Beauvais.

C^ne de Lanthenay : Moissons à la 1^re arche, — pré aux Étangs, — pépinière à Queue-de-Loup.

C^ne de Loreux : Prés à Migereau, — terre à la Droderie.

C^ne de Vernou : Moissons de la rive droite de l'étang de Grosaulne.

C^ne de Villeherviers : Terre de Ballestan, — Moissons des Pelleteries.

C^ne de Villefranche : Bords du chemin entre la Demanchère et l'Épinière.

C^nes de Mur et de Soings : Moissons bordant la route de Mur à Soings.

Digitized by Google

C^ne de Soings : Bords du lac, et encore :
C^nes de Pruniers, — Neung-sur-Beuvron, — Salbris, — Gy, etc.

RHINANTHUS major Ehrh. Juin.
Prés secs, moissons, C.C.

═══ **minor** Ehrh. Juin.
C^ne de Gy : Prés de la Croisne à Piedsauvron et autour des marais de la rive droite de la Croisne.

PEDICULARIS palustris L. Juin.
Prés marécageux et tourbeux, C.
Prairies humides de la Bonne-Heure dans les C^nes de Millançay, Vernou.
Prairies humides de la Sauldre dans les C^nes de Villeherviers, — Salbris, Pierrefitte, Souesmes, — Châtillon-sur-Cher.
Bords du ruisseau de Villemorand dans les C^nes de Neung et Montrieux.
C^ne de Gièvres : Prés humides du Cher entre l'Escourioux et Jaugy.
C^ne de Maray : Prés à Daluet.

═══ **sylvatica** L. Avril-juin.
Bois, bruyères et pelouses humides, C.

MELAMPYRUM cristatum L. Juillet-septemb.
Pâtureaux, bords des bois dans les terrains calcaires, R.R.
C^ne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger,* — talus gazonnés bordant le parc de la Gaudinière.

Digitized by Google

OROBANCHEÆ

MELAMPYRUM arvense L. Juin-juillet.
Moissons, C. dans les terrains calcaires.

pratense L. Juin-juillet.
Bois, pâtureaux, C.C.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

SCROPHULARIA *canina* L. Avaray, A.B. (Moi-même).
LINARIA *cymbalaria* Mill. Blois, A.B. (Moi-même).
— *arvensis* Desf. C^nes des Montils et de Pezou, A.B.V. (MM. Franchet et Nouel).
VERONICA *spicata* L. A.V. (M. Franchet).
— *verna* L. Les Ponts-Chartrains, A.B. (M. Franchet).
ODONTILES *Jaubertiana* D. Dietr. C^ne de Cour-Cheverny, A.B. (M. Franchet).
Le *Scrophularia vernalis* L., trouvé accidentellement à Blois, en a disparu.

OROBANCHEÆ Lindl.

PHELIPÆA arenaria Walp. Juin.
Sur les racines de l'*Artemisia campestris*.
C^ne de Soings : Coteau dominant le lac de Soings au Nord et au Nord-Ouest.

ramosa C.A. Mey. Août.
Sur les racines du *Cannabis sativa*.
C^ne de Pruniers : Le Grand-Village, — jardin de Marmagne.
C^ne de Gièvres : Jardin au bas de la Genetière.

Digitized by Google

OROBANCHEÆ

PHELIPÆA albiflora Gr. et God. Mai-juin.
Sur les racines du *Geranium pusillum*.
Cne de Pruniers : Terre de l'Abbaye contiguë aux bâtiments. Découvert en 1873, n'a pas reparu en 1874. Cette espèce, précédemment trouvée à Cheverny par M. Franchet, est-elle suffisamment distincte du *ramosa*?

OROBANCHE rapum Thuill. Mai-juin.
Sur les racines du *Sarothamnus scoparius* C., et du *Genista tinctoria* R.R.. Sur ce dernier plus petit dans toutes ses parties :
Cne de Loreux : Bruyères de Rosières.
Je l'ai trouvé complètement jaune
Cne de Lassay : Semis de bois au Rotay.

═══ **cruenta** Bert. *(O. Ulicis Desm.)* Juin.
Sur les racines de l'*Ulex nanus* C.C.
Var. **citrina** Coss. et Ger.
Cne de Pruniers : Bruyères bordant l'allée entre la Dabinerie et Longueville.

═══ **Galii** Vauch. Mai.
Sur les racines du *Galium verum*, A.C.
Cne de Romorantin : Prés des Crottés.
Cne de Lanthenay : Prés aux Perreux.
Cne de St-Julien : Pâtureau d'Olivet appelé le Jardin du Couvent.
Cne de Villefranche : Prés et pâtureaux du val du Cher.
Cne de Gièvres : Prés entre l'Escourioux et Jaugy.
Var. jaune dans toutes ses parties *(O. strobiligena Reich.)*.

Digitized by Google

C^ne de Lanthenay : Bords d'un chemin aux Perreux.

C^ne de Gièvres : Le haut du pâtureau de Jaugy.

OROBANCHE epithymum D.C. Juin.

Sur les racines du *Thymus Serpillum,* P.C.

C^ne de Soings : Sur le coteau dominant au Nord et au Nord-Ouest le lac de Soings, C.

C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, A.C.

C^ne de Salbris : Bords de la route de Romorantin à Salbris entre Valaudran et les forges de Belleville, A.C.

═══ **Teucrii** Hol. et Sch. Mai-juin.

Sur les racines du *Teucrium Chamœdrys*, R.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Clairières du bois de la Cave.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche et environs.

═══ **Picridis** Vauch. Juin.

Sur les racines du *Picris hieracioides.*

C^ne de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière.

NOTA. — L'*Orobanche Hederæ Vauch.* a été récolté par M. l'abbé Rimboux le 10 juillet 1853 au Nord de l'Abbaye. Je l'y ai vainement cherché depuis.

OROBANCHE minor Sutton. Mai-juillet.

Principalément sur les racines du *Trifolium pratense.* C.C. dans les C^nes de Romorantin et des environs où il infeste parfois les champs de trèfle après la première coupe.

Digitized by Google

Je l'ai récolté sur les racines des *Trifolium repens, Lathyrus odoratus, Ribes rubrum, Valerianella eriocarpa, Aster Chinensis, Tagetes patula, Petunias,* et *Cichorium Intybus.*

Var. jaune dans toutes ses parties *(O. concolor Bor.).*

C^ne^ de Lanthenay : Pré aux Étangs sur le *Trifolium pratense.*

OROBANCHE amethystea Thuill. Juin.

Sur les racines de l'*Eringium campestre,* A.C. notamment :

C^ne^ de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière.

C^ne^ de S^t^-Julien : Pâtureau d'Olivet appelé le Jardin du Couvent.

C^ne^ de Villefranche : *Pâtureau de la Parconière.*

C^ne^ de Billy : Le Tertre-Blanc.

C^ne^ de Gièvres : Champ des Calabres, — la Prévotière.

C^ne^ de Soings : Coteau dominant le lac et courant du Nord vers l'Ouest du côté de Contres.

C^ne^ de Châteauvieux : Péquignon.

C^ne^ de Noyers : Bords de la route de Noyers à Thésée.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

PHELIPÆA *caerulea* C.A. Mey, C^ne^ de Menars A.B. (MM. Roger et Mathonnet).

Digitized by Google

LABIATÆ

OROBANCHE *hederæ* Vauch. C^ne de Celettes, A.B. (M. Franchet).

LATHRÆA *squamaria* L. Forêt de Russy, A.B. (Moi-même).

CLANDESTINA *rectiflora* Lam. C^ne de Courbouzon, A.B. (M. Roger).

LABIATÆ Juss.

MENTHA rotundifolia L. Juillet-août.
Lieux humides, bords des fossés, C.

═══ **viridis** L. Août-septembre.
Je ne l'ai trouvé que C^ne de Gièvres : Bords d'une mare au pied de la haie méridionale d'un taillis près et au Sud du Vivier. Spontanéité douteuse.

═══ **aquatica** L. Juillet-août.
Lieux humides, bords des eaux, C.C.

Var. **hirsuta** Koch. Août, R.
C^ne de Romorantin : Marnières des Monteaux.

Var. **subspicata** Weih. Juillet, A.C.
C^ne de Romorantin : Fossé du chemin de Romorantin au Liot avant les Monteaux.
C^ne de Pruniers : Fossés dans l'ancien étang du Ponceau.
C^ne de Villeherviers : Bords du Riau-Mabon près de son confluent, etc.

═══ **sativa** L. Août-septembre.
Bords des eaux.
C^ne de Romorantin : Ile de Mousseaux.

Digitized by Google

LABIATÆ

MENTHA arvensis L. Juillet-septembre.
Bords des étangs, champs humides, C.

═══ **Pulegium** L. Juillet-août.
Fossés, bords des eaux, C.C.

LYCOPUS Europæus L. Juillet-août.
Fossés, lieux humides, C.C.

ORIGANUM vulgare L. Juillet-août.
Bords des bois et des haies dans les terrains calcaires, A.C., notamment :
C^ne^ de Romorantin : Bords d'un pré de la rive gauche de la Nasse près le pont de la Nasse.
C^ne^ de Pruniers : Lisière occidentale du bois de la Gascetière.
C^ne^ de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*
C^nes^ de Gièvres et Selles-sur-Cher : Val du Cher, et encore : C^ne^ de Noyers, etc.

THYMUS Serpillum L. Juin-septembre.
Pelouses sèches, bruyères, C.
Var. **angustifolius.**
C^ne^ de Gièvres : Semis de pins à l'Escourioux.

═══ **Chamædrys** Fries. Septembre.
Pelouses sèches des terrains sablonneux, C.

CALAMINTHA Acinos Clairv. Mai-juin, septembre.
Champs pierreux et incultes, principalement calcaires, A.C., notamment :
C^ne^ de Lanthenay : Moissons des Petits-Guideaux.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche, — de la Gascetière.
Cne de Villeherviers : Terres contiguës aux grandes marnières des Roches.
Cne de Billy : Le Tertre-Blanc.
Cne de Gièvres : Terre du Vivier, etc.
Cne de Soings : Coteaux au Nord-Ouest du lac.
Cne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche et abords.

CALAMINTHA Clinopodium Benth. Juin-juillet.
Haies, buissons, C.

MELISSA officinalis L. Août-septembre.
Bords des haies et des murs, R.
Cne de Romorantin : Haies aux environs du Pont de Bois, — ruelle près le Couvent de la Nativité, C.
Cne de Pruniers : Pied d'une haie dans le bourg, R. — *Haie du petit pâtureau de la Cornuère.*
Cne d'Orçay : Dans le bourg aux abords d'un ancien fossé de château, R.
Cne de Selles-sur-Cher : Pied d'un mur dans l'ancien parc du château, R.R.
Cne de Gièvres : Talus de fossé près l'écluse de Jaugy, R.R.
Spontanéité très-douteuse.

SALVIA pratensis L. Mai-juin.
Pelouses des terrains calcaires des environs de Romorantin, C.

Digitized by Google

LABIATÆ

NEPETA Cataria L. Juillet-août.
Je ne l'ai trouvé que
C^ne de Pruniers : Abords de Champleroy et rive gauche de la Sauldre dans un champ inculte vis-à-vis Champleroy.

GLECHOMA hederacea L. Mars-mai.
Haies, bois, lieux couverts, C.C.

LAMIUM amplexicaule L. Avril-mai.
Vignes, jardins, vieux murs, C.

═══ **hybridum** Vill. Mai-juin.
Je ne l'ai récolté que
C^ne de Maray : Jardin de Daluet, R.R.

═══ **purpureum** L. Mars-octobre.
Vignes, cultures, pied des haies, C.C.

═══ **maculatum** L. Avril-juillet.
Lieux frais près des murs, lieux couverts, R.
C^ne de Mennetou : Autour des murs de ville, — pentes extérieures des levées du canal du Berry près la ville, C.
C^ne de S^t-Julien : Pentes boisées entre le pont et le village de S^t-Julien, R.R., — Olivet et prairie environnante, C.

═══ **album** L. Mai-juin.
Haies, pied des murs, R.R.
C^ne de Romorantin : Haie du chemin des Petits-Guideaux près d'une habitation.
C^ne de Lanthenay : Abords du chemin et d'une maison près du village de Mousseaux.

Digitized by Google

Cne de Gy : Pied de l'abside de l'église dans un terrain inculte mais herbeux.

Cette espèce est-elle spontanée?

LAMIUM Galeobdolon Crantz. Avril-mai.

Bois, haies, R.R.

Cne de St-Loup : Bords du Roulier près la ferme du Roulier, — vallée du ruisseau de la Grange et, particulièrement, bois du Fondereau.

LEONURUS Cardiaca L. Juin-septembre.

Haies, bords des murs, A.C., notamment :

Cne de Romorantin : Haies des Crottés, — haies aux environs du moulin des Garçonnets.

Cne de Lanthenay : Haie bordant la route de Salbris.

Cne de Loreux : Autour de la ferme des Gasts.

Cne de Pruniers : Haie du jardin de la Cornuère, — haies dans le bourg.

Cne de Villeherviers : Abords des Roches.

Cne de Neung : Ferme d'Avignon.

Cne de Selles-St-Denis : Abords des Anges.

GALEOPSIS angustifolia Ehrh. Juillet-août.

C. seulement dans les terrains calcaires,

Cne de Romorantin : Terres aux Arrogantes.

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche, etc.

Cne de Villefranche : Moissons calcaires de la Gaudinière.

Cne de Pierrefitte : Maubertin.

Digitized by Google

Cne de Selles-sur-Cher : Terres au confluent de la Sauldre et du Cher.

Cne de Gièvres : Terres calcaires du Vivier.

GALEOPSIS dubia Leers. Juillet-octobre.

Moissons des terrains sablonneux, C.

═══ **Tetrahit** L. Juillet-août.

Bords des bois et des haies, C.

Var. **pubescens** *(G. pubescens Bess.)*.

Cne de Gièvres : Cultures humides entre la ferme des Petits-Étangs et le canal du Berry, C.

Cne de St-Loup : Taillis de Sauveterre récemment abattu.

STACHYS Germanica L. Juin-août.

Lieux incultes et bords des chemins dans les terrains calcaires, A.C., notamment :

Cne de Lanthenay : Bords des murs du Lieu.

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche, etc.

Cne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy, du Vivier, etc.

═══ **sylvatica** L. Juin.

Haies, bords des fossés ombragés, bois frais, C.

═══ **palustris** L. Juin-juillet.

Bords des eaux et marécages, C.

═══ **arvensis** L. Juillet, octobre.

Cultures, moissons, A.C. notamment :

Cne de Pruniers : Jardin et Moissons à la Cornuère, etc.

Digitized by Google

Cne de Veilleins : Moissons bordant la route de Romorantin à Vernou, entre les bornes 78 et 79, — terre des Levées sise au Nord du bois des Dix-Septrées.

Cne de Langon : Ancien étang du Liot.

Cne de Villefranche : Jardin à l'Escourioux.

Je l'ai trouvé encore : Cnes de Loreux, Villeherviers, — La Ferté-St-Cyr, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Orçay, Theillay, — Gièvres, Gy.

STACHYS annua L. Juillet-septembre.

Champs calcaires, R.

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche.

Cne de Billy : Moissons calcaires du Tertre-Blanc.

Cne de Thésée : Moissons dans le bourg.

═══ **recta** L. Juin.

Terres incultes et sablonneuses, C.

BETONICA officinalis L. Juin-juillet.

Pâtureaux, bois, bruyères, C.

BALLOTA fœtida Lam. Juillet.

Bords des murs, des chemins, C.

MARRUBIUM vulgare L. Juillet.

Bords des murs et des chemins, C.

MELITTIS Melissophyllum L. fl. mai-juin, fr. juillet.

Bois principalement des terrains calcaires, R.

Digitized by Google

Cne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines dans la partie contiguë au département de l'Indre du côté de Ste-Catherine, R.

Cne de St-Loup : Bois futaie entre les Goujons et Beauvais, R.R.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche et partie de la forêt de Grosbois y attenant, A.C.

SCUTELLARIA hastifolia L. fl. Mai-juin, fr. juillet.

Lieux humides, R.R.

Cné de Pruniers : Bas fond du val de la Sauldre (rive droite) dans un ancien pâtureau de Champleroy, R.R.

Cne de Thésée : Terrains humides du val du Cher vis-à-vis la vallée de Chantereine.

═══ **galericulata** L. Juillet-août.

Bords des eaux, lieux humides, A.C., notamment : Val du Cher, de la Sauldre, et en outre :

Cne de Pruniers : Bords de l'étang de Bâtarde, — de l'ancien étang Facy, — des étangs des Landes, — de Longueville, etc.

Cne de Villefranche : Bords du canal du Berry entre Villebrette et l'Escourioux.

Cne de Marcilly-en-Gault : Marécages à la queue de l'étang de Bièvre au bas de Boisquillon.

Cne de Gy : Bords des nombreux marais de la rive droite de la Croisne.

Digitized by Google

Et encore C^nes de St-Viâtre, — Selles-s-Cher, Gièvres, Soings, etc.

SCUTELLARIA minor L. Juin-septembre.

Terrains spongieux, bruyères humides, A.C., notamment :

C^ne de Lanthenay : *Marais entre les étangs de Courmin et de Nobière,* — bords d'un ruisseau à la Flandrinière.

C^ne de Veilleins : Bruyères humides entre Tréfontaine et les Levées, — au bas de la levée de l'étang de Bordebure où il varie à fleurs blanches, — marais du Pavillon, et encore :

C^nes de Neung-sur-Beuvron, — Marcilly-en-Gault, Orçay, Pierrefitte, Souesmes, St-Viâtre, Theillay.

BRUNELLA vulgaris L. Juin-juillet.

Pelouses, bois, pacages, C.

Var. **pennatifida** God.

C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

═══ **alba** Poll. Juin.

Pacages, pelouses, bruyères, C.

Var. **integrifolia.**

C^ne de Pruniers : Pelouses vis-à-vis la Pesière.

Var. à fleurs roses et à fleurs lilas.

C^ne de St-Loup : Pacage de la rive gauche du Roulier au confluent du ruisseau de la Grange et du Roulier.

═══ **grandiflora** Mœnch. Juillet-août.

Bois et coteaux calcaires, R.

Digitized by Google

Cne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon, R.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

AJUGA reptans L. Avril-mai.

Prés, C.

Je l'ai trouvé, à fleurs roses :

Cne de Lanthenay : Pré aux Étangs.

A fleurs blanches :

Cne de Villefranche : *Pâtureau de la Parconière.*

A tiges sans stolons :

Cne de Pruniers : Pré à Longueville.

A stolons tous ou presque tous fertiles :

Cne de Romorantin : Pré dans le bas des Crottés.

Cne de Millançay : Forêt de Bruadan, talus d'un chemin près Varenne.

Cne de Pruniers : Bords des marnières de la Besaudière, — entrée d'un pré voisin et à l'Est de Bâtarde.

Cne de Villeherviers : Bords d'une marnière à la Gaillardière.

Genevensis L. Mai.

C. seulement dans les terrains calcaires.

Je l'ai trouvé à fleurs blanches :

Cne de St-Julien : Champ bordant au Sud la route entre St-Julien et Chantemerle.

A fleurs roses :

Cne de Villefranche : *Bords d'une carrière de pierres à l'entrée du bourg.*

Digitized by Google

Dans cette localité, aujourd'hui détruite, les bractées étaient très-grandes et rappelaient celles de l'*A. pyramidalis*, les feuilles radicales étaient très-petites et presque détruites.

AJUGA pyramidalis L. Avril-mai.

Bruyères, bords des bois.

Varie à tiges simples dans les bruyères et à tiges nombreuses partant toutes du collet de la racine dans les terrains meubles, A.C., notamment :

C^ne^ de Millançay : Terre du Châlet-S^t^-Genoult bordant le chemin de Millançay à Varenne, à fl. bleues et à fl. roses, — bruyères de Villechenay, — bruyères bordant la route de Romorantin à Orléans.

C^ne^ de Pruniers : *Entrée du pâtureau des Granges*,— bruyères bordant l'allée entre la Dabinerie et Longueville, R.R.,— bruyères entre l'étang des Landes et la route de Gy, — bruyères entre les Landes et la Chapelle.

C^nes^ de Veilleins et Vernou : Bruyères et anciennes bruyères bordant la route de Romorantin à Vernou, çà et là, sur 8 kil. de parcours.

C^ne^ de Dhuizon : Bruyères bordant la route de Dhuizon à La Ferté-S^t^-Cyr.

C^ne^ de La Ferté-S^t^-Cyr : Bords de la route de Beaugency, — bois de La Ferté, C.

Digitized by Google

LABIATÆ

AJUGA Chamæpitys Schreb. Mai-août.
Terrains calcaires seulement, P.C.
C^ne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche.
C^ne de Villefranche : Terres calcaires de la Gaudinière.
C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc.
C^ne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy et du Vivier.
C^ne de Soings : Coteau au Nord et au Nord-Ouest du lac.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

TEUCRIUM Botrys L. Juillet-septembre.
Champs calcaires, R.R.
C^ne de Billy : Moissons au Tertre-Blanc.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

Scordium L. Juillet-août.
Étangs, fossés, marnières abandonnées.
C. surtout dans les terrains calcaires.
Var. à fleurs blanches :
C^ne de Villeherviers : Terres contiguës aux grandes marnières des Roches.

Scorodonia L. Juin-septembre.
Bois, C.

Chamædrys L. Juillet.
Bords des bois et des pelouses dans les terrains calcaires, P.C.
C^ne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

Digitized by Google

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Clairières dans le bois de la Cave.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche et partie de la forêt de Grosbois y attenant.

TEUCRIUM montanum L. Juin-août.

Coteaux calcaires.

(Mêmes localités que le **T. Chamædrys.**)

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

MENTHA *sylvestris* L., C^ne de S^t-Laurent-des-Eaux, A.B. (M. E. Roger).

ORIGANUM *vulgare* L. Var. *prismaticum* Gaud. C^ne de Cheverny, A.B. (M. Franchet)

HYSSOPUS *officinalis* L. C^ne de Montoire, A.V. (M. Peltereau).

CALAMINTHA *officinalis* Mœnch. C^ne de S^t-Dyé, A.B. (M. E. Roger).

LAMIUM *maculatum* L. Var. *niveum* Sch. C^ne d'Avaray, A.V. (M. E. Roger).

STACHYS *Alpina* L. C^ne de Mondoubleau, A.V. (M. Em. Desvaux).

SALVIA *verbenaca* C^ne de Cheverny, A.B. (M. Franchet).

— *sclarea* L. Les Montils, A.B. (M. Franchet).

LEONURUS *Marrubiastrum* L. S^t-Laurent-des-Eaux, A.B. (M. Franchet).

Ces trois dernières espèces sont-elles spontanées?

La difficulté de déterminer les espèces litigieuses dans le genre *Mentha* m'en fait omettre plusieurs des bords de la Loire et des environs de Romorantin.

VERBENACEÆ Juss.

VERBENA officinalis L. Juin-septembre.

Bords des chemins, décombres, C.

Digitized by Google

PLANTAGINEÆ Juss.

PLANTAGO major L. Juillet-octobre.
Bords des chemins, pelouses fraîches, val des rivières, C.

═══ **intermedia** Gilib. Septembre.
Bords des étangs, grèves des rivières.
C^ne^ de Villefranche : Grèves du Cher à l'Escourioux.
C^ne^ de Lanthenay : Bords de l'étang de Courmin.
Est-il distinct suffisamment du *Pl. major*?

═══ **media** L. Juin-juillet.
Pelouses des terrains calcaires, A.C.
C^ne^ de Gièvres : Rive gauche du canal du Berry en aval de l'Escourioux, — environs de Jaugy, — bords du bois du Poulinat, etc.
C^ne^ de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

═══ **Coronopus** L. Juin-octobre.
Chemins et pelouses, principalement des terrains sablonneux, C.C.

═══ **carinata** Schrad. Juin-septembre.
Terres incultes, bords des chemins sablonneux et des bruyères.
C^ne^ de Lanthenay : Bords du chemin et lisière de bois de pins à Queue-de-Loup, R., — chemin de Queue-de-Loup à Belair, à la hauteur de l'étang de Nobière, R.
C^ne^ de Pruniers : Bords des landes de la Gascetière dominant la route de Selles-sur-

Digitized by Google

Cher, — talus du fossé méridional de cette route un peu avant les Quatre-Roues.

Cne de Villeherviers : Lisière septentrionale d'un bois de pins de Queue-de-Loup bordant au Nord la route de Romorantin à Loreux.

Cne de Gièvres : Terrains sablonneux bordant le chemin entre le Poulinat et la Prévotière.

Cne de Gy : Lisière d'un bois de pins bordant les bruyères de Boureau.

Cne de La Ferté-Imbault : Bords de la route de Salbris entre les bornes 19 et 20.

Cne de Selles-St-Denis : Bords de la route de Salbris vers la borne N° 12, — bords du chemin de Selles-St-Denis à Veur, à la hauteur du moulin de Sauldré, etc.

Je l'ai trouvé encore : Cnes de Theillay, Salbris, Pierrefitte, Souesmes et surtout dans ces trois dernières communes où il foisonne.

PLANTAGO lanceolata L. Avril-octobre.
Prés, pacages, C.C.

═══ **arenaria** Wald et K. Juillet-août.
Terres sablonneuses, A.C., notamment :
Cne de Pruniers : Terres vis-à-vis les Beaunes.
Cne de Gy : Terres de la rive droite de la Croisne dans la région des marais.
Cne de Soings : Coteau au Nord du lac, etc.

LITTORELLA lacustris L. Mai-octobre.
Bords des étangs, C.C.

Digitized by Google

PLUMBAGINEÆ Endl.

ARMERIA plantaginea Willd. Juin-septembre. Bords des chemins, pelouses et champs incultes des terrains sablonneux, C.

GLOBULARIEÆ D.C.

GLOBULARIA vulgaris L. Juin-juillet. Pelouses sèches des coteaux calcaires.

C^ne^ de Billy : Le Tertre-Blanc dans une partie restée inculte entre les vignes, au Nord de la route de Selles à Billy, R.

C^ne^ de Châteauvieux : Péquignon, R.R.

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Clairières du bois de la Cave.

C^ne^ de Noyers : Carrières de Belleroche.

AMARANTACEÆ R. Br.

AMARANTUS deflexus L. Juillet-octobre. Pied des murs.

C^ne^ de Romorantin : *Pied des murs du quai Vallois* (la création d'un square l'en a fait disparaître), — ruelle de la Roulette faubourg de S^t^-Roch, C. (Rien ne fait supposer que l'apparition de cette espèce soit récente à Romorantin où elle ne devait pas être facilement remarquée. J'ai tout lieu de l'y croire spontanée.

Digitized by Google

AMARANTACEÆ

AMARANTUS Blitum L. Juillet-octobre.
Pied des murs.
C^ne de Romorantin : Rues peu fréquentées de la ville et rues des faubourgs, A.C.
C^ne de Gy : Dans le bourg.

═══ **sylvestris** Desf. Juillet-septembre.
Cultures, décombres, C.

═══ **retroflexus** L. Juillet-octobre.
Voisinage des habitations, décombres.
C^ne de Salbris : Abords de la station du chemin de fer, C.C.
C^ne de Thésée : Jardins et décombres dans le bourg.

POLYCNEMUM majus Al. Br. Juillet-septemb.
Terrains incultes et calcaires.
C^ne de Billy : Le Tertre-Blanc, R.R.
C^ne de Soings : Terre bordant l'ancien chemin de Contres au bas de la butte qui se prolonge au Nord-Ouest du lac, R.
C^ne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

═══ **arvense** Gr. God. *(P. Verrucosum Boreau.)* Juillet-septembre.
Terres arides, A.C.
C^ne de Romorantin : Terre contiguë aux marnières des Monteaux.
C^ne de Pruniers : Terre inculte de Marmagne bordant le chemin de Romorantin à Pruniers, — terres incultes de la rive droite de la Sauldre près des Quatre-Roues et, plus bas, au confluent du ruisseau de Bâtarde.

Digitized by Google

C^ne de Mennetou : Terre de la rive gauche de l'étang de Veillère.

C^ne de Maray : Terre bordant la route de S^t-Loup à Maray à mi-chemin.

C^ne de S^t-Julien : Terre bordant à l'Est la route de S^t-Julien à Graçay au Sud du pâtureau de Charbonnière.

C^ne de Gièvres : *Terres sablonneuses de l'Escourioux dans un semis de pins*, — moissons de Bois-Ribault contiguës au chemin et au jardin.

SALSOLACEÆ Moq.-Tand.

ATRIPLEX hastata L. Août-septembre.

Bords des chemins, décombres, A.C.

C^ne de Romorantin : Ruelles des Crottés.

C^ne de Pruniers : Entre le bourg et le Grand-Village, etc.

patula L. Août-septembre.

Bords des chemins, C.C.

CHENOPODIUM polyspermum L.

Septembre-octobre.

Lieux cultivés, grèves des rivières, A.C.

C. sur les grèves du Cher.

Je l'ai trouvé encore :

C^ne de Pruniers : Rouère de l'étang de Longueville, — mare à la Cornuère, — jardin de Champleroy, etc.

Digitized by Google

C^ne de Vernou : Bords du Beuvron au-dessous de Villeneuve.
C^ne d'Orçay : Vigne à la Moinerie-des-Bois.
C^ne de Theillay : Ruisseau entre le bourg et le chemin de fer.

CHENOPODIUM Vulvaria L. Juillet-août.
Pied des murs dans le voisinage des habitations, C.C.

═══ **album** L. Juillet-septembre.
Bords des chemins, décombres, lieux cultivés dans le voisinage des habitations, C.C.

═══ **opulifolium** Schrad. Juillet-octobre.
Bords des chemins dans le voisinage des habitations, A.C.
C^ne de Romorantin : Rue des Capucins, — entrée du Haut-Mail, — rue du Faubourg de S^t-Roch, — rue des Limousins, etc.
C^ne de Lanthenay : Mousseaux.
C^ne de Loreux : Rue du bourg.
C^ne de Pruniers : Le bourg.
C^ne de S^t-Viâtre : Le Grand-Cernéan.

═══ **hybridum** L. Juillet-août.
Lieux cultivés dans le voisinage des habitations, C.

═══ **urbicum** L. Var. *intermedium (Ch. intermedium M. et K.)*.
Voisinage des habitations, bords des chemins, R.R.
C^ne de Pruniers : Abords de Champleroy où je ne l'ai plus retrouvé.

Digitized by Google

C^ne de Vernou : Terre de Mariaville bordant à l'Est la route de Romorantin à Vernou dans des terrains récemment défrichés.
Spontanéité très-douteuse.

CHENOPODIUM murale L. Août-septembre.
Décombres, pied des murs, C.

glaucum L. Juillet-août.
Terrains gras, écoulements de fumiers, grèves du Cher et des étangs desséchés, A.C.
C^ne de Romorantin : Fossés du chemin aux Petits-Guideaux.
C^ne de Loreux : Les Gasts.
C^ne de Maray : Dalluet, etc.

Bonus-Henricus L. Juin-septembre.
Pied des murs, R.
C^ne de Loreux : Pied du mur du cimetière dans la rue du bourg.
C^ne de S^t-Loup : Cour du presbytère et village.
C^ne de Salbris : Cour du Thou.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

CHENOPODIUM *rubrum* L. Sables de la Loire, A.B. (M. Franchet).
BLITUM *virgatum* L. C^ne d'Avaray, A.B. (M. E. Roger)

POLYGONEÆ Juss.

RUMEX maritimus L. Juillet-septembre.
Lit desséché des étangs, mares, A.C.
C^ne de Romorantin : *Bords de l'étang des Monteaux.*

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Étang desséché de la Pesnière, C.C., — étang de la Flandrinière, — queue de l'étang de Courmin.

Cne de Pruniers : Étang de la Châtre.

Cne de Veilleins : Mare bordant la route de Mur, à la sortie du bourg.

Cne de Villeherviers : Mare à Champvioux.

Cne de Langon : Ancien étang du Liot.

Cne de Soings : Bords du lac.

RUMEX pulcher Juillet-août.

Bords des chemins et des murs, C.

═══ **Friesii** G.G. *(R. obtusifolius D.C.)* Juillet-août.

Lieux frais, cours des fermes, bords des chemins et des murs, C.

═══ **conglomeratus** Murr. Juillet-août.

Bords des eaux, bois et pâtureaux humides, fossés, C.

═══ **nemorosus** Schrad. Juillet.

Bois, bords des eaux, R.

Cne de Pruniers : Bords du ruisseau de Bâtarde entre deux pâtureaux près de son confluent.

Cne de Ségy : Rouère du Coupe-Gorge.

Var. **coloratus** *(R. sanguineus L.)*

Spontanéité douteuse.

Cne de Villefranche : Haie de vigne en regard de la terre du Pérou au Sud de la Richaudière, R.R.

Digitized by Google

POLYGONEÆ

RUMEX crispus L. Juin-juillet.
Champs, prés, C.C.

═══ **Hydrolapathum** Huds. Juillet-août.
Bords des eaux et notamment du Cher, de la Sauldre, du canal du Berry, C.

═══ **acetosa** L. Mai-Juin.
Prés, C.C.

═══ **acetosella** L. Mai-juin.
Terres incultes, pâturages secs et sablonneux, C.C.

POLYGONUM amphibium L. Juin-août.
Étangs, rivières, C.

═══ **Lapathifolium** L. Juillet-octobre.
Fossés, mares, bords des rivières, C.

═══ **Persicaria** L. Juin-août.
Lieux frais, fossés, C.

═══ **minus** Huds. Juillet-septembre.
Bords des étangs, fosses, marécages.
C^ne^ de Pruniers : Mare au Grand-Village.
C^ne^ de Neung-sur-Beuvron : Fossé bordant à l'Ouest la route de Romorantin à Orléans un peu avant le pont d'Avignon.
C^ne^ de Marcilly-en-Gault : Autour de l'étang de Courcelle et surtout de l'étang de l'Aunay, — Fosse contiguë à la ferme de l'Aunay, C.C.
C^ne^ de Pierrefitte : Abords du moulin de Boute.

═══ **Hydropiper** L. Juillet-septembre.
Fossés, C.C.

Digitized by Google

POLYGONEÆ

POLYGONUM mite Schranck *(P. hydropiperi-dubium G.G.)* Août-octobre.

Lieux humides, C. surtout dans le val du Cher.

aviculare L. Juillet-octobre.

Moissons, rues, grèves, lieux sablonneux, C.C.

Var. **arenarium** G.G.

Grèves du Cher, C.

Bellardi All. Juillet-août.

Moissons des terrains calcaires, A.R.

C^ne^ de Romorantin : Moissons de la Richaudière bordant à l'Est le chemin de Villefranche.

C^ne^ de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière.

C^ne^ de Villefranche : Moissons calcaires de la Gaudinière.

C^ne^ de Billy : Moissons du Tertre-Blanc.

C^ne^ de Gièvres : Moissons calcaires du Vivier.

Convolvulus L. Juin-juillet.

Lieux cultivés, C.

dumetorun L. Juin-septembre.

Haies, buissons, C.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

RUMEX *scutatus* L. C^ne^ de Blois, A.B. (M. Mathonnet).

On cultive en grand dans les environs de Romorantin les *Polygonum fagopyrum* L. et *P. Tataricum* L.; ce dernier est beaucoup moins répandu que le *P. fagopyrum*.

Digitized by Google

DAPHNOIDEÆ Vent.

DAPHNE laureola L. Mars-avril.
C^ne de Saint-Aignan : Parc du château, R.R.

PASSERINA annua Spreng. Juillet-septembre.
Champs calcaires ou voisins du calcaire, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Champ au Sud de la Richaudière.
C^ne de Pruniers : Moissons de la Maison-Blanche, — de la Cornuère, etc.
C^ne de Villefranche : Moissons calcaires de la Gaudinière.
C^ne de Billy : Moissons du Tertre-Blanc et du moulin de Larey.
C^ne de Gièvres : Moissons calcaires du Vivier, de Jaugy, etc.
C^ne de Châteauvieux : Moissons de Péquignon.

SANTALACEÆ R. Br.

THESIUM humifusum D.C. Juillet-août.
Pelouses arides, C.

ARISTOLOCHIEÆ Juss.

ARISTOLOCHIA Clematitis L. fl. mai, fr. août.
Haies, champs, A.R.
C^ne de Pruniers : Champ calcaire à l'Ouest du bois de la Gascetière contigu aux terres de la Maison-Blanche.

Digitized by Google

Cue de Selles-sur-Cher : Bas-côté de la route de Valençay près de Selles, — bords du Cher (rive droite) près et au-dessous du pont de Selles, — bords du Cher (rive droite) entre la Thizardière et le confluent de la Sauldre, dans des saules, C.

EUPHORBIACEÆ Juss.

EUPHORBIA helioscopia L. Juin-octobre.
Lieux cultivés, C.C.

platyphylla L. août-septembre.
Clairières des bois et pâtureaux calcaires, R.
Cne de Pruniers : Bords de la grande allée du bois de l'Abbaye.
Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*

stricta L. Juin-juillet.
Val du Cher, de la Sauldre, du Roulier, C., çà et là ailleurs.

pilosa L. Avril-Juin.
Bois.
Cne de St-Julien : Taillis des Terres-Rouges au Sud de la prairie qui le divise en deux parties.
Cne de St-Loup : Futaie et bois taillis près Beauvais, — bois au Nord et près des Brillants.

dulcis L. Avril-juin.
Haies, bois, pâtureaux, prés, A.C.
Cne de Romorantin : Ile des Poulies, C.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Haie méridionale du chemin entre Champleroy et le ruisseau de Bâtarde, — haie d'un pré de la Besaudière bordant le ruisseau de Bâtarde.

Cne de Villeherviers : Bas du parc du Portail, — bords de la Beauce à son confluent.

Cne de St-Julien : Bords du pré traversé par le ruisseau de Chantemerle.

Cne de St-Loup : Bords du Roulier près la ferme du Roulier, — futaie près Beauvais.

Cne de Soings : Bords d'une prairie marécageuse du moulin Hadry sur la rive droite de la Croisne entre la source et le moulin, R.R.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

Et encore Cne de La Chapelle-Montmartin.

EUPHORBIA verrucosa Lam. Mai-Juillet.

Cne de Châteauvieux : Bas du coteau de Péquignon et surtout bords du fossé qui sépare ce coteau de la prairie.

═══ **Gerardiana** Jacq. Mai-juin.

Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc, — terres incultes et calcaires entre la route de Selles à Blois et le bourg de Billy, C.C.

═══ **Cyparissias** L. Avril-juin.

Bords des chemins, C.C.

═══ **exigua** L. Juin-Juillet.

Terres calcaires, A.C.

Cne de Lanthenay : Terre bordant le chemin des Verdons, — terres bordant le chemin des Petits-Guideaux.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Terres calcaires de la Besaudière, etc.
C^ne de Maray : Terres de Daluet.
C^ne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy, — de la Grange de Rère, etc.
Et encore C^ne de Selles-sur-Cher, etc.

EUPHORBIA peplus L. Mai-octobre.
Lieux cultivés, C.C.

amygdaloides L. Avril-juin.
Bois, pâtureaux, C.

Lathyris L. Juin.
Voisinage des habitations dans la campagne, RR.
Spontanéité douteuse.
C^ne de Lanthenay : Abords de la Dabinerie.
C^ne de Pruniers : Jardin de la Cornuère.
C^ne de Villefranche : Jardins du bourg à son extrémité orientale.

MERCURIALIS annua L. Juin-octobre.
Lieux cultivés, C.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

EUPHORBIA *esula* L. C^ne d'Avaray, A.B. (M. E. Roger).
— *falcata* L. C^ne d'Avaray, A.B. (M. E. Roger).

MERCURIALIS *perennis* L. C^ne de Celettes, A.B. (M. Franchet.

BUXUS *sempervirens* L. C^ne d'Orchaise, A.B. (M. Franchet).

Digitized by Google

ULMACEÆ Mirbel.

ULMUS campestris Sm. Mars-mai.
Haies, pâtureaux, A.C. mais seulement dans le val du Cher, de la Sauldre et les terrains calcaires; manque dans les terrains sablonneux.

Var. **B. suberosa** aussi commune que le type.

═══ **effusa** Willd. Avril.
Pâtureaux, haies, R.R. Spontanéité douteuse.

C^ne^ de Villefranche : Haie du val du Cher à l'Escourioux, —*pâtureau de la Parconière.*

C^ne^ de S^t^-Loup : Cour d'Olivet.

On cultive le *Morus alba* et l'*Ulmus major* Sm. est planté sur les bords de plusieurs routes autour de Romorantin.

URTICEÆ D.C.

URTICA urens L. Juin-juillet.
Lieux cultivés, décombres, C.

═══ **dioica** L. Juin-juillet.
Bords des chemins, décombres, C.

PARIETARIA diffusa M.K. Juillet-octobre.
Vieux murs, C.

Digitized by Google

Autre espèce de Loir-et-Cher.

URTICA *pilulifera* C^ss d'Onzain, A.B. (M. Moreau).

CANNABINEÆ Endl.

HUMULUS lupulus L. fl. Juillet-août, fr. octobre.

Bords des rivières, haies, buissons, C. surtout aux bords du Cher.

Le *Cannabis sativa* se cultive dans les jardins de presque toutes les fermes.

CUPULIFEREÆ A. Rich.

QUERCUS sessiliflora Sm. Mai.

Bois des terrains calcaires, R.R.

C^ne de Pruniers : Bois de la Gascetière, R.

C^ne de Villefranche : Bois de l'Escourioux contigus à la chaussée du canal, R.

C^ne de Gièvres : Bois du Poulinat, R.

═══ **pedunculata** Ehrh. Mai.

Bois des terrains argileux, C.C.

═══ **Fastigiata** fl. mai, fr. septembre.

C^ne de Millançay : Pâtureau de la ferme de la Marlière au milieu duquel se trouve un pied unique mesurant 2^m15 de circonférence et ayant environ 10^m de hauteur, loin de toute habitation et de toute culture. Sa forme est celle d'un ovale très-allongé et

Digitized by Google

très-régulier, ses branches principales naissent en grand nombre à moins de 3m au-dessus du sol et après s'être dirigées presque horizontalement se redressant brusquement et verticalement; la forme de ses cupules et sa villosité rappellent le *Q. sestiliflora*, la forme de ses feuilles à lobes arrondis et peu profonds est celle du *Q. pedunculata*.

QUERCUS toza Bosc. fr. septembre.

Cne de Lamotte-Beuvron : Bois dans le parc du château aux environs de la tuilerie.

NOTA. — Il résulte des renseignements que j'ai recueillis que le *Q. toza* est très-commun dans la commune de Vouzon où l'on trouve des individus plusieurs fois séculaires.

= **cerris** L. fr. septembre.

Cne de La Ferté-Beauharnais : Parc du château aux abords du Beuvron. Il existe en outre aux environs sur la rive droite du Beuvron 3 petits taillis semés il y a 40 ans et plus et parfaitement réussis. Ce chêne est connu dans le pays sous le nom de chêne d'Anjou ou chêne-châtaigne.

CORYLUS avellana L. fl. janvier-avril, fr. août. Bois, buissons, pâtureaux, C.

CARPINUS betulus L. fl. mai, fr. juillet-août. Taillis, haies, pâtureaux, C.

Digitized by Google

CUPULIFEREÆ

Autre espèce de Loir-et-Cher.

FAGUS *sylvatica* L. Forêt de Russy, A.B. (Moi-même).

On cultive en grand le *Castanea vulgaris* dans l'arrondissement de Romorantin et le *Juglans regia* aux environs de St-Aignan.

SALICINEÆ V. Rich.

SALIX fragilis L. Avril-mai.
Bords des eaux, R.R.
Cne de Lanthenay : Presqu'île de Longuevalle où je n'ai trouvé qu'un seul pied.

═══ **alba** L. Avril-mai.
Bords des eaux, prés, fossés, C.C.

═══ **amygdalina** L. Avril-mai.
C. surtout aux bords du Cher et de la Sauldre.

═══ **undulata** Ehrh. Avril-mai.
Bords des eaux.
C. aux bords du Cher et de la Sauldre.
Cne de Pruniers : Rive gauche de la Sauldre au-dessous du pont de Pruniers.

═══ **hippophaefolia** Thuill. Avril.
Bords des eaux.
Cne de St-Julien : Bords du Cher en aval du pont de St-Julien.
Est-il suffisamment distinct du *Salix undulata?*

Digitized by Google

SALIX purpurea L. Mars-avril.
Bords du Cher et de la Sauldre, C.

═══ **rubra** Huds. Avril.
Bords des eaux.
Varie à filets des étamines presque libres et presque soudés avec tous les intermédiaires.
Bords du Cher, C. — Bords de la Sauldre, A.C. notamment :
Cne de Romorantin : Ile au bas du moulin de Launay, — Longuevalle (rive gauche).
Cne de Lanthenay : En amont de Longuevalle aux bords de la fosse communiquant avec la Sauldre.
Cne de Pruniers : Bords de la Sauldre entre le gué des Moulins-Neufs et le bourg, etc.

═══ **viminalis** L. Mars-avril.
Bords du Cher, C., bords de la Sauldre, P.C.
Cne de Romorantin : Ile au bas du moulin de Launay.
Cne de Lanthenay : Presqu'île de Longuevalle.
Cne de Pruniers : Rive droite de la Sauldre.

═══ **cinerea** L. Mars-avril.
Haies, lieux humides, bords des eaux, C.C.
M. Max. Cornu a découvert, dans le val de la Sauldre à l'extrémité d'une marnière au bas des vignes de Moulin-Neuf Cne de Villeherviers, un pied androgyne dont par fois les fleurs, femelles au bas du chaton,

Digitized by Google

deviennent plus ou moins mâles dans le haut du même chaton en passant par des transitions insensibles.

SALIX Capræa L. Mars-avril.
Bois, R.R.
C^ne de Veilleins : Bois de Lavau bordant à l'Ouest la route de Romorantin à Vernou. — bords de l'allée de Veilleins au château de Mongiron, R.R.

═══ **aurita** L. Mars-avril.
Lieux marécageux, R.
C^ne de Marcilly-en-Gault : Pacage au bas de la chaussée de l'étang de Madeleine, — pacage à la queue de l'étang de Launay, — bords de la route de Marcilly à Neung tout près du chemin allant à Boisquillon.
C^ne de St-Viâtre : Marais à la queue de l'étang de Favelle.

═══ **repens** L. Avril-mai.
Bruyères humides, C.
C^ne de Romorantin : *Angle Sud-Ouest des bruyères des Monteaux.*
C^ne de Lanthenay : *Bruyères des deux rives du Rantin au-dessous de Queue-de-Loup.*
C^ne de Pruniers : *Bruyères de la Robinière,* — bruyères de Longueville, etc.
C^ne de Villeherviers : *Bruyères de la rive gauche du Rantin en amont de Queue-de-Loup, — bruyères bordant la route de Romorantin à Loreux.*

Digitized by Google

C^ne de Langon : Autour d'anciennes marnières du Liot.

C^ne de Gièvres : Pâtureau de la Grange de Rère.

C^ne de Gy : Bruyères de Chênemoireau, de Boureau, etc.

C^ne de Lassay : Bruyères bordant la route de Romorantin à Gy.

Se trouve surtout C^nes de Salbris, Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, Selles-Saint-Denis, Souesmes.

POPULUS tremula L. Mars-avril.

Bois et pâtureaux humides, C.

On cultive aux bords des routes ou des eaux *Populus alba* L. — *P. Virginiana* Desf. — *P. nigra* L. — *P. pyramidalis* Ros.

BETULACEÆ Endl.

BETULA alba L. Avril-juin.

Terrains frais et sablonneux, C.

ALNUS glutinosa Gaertn. fl. mars, fr. septemb.

Bords des eaux, terrains marécageux, C.C.

MYRICEÆ A. Rich.

MYRICA gale L. fl. avril, fr. Juillet.

Terrains spongieux, A.C. mais seulement dans les vallées des deux Sauldres et de la Rère.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : *Bord méridional de la route de Romorantin à Selles, entre Beauvais et les Quatre-Roues.*

Cne de Villeherviers : Rive gauche de la Sauldre entre le Tourneux et le parc du Portail, C.C. en se rapprochant de ce parc. — Bords de la Rère et du Grand-Fossé, çà et là.

Cne de La Ferté-Imbault : Bords de la route de Romorantin à Theillay près la Combrie.

Cne de Souesmes : Bords de la petite Sauldre çà et là en amont de Souesmes jusque vers les limites du département.

Cne de Gièvres : Dépendances de la Berrerie bordant le pré du Chêne-Rabâteux entre le pont de Pruniers et la route de Romorantin à Selles-sur-Cher.

ABIETINEÆ L.C. Rich.

PINUS pinaster Soland. *(Pinus maritima Lam.)* occupe à l'état de bois de très-grandes surfaces dans l'arrondissement de Romorantin, fl. mai.

Le *Pinus sylvestris* L. y est beaucoup moins répandu.

CUPRESSINEÆ L.C. Rich.

JUNIPERUS communis L. Mai.

Bruyères, clairières des bois, C.

Digitized by Google

ALISMACEÆ R. Br.

ALISMA parnassifolium L. Août-septembre.
Étangs vaseux.

C^ne de Villeherviers : *Étang des Gasts*, — étang Preneau, C.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Étang de Courcelles au bas de la chaussée, — étang de la Gravelle dans la partie la plus rapprochée de la chaussée, — étang de Bièvre dans les parties voisines de l'étang de la Gravelle.

NOTA. — Il doit se trouver également dans les nombreux étangs de la commune de Saint-Viâtre que je n'ai pas encore visités.

ALISMA plantago L. Juin-septembre.
Étangs, fossés, lieux inondés, C.C.
Varie à feuilles lanceolées *(A. lanceolatum Rchb.)* et à feuilles légèrement cordiformes.

═══ **ranunculoides** L. Juin-septembre.
Bords des étangs, fossés, lieux inondés, C.
Varie à tiges simples dressées et à tiges les unes dressées les autres radicantes stolonifères *(A. repens Cav.)*.

═══ **natans** L. Mai-septembre.
Étangs, fossés, ruisseaux, C.
C^ne de Lanthenay : Le Rantin à Queue-de-Loup.
C^ne de Pruniers : Étang de la Pommerie, etc.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Le Rantin au-dessus de Queue-de-Loup, — fosses entre la Rère, la route de Romorantin à Theillay et le chemin qui de cette route conduit au moulin des Tourneux, — fosse près le chemin de la Fringale et le Riau-Mabon.

Cne de Marcilly-en-Gault : Étangs de la Madeleine, de l'Aunay, de Courcelles, de Pontillou, etc. C.C.

Cne de Pierrefitte : Fosse bordant la route de Salbris à Pierrefitte près Pierrefitte.

Cne de St-Viâtre : Petit cours d'eau entre Nouan et Saint-Viâtre.

Cne de Mur : Étangs près le bourg, — fossé de la route de Romorantin à Blois un peu avant l'arche des Rois, — fosse bordant au Sud la route de Mur à Soings.

Et encore Cnes de Loreux, Millançay, — Salbris, Selles-St-Denis, etc.

DAMASONIUM stellatum Pers. Juin-septemb. Mares, étangs, C.

Cne de Lanthenay : Étang de Nobière, — fossé du chemin près la Malicorne.

Cne de Pruniers : Étangs de la Pommerie, — de la Cornuère, etc.

Cne de Veilleins : Étang Fleuri, — mare aux Levées, etc.

Cne de Villeherviers : Mare à Queue-de-Loup.

Cne de Mennetou : Étang de Veillère.

Cne de Langon : Mare entre la Fleurière et Bois-au-Frère.

Digitized by Google

C^ne de Villefranche : Mares dans le val du Cher, — fosse à l'Épinière, etc.

C^ne de Gièvres : Petit étang au Vivier.

C^ne de Mur : Étangs près le bourg, — fosse bordant la route de Mur à Soings.

Et encore : C^nes de Loreux, — Neung-sur-Beuvron, — Marcilly-en-Gault, — Gy, etc.

SAGITTARIA sagittæfolia L. Juillet-août.
Étangs, ruisseaux, rivières, fosses, C.

Var. **valisneriifolia** Coss. et G.

C^ne de Villefranche : Canal du Berry entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux.

BUTOMEÆ Rich.

BUTOMUS umbellatus L. Juillet-août.
Bords du canal du Berry, de la Sauldre, de la Rère, A.C. Çà et là : Fosses, étangs, eaux tranquilles.

C^ne de Gy : La Croisne près le pont de Piedsauvron.

COLCHICACEÆ D.C.

COLCHICUM autumnale L. fl. août-octobre, fr. juin.
Prés, C. dans les prairies du val du Cher, çà et là ailleurs.

C^ne de Romorantin : Prés de la Nasse dans le bas du faubourg d'Orléans.

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Prés de la Dabinerie, — des Verdons.

Cne de Theillay : Prairie du ruisseau qui coule entre le bourg et le chemin de fer.

LILIACEÆ D.C.

SCILLA autumnalis L. Août.

Pelouses arides.

Cne de Pruniers : Rive gauche de la Sauldre en aval des Quatre-Roues, R.

Pelouses et pacages des bords du Cher, C.

ORNITHOGALUM pyrenaïcum L. Mai-juin.

Haies, buissons, lieux couverts, A.C. mais seulement dans les terrains calcaires.

Cne de Romorantin : Ile des Poulies.

Cne de Lanthenay : Terres calcaires des Étrangle-Chiens.

Cne de Pruniers : Ancien pâtureau de la Cornuère, — terres calcaires de la Besaudière, — bords du bois de la Gascetière.

Cne de St-Loup : Bords du Roulier au bas de la ferme de ce nom.

Cne de Villefranche : Pâtureaux du val du Cher dépendant de la Lavanderie et de la Parconière.

Cne de Gièvres : Bois du Poulinat.

═══ **umbellatum** L. Avril-mai.

Vignes, P.C.

Digitized by Google

Cne de Romorantin : Vignes bordant le chemin de Romorantin au Liot.

Cne de Lanthenay : Vignes aux Grands-Guideaux, — aux Perreux, — derrière Bellevue.

GAGEA arvensis Schultz. Mars-avril.
Champs argileux ou calcaires.

Cne de Lanthenay : Terres entre la Dabinerie et Mousseaux, R.R.

Cne de Pruniers : Champ au Nord et près du bourg, R.R.

ALLIUM vineale L. Juillet.
Vignes, champs, chaussées, C.C.

═══ **sphærocephalon** L. Juillet.
Lieux secs et pierreux, R.R.

Cne de Billy : Carrières entre la route de Billy, celle de Blois et la Sauldre.

Cne de Gièvres : Pentes dominant au Nord le canal du Berry entre le pont de l'Escourioux et Jaugy, — pentes dominant le Cher sur la rive gauche du canal du Berry près l'écluse de Jaugy.

═══ **ursinum** L. Mai
Bois frais, prés couverts, R.R.

Cne de St-Loup : Bords du ruisseau de la Grange en trois endroits et, surtout, parties basses du bois du Fondereau.

═══ **oleraceum** L. Juillet.
Pacages, champs, R.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Pacage de la rive droite de la Sauldre entre le gué des Moulins-Neufs et le bourg.

C^ne de Langon : Champ du val du Cher près le Port-Martin.

C^ne de Selles-sur-Cher : Val du Cher entre la Thizardière et le pont canal.

C^ne de Gièvres : Bords du Cher entre l'Escourioux et Jaugy.

MUSCARI racemosum D.C. Avril.

Champs incultes; P.C.

C^ne de Romorantin : Environs de la Richaudière du côté des Arrogantes.

C^ne de Pruniers : Environs de la Maison-Blanche.

C^ne de Villeherviers : Terres bordant le chemin de la Fringale jusqu'au Riau-Mabon, — terres bordant le chemin entre le taillis du Marais-Thion et le chemin de la Fringale.

C^ne de Villefranche : Terres des Marnes, — environs de la Gaudinière, — environs de la Richaudière.

C^ne de Billy : Environs du Tertre-Blanc, A.C.

C^ne de Gièvres : Près la Colinière terres bordant la route de Romorantin à Selles.

═══ **neglectum** Guss. Avril.

C^ne de Romorantin : Derrière le n° 62 bis de la rue de Loreux, C.C. sur un terrain très restreint.

Digitized by Google

LILIACEÆ

MUSCARI comosum Mill. Mai.

Moissons et champs, C.

PHALANGIUM ramosum Lam. fl. Juillet, fr. août.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

SIMETHIS planifolia G.G. Mai-juin.

Bois, bruyères, C. notamment :

Cne de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

Cne de Pruniers : Bruyères bordant le chemin de Longueville à la Cornuère, — bruyères des Landes, — *pâtureau des Granges*, — pâtureau de la Petite-Robinière.

Cne de Villeherviers : Bruyères de la rive gauche de la Sauldre en amont du Portail, — bruyères à Béjarie, — bruyères à Bruleteau, — taille du Marais-Thion, — pâtureau du Clos-Thion, — pâtureau de Chenon, — bois taillis des Gasts.

Cne de Langon : *Landes de Bois-au-Frère.*

Cne de Villefranche : Bois de la Gaudinière.

Cne de Gy : Bruyères de Chênemoireau, — de Boureau.

Cne de Lassay : Bruyères bordant la route de Romorantin à Gy, — *bruyères de la rive gauche de l'étang du Rotay.*

Cne de Noyers : Forêt de Grosbois au Nord et sur la limite même des carrières de Belleroche, C.C.

Digitized by Google

Se trouve encore : Cnes de Salbris, Pierrefitte, Souesmes, etc., etc.

ASPHODELUS sphærocarpus G.G. Mai-juin. Bruyères, pâtureaux, C.

Cne de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

Cne de Villeherviers : Rive gauche des prés du Grand-Fossé en aval du pont de Juillet, — abords de Béjarie, — bruyères et abords de Bruleteau, — taille et pré à la Gaillardière, — pâtureau de Chenon.

Cne de La Chapelle-Montmartin : Les Souches.

Cne de Langon : *Pâtureau de Bois-au-Frère.*

Cne de St-Julien : Tailles des Terres-Rouges.

Cne de St-Loup : Bois futaie entre les Goujons et Beauvais.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Bois de La Ferté, C.C.

Cne de Thoury : Bruyères bordant la forêt de Boulogne et forêt de Boulogne.

Cne de Theillay : Rive droite de la Rère près et en amont du pont de la Loge.

Cne de Noyers : Forêt de Grosbois au Nord et sur les limites des carrières de Belleroche.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

TULIPA *sylvestris* L. Environs de Blois, A.B. (M. Mathonnet).

FRITILLARIA *Meleagris* L. environs de Blois, A.B. (M. Mathonnet).

SCILLA *bifolia* L. Forêt de Russy, A.B. (M. Mathonnet).

ALLIUM *Descglisei* Bor Les Roches, A.V. (M. Franchet).

Digitized by Google

SMILACEÆ

ALLIUM *paniculatum* L. Les Grouets près Blois, A.B. (M. Moreau).

ENDYMION *nutans* Dumort. Cne de Fontaines-en-Sologne, A.B. (Moi-même).

SMILACEÆ R. Br.

POLYGONATUM vulgare Desf. Mai.
Bois pierreux des terrains calcaires.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

═══ **multiflorum** All. fl. mai, fr. septembre.
Bois, pâtureaux, haies des lieux frais, C.

CONVALLARIA majalis L. Mai-juin.
Bois.
Cne de Villeherviers : Futaie sur la rive droite du Grand-Fossé en regard du parc des Roches.
Cne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines sur les limites du département de l'Indre.
Cne de Maray : Bois contigu au jardin potager de la Pelaudière.
Cne de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche.

ASPARAGUS officinalis L. Juin.
Prés humides. Sans stations fixes.
Spontanéité douteuse.

RUSCUS aculeatus L. Mars-mai.
Haies, bois, buissons, C.

Digitized by Google

Autre espèce de Loir-et-Cher.

PARIS *quadrifolia* L. Cnes de Cellettes et de Souday, A.B.V. (MM. Franchet, Nouel et Legué).

DIOSCOREÆ R. Br.

TAMUS communis L. Juin-juillet.
Haies, buissons des lieux couverts, C.

IRIDEÆ Juss.

IRIS pumila Jacq.
Cne de Romorantin : *Couronnement du mur de ville près la porte d'Orléans.*

Germanica L.
Cne de Romorantin : *Vieux mur de ville longeant le bas mail.*
Cne de Noyers : Le dessus d'un grand nombre de fours.
Ces deux dernières espèces ne me paraissent pas spontanées.

pseudacorus L. Mai-juin.
Fosses, étangs, marécages, C.C.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

IRIS *fœtidissima* L. Cnes de Chailles, Cheverny, A.B. (Moi-même).

Digitized by Google

GLADIOLUS *Illyricus* Koch. Parc de Chambord, A.B. (Dr Monin).

AMARYLLIDEÆ R. Br.

NARCISSUS pseudonarcissus L. Mars-avril. Bois, prés.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Bois des Gués ou Gué des Bois.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

GALANTHUS *nivalis* L. Cnes de Candé et Baillou, A.B.V. (Moi-même et M. Em. Desvaux).

LEUCOIUM *æstivum* L. Cne de Fontaines-en-Sologne, A.B. (Moi-même). Spontanéité douteuse.

ORCHIDEÆ Juss.

SPIRANTHES œstivalis Rich. Juillet-août.

Bruyères humides, prés marécageux, A.C.

Cne de Lanthenay : Bruyères bordant l'étang Lanoue.

Cne de Pruniers : Pré des Vérières, — bruyères bordant l'étang de Bâtarde, — bruyères bordant l'étang des Landes.

Cne de Veilleins : Bruyères humides bordant à l'Ouest l'allée de Tréfontaine aux Levées.

Cne de Villeherviers : Prés de la rive gauche de la Sauldre.

Digitized by Google

C^ne de Langon : Autour des gardoirs de Bois-au-Frère.

C^ne de Salbris : Bruyères entre le Thou et l'Ecluse.

C^ne de Soings : Autour du lac.

Et encore : C^nes de Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, — Gy.

SPIRANTHES autumnalis Rich. Septembre-octobre.

Pacages et bruyères, R.

C^ne de Lanthenay : Marnières de Grangeneuve, — pacage à la Dabinerie.

C^ne de Pruniers : Pacage au Nord de la Chapelle et à l'Est du petit étang de Longueville, — bruyères au Nord de l'étang de la Cornuère, — *lisière d'un bois de pins sis au Sud du pré des Vérières.*

C^ne de Villeherviers : Gardoir de la Chansonnerie, — les grandes marnières des Roches.

CEPHALANTHERA ensifolia Rich. Mai-juin.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

═══ **grandiflora** Bab. Mai-juin.

C^ne de St-Aignan : Bas du parc du château.

EPIPACTIS latifolia All. Fin Juin-août.

Bois, A.R.

C^ne de Pruniers : Bois de l'Abbaye, R.R.

C^ne de Veilleins : Bois faisant face au jardin potager de Montgiron, R.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : Bois de la Chansonnerie bordant la route départementale n° 11, vers son extrémité orientale.

C^ne de S^t-Loup : Ravin dans les bois de la côte du Cher entre Sauveterre et S^t-Loup, R.

NOTA. — Dans cette localité il constitue l'*E. viridiflora* Bor.

C^ne de Gièvres : Bois du Poulinat.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

EPIPACTIS microphylla Swartz. Juin-juillet.

C^ne de Gièvres : Bois du Poulinat, R.R.

= **palustris** Crantz. Juin-juillet.

Prés marécageux, A.C., notamment :

C^ne de Pruniers : Prés du ruisseau de Bâtarde au bas de la Besaudière et de la Cornuère.

C^ne de Villeherviers : Prés tourbeux de la Sauldre plus spécialement entre le pont de Villeherviers et le parc du Portail.

C^ne de Lassay : Prés du château du Moulin.

LISTERA ovata R.Br. Mai-juin.

Bruyères et bois des terrains calcaires, A.C.. Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

C^ne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche, — bois de l'Abbaye, — petit pâtureau de la Cornuère.

C^ne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines du côté de S^te-Catherine.

C^ne de S^t-Julien : Garenne de Valette.

C^ne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*

Digitized by Google

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

NEOTTIA nidus-avis Rich. Mai-juin.
Bois, R.R.
Cne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche.
Cne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines près d'excavations bordant le chemin de Ste-Catherine.
Cne de Noyers : Forêt de Grosbois près et à l'Est des carrières de Belleroche.

LIMODORUM abortivum Sw. Mai-juillet.
Bois.
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche et partie orientale de la forêt de Grosbois y attenant, R.R. et sans place fixe.

ACERAS hircina Lindl. Juin.
Pelouses et bois des terrains calcaires.
Cne de Villeherviers : Pré haut de la Chansonnerie contigu à des carrières; un seul pied.
Cne de Villefranche : *Levée du canal du Berry vis-à-vis l'Escourioux, un seul pied.*
Cne de Selles-sur-Cher : *Bords de la route nationale de Selles à Blois, un seul pied,* — rive droite du canal du Berry entre le pont de la Thizardière et le pont canal, çà et là.
Cne de St-Aignan : Parc du château.
Cne de Châteauvieux : Parc du château de Châteauvieux, — bois de Péquignon, C.

Digitized by Google

ORCHIS Morio L. Avril-mai.
Prés, pelouses, pâtureaux, C.
C^ne de Lanthenay : Prés de Rioubert, C.C.

ustulata L. Mai.
Prés, pacages, A.C., notamment :
C^ne de Romorantin : Prés hauts des Crottés.
C^ne de Lanthenay : Prés de la rive droite de la Sauldre en amont de Longuevalle, — prés aux Étangs.
C^ne de Pruniers : Pré de Longueville bordant l'allée de Longueville à la Cornuère, — prairie du ruisseau de Bâtarde près la Cornuère, — prés de la cure de Pruniers.
C^ne de Villeherviers : Prés à la Gaillardière.
C^ne de Langon : Bords du bois faisant face aux carrières des Tréchis.
C^ne de St-Julien : Prés du Cher à Olivet, — pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.
C^ne de Selles-St-Denis : Parc de Bois-Méau.
C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche, C.
Et encore : C^nes de St-Loup, — Gièvres, — Châteauvieux, etc.

coriophora L. Mai-juin.
Prés humides, A.C. surtout dans les printemps humides. Je l'ai trouvé notamment :
C^ne de Romorantin : Prés bas des Crottés.
C^ne de Lanthenay : Prés aux Étangs, — prés à Rioubert.
C^ne de Pruniers : Prés du ruisseau de Bâtarde au bas de la Cornuère.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Pré aux Fontenils, — pré à Queue-de-Loup.

Cne de Villefranche : Prés de la Lavanderie bordant la route nationale no 76.

Cne de Gièvres : Prés bordant la route de Romorantin à Selles.

Je l'ai trouvé encore : Cne de Noyers, etc.

ORCHIS Simia Lam. Mai.

Bois et pâtureaux des terrains calcaires, A.C., notamment :

Cne de Pruniers : Bois de la Gascetière, — bois de l'Abbaye, — parc de la Maison-Blanche, — petit pâtureau de la Cornuère.

Cne de Langon : Les Tréchis à mi-côte en descendant du village à la route nationale no 76.

Cne de St-Julien : Pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.

Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*

Cne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère,* — bois du Poulinat, C.

Cne de Châteauvieux : Parc du château, — bois à Péquignon.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche, C.

purpurea Huds. Mai.

Bois et pâtureaux des terrains calcaires, A.R.

Cne de Pruniers : Bois de l'Abbaye, R., — bois de la Gascetière, R.R.

Digitized by Google

C^ne de S^t-Julien : Garenne de Valette, — pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.

C^ne de S^t-Loup : A mi-côte entre S^t-Loup et Maray.

C^ne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère*, — bois du Poulinat, C.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

ORCHIS hybrida Bonngh. *(Simia+Purpurea)*. Mai. Bois.

C^ne de Pruniers : Bois de l'Abbaye.

C^ne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère*, — Bois du Poulinat.

C^ne de Noyers : Carrières de Belleroche.

Ne se trouve qu'accidentellement.

═══ **mascula** L. Avril-mai.

Pacages, prés, bois, A.C., notamment :

C^ne de Lanthenay : Pré bordant la route départementale n° 1 à la 3^e arche.

C^ne de Villeherviers : Parc des Roches, — prairie du Riau-Mabon près la Gouabinière.

C^ne de S^t-Julien : Bois à l'Est d'Olivet.

C^ne de S^t-Loup : Clairières des bois sur les deux rives du Roulier.

C^ne de Villefranche : *Pré de la Bézardière bordant la route départementale n° 7.*

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Pentes arides et gazonnées à la Cave (fl. blanches).

═══ **laxiflora** Lam. Mai-juin.

Prés humides, C.C.

Digitized by Google

ORCHIDEÆ

ORCHIS palustris Jacq. Juin.
Prés humides et calcaires.
Cne de Gièvres : Prés humides et calcaires sis entre la Grange de Rère et la route départementale no 1. (Je ne l'avais pas observé avant 1863, je ne l'ai pas observé depuis.)

═══ **latifolia** L. Mai-juin.
Bois et prés humides, C.

═══ **incarnata** L. fl. juin, fr. août.
Prés humides.
Cne de Lanthenay : Pré de la rive droite du Rantin à Courmin.
Cne de Villeherviers : Prés tourbeux de la Sauldre.
Cne de Langon : Prairies de la Petite-Rère bordant la route de Selles-St-Denis à Mennetou.
Est-il suffisamment distinct de l'*O. incarnata?*

═══ **maculata** L. Juin.
Prés et surtout bruyères, C.

═══ **bifolia** L. Juin.
Bruyères et clairières des bois, C.

═══ **montana** Schimdt. Mai-juin.
Pacages et clairières des bois, A.C. mais surtout dans les terrains calcaires.
Cne de Pruniers : Bois de l'Abbaye.

═══ **conopsea** L. Juin.
Prés humides, C.

═══ **odoratissima** L. Juin.
Prés humides.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Prés tourbeux du Riau-Mabon contigus au parc du Portail.

ORCHIS viridis Crantz. Mai-juin.
Pelouses, prés humides, A.R.
Cne de Romorantin : *Pré aux Crottés.*
Cne de Lanthenay : Prés aux Étangs.
Cne de Pruniers : Petit pâtureau de la Cornuère et prés contigus du ruisseau de Bâtarde, — *pelouses bordant les anciennes marnières de la Besaudière,* — bois de l'Abbaye.
Cne de Villeherviers : Pré à Queue-de-Loup.
Cne de St-Julien : Pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent.
Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*
Cne de Gièvres : Prés à l'Ouest du bois du Poulinat.

OPHRYS aranifera Huds. Fin avril-mai.
Pelouses sèches, clairières des bois dans les terrains calcaires, R.
Cne de Pruniers : *Lisière Sud-Ouest du bois de la Gascetière,* — terrains excavés au Nord du parc de la Maison-Blanche, — parc de la Maison-Blanche, — *extrémité Nord-Ouest du bois de l'Abbaye autour d'une mare,* R.R. dans toutes ces localités.
Cne de St-Julien : Pâtureau d'Olivet dit le Jardin du Couvent, R.R.
Cne de Châtillon-s-Cher : Pentes arides et gazonnées à la Cave, C.

Digitized by Google

Cne de Noyers : Carrière de Belleroche, R.R.

OPHRYS apifera Sm. Juin.

Pacages et prés secs et calcaires.

Cne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche, R.R., — prairie au bas du petit pâtureau de la Cornuère, R.

Cne de Villeherviers : *Lisière d'un bois de pins bordant le chemin de Forez à Colombier*, C. mais vraisemblablement accidentel, — petit pré haut de la Chansonnerie contigu à des carrières, A.C.

Cne de Selles-sur-Cher : Clairières du bois traversé par la route nationale 156, — levée du canal du Berry entre le pont de la Thizardière et le pont canal.

Cne de Gièvres : Bois du Poulinat, — pré du Chêne-Rabâteux à la Berrerie.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche, C.

Cne de Châtillon-sur-Cher : Pelouses arides à la Cave, R.

═══ **muscifera** Huds. Mai.

Pacages secs et clairières des bois dans les terrains calcaires.

Cne de Romorantin : *Clairières humides dans les bruyères des Monteaux*, R.R.

Cne de Pruniers : Parc de la Maison-Blanche, — bois de l'Abbaye, — bois de la Gascetière contigu au parc de la Maison-Blanche, R.R. et presque accidentel dans toutes ces localités.

Digitized by Google

Cne de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*
Cne de Noyers : Carrières de Belleroche, C.C.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

Epipactis *airorubens* Rchb. Cne d'Avaray, A.V. (M. E. Roger)., Cne de Marcilly, A.V. (M. Nouel).
Liparis *Lœselii* Rich. Cne d'Averdon, A.B. (M. Franchet).
Orchis *militaris* L. Cne de Marcilly, A.V. (MM. E. Nouel et Franchet).
Orchis *alata* Fleury *(morio + laxiflora)* Cne de Celettes, A.B. (M. Franchet).
Ophrys *arachnites* Rchb. Cne de Thoré, A.V. (M. Franchet).

HYDROCHARIDEÆ L.C. Rich.

HYDROCHARIS morsus-ranæ L. fl. Juin-août, fr. octobre.
Mares, étangs, fosses, A.C. notamment :
Cne de Pruniers : Étang de Bâtarde au bas de la chaussée.
Cne de Vernou : Fosse dans le jardin potager des Augères.
Cne de Langon : La vieille rivière, C.
Cne de Villefranche : Contrefossés du canal du Berry près Villebrette, C. — mare dans le val du Cher au même lieu, — ruisseau à l'Escourioux.

Digitized by Google

Cne de Marcilly-en-Gault : Étang de la Gravelle, — fossé au bas de Boisquillon contigu à des marécages de la queue de l'étang de Bièvre.

Cne de St-Viâtre : Queue de l'étang de Favelle, — fossé et marais sis à la queue de cet étang.

Cne de Lassay : Petit étang à la droite de la route de Romorantin à Lassay en arrivant au bourg.

Se trouve encore : Cnes de Gièvres, Gy, etc.

JUNCAGINEÆ Rich.

TRIGLOCHIN palustre L. fl. juillet-août, fr. octobre.

Cne de Pruniers : *Bords d'un ruisseau fangeux dans le pré des Vérières.*

POTAMEÆ Juss.

POTAMOGETON natans L. Juin-août.

Étangs, eaux stagnantes, C.

fluitans Roth. Juillet-août.

Eaux paisibles ou courantes.

Cne de Pruniers : Fontaine dans un pré spongieux près et à l'Est de Bâtarde.

Cne de Pierrefitte : La Boute-Vive entre Cerbois et le moulin Sarrazin où toutes les feuilles sont pellucides et les fleurs manquent.

Digitized by Google

Cne de Soings : Lac de Soings.

POTAMOGETON polygonifolius Pourr. Juin-août.

Sources et ruisseaux dans les terres de bruyères.

Cne de Veilleins : Fontaine dans une bruyère formant l'angle de la route départementale no 13 et du chemin de Veilleins à Mur.

Cne de Lanthenay : Fossé du chemin allant du Petit-Queue-de-Loup au Grand-Vauvert, là où il est en communication avec le Rantin.

Cne de St-Viâtre : Fossé situé à peu de distance et à droite de la route de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne près le pont du Châlet.

═══ **gramineus** L. Juillet-août.

Étangs, marnières, eaux stagnantes, C.

Cne de Romorantin : Marnière aux Arrogantes.

Cne de Lanthenay : Étang de Nobière, etc.

Cne de Millançay : Étangs de Malzoné, — de la Meunerie, etc.

Cne de Pruniers : Étangs des Landes, — de Bâtarde, etc.

Cne de Veilleins : Étang Fleuri.

Cne de Villeherviers : Les grandes marnières des Roches.

Cne de Châtres : Fosses dans la petite Rère près Douy.

Digitized by Google

C^ne de Soings : Fosse à l'Ouest du lac vers son extrémité septentrionale.

Et encore : C^nes de Marcilly-en-Gault, — Lassay, Soings, etc.

Var. **Zizii.**

C^ne de Romorantin : Marnière aux Arrogantes.

C^ne de Pruniers : Étang de Bâtarde.

POTAMOGETON lucens L. Mai-juillet.

Eaux paisibles.

C^ne de Romorantin : Mare à la Tricanderie.

C^ne de Villeherviers : Marnières entre Chenon et la Gouabinière.

C^nes de Villefranche, Selles-sur-Cher et Gièvres : Canal du Berry, C.

═══ **perfoliatus** L. Août-septembre.

Rivières, étangs, canal du Berry, C.

═══ **crispus** L. Juin-juillet.

Étangs, rivières, canal du Berry, C.

═══ **acutifolius** Link. Juillet-août.

Eaux stagnantes, A.R.

C^ne de Lanthenay : Fosses formant la presqu'île de Longuevalle, — étang au bas de Rangereux près l'étang de la Flandrinière, C.

C^ne de Villeherviers : Fossés du château de Trécy.

C^ne de Langon : Val du Cher dans la fosse à Renault, R.

C^ne de Lassay : Fossé à la queue de l'étang Neuf au bas de l'étang Paris.

Digitized by Google

POTAMEÆ

POTAMOGETON obtusifolius M.K. Juillet-août.

Étangs, fosses, ruisseaux et rivières à faible courant, A.R.

Cne de Villeherviers : Le Grand-Fossé près la Doubletière, — la Beauce au-dessus et au-dessous de Trécy, — fossés du château de Trécy, — la Sauldre entre le confluent de la Beauce et le pont de Villeherviers, — fosse dans les prés de Trécy, — fossés dans les prés de la Chansonnerie communiquant avec la Sauldre.

Cne de Marcilly-en-Gault : Étang de Vérière.

= **pusillus** L. Juillet-août.

Ruisseaux, fosses.

Cne de Villeherviers : *Fossé communiquant avec la Sauldre au pont de Villeherviers,* R.

Cne de Gy : Fosse du val de la Croisne près le pont de Gy, R. — La Croisne entre le moulin de Lardilleux et celui de la Strèze, C.C.

= **trichoides** Cham. et Sch. Juillet-août.

Mares, étangs.

Cne de Lanthenay : Étang de la Pesnière, C. — Marnières de Grangeneuve.

Cne de Villeherviers : Mare à Queue-de-Loup.

Cne de Gièvres : Mare à la Berrerie.

= **pectinatus** L. Juillet-août.

Rivières.

Digitized by Google

C^ne de Villeherviers : La Sauldre au confluent de la Beauce, R.R.

C^ne de Villefranche : Le canal du Berry à l'Escourioux, R.R.

C^ne de Selles-sur-Cher : Le Cher au bas du quai Soubeyran et au-dessous de la ville jusqu'au confluent de la Sauldre.

C^ne de Gièvres : Le Cher à Jaugy.

POTAMOGETON densus L. Juin-juillet.
Fosses, ruisseaux.

C^ne de Romorantin : Marnière contiguë aux prés des Arrogantes.

C^ne de Pruniers : Fossé à l'Ouest de l'allée de Champleroy près et au Sud du chemin de Romorantin à Pruniers.

C^ne de S^t-Loup : Ruisseau du Roulier.

C^ne de Gièvres : Lavoir à Jaugy, — fossé traversant la route de Gièvres à Chabris dans le val du Cher.

C^ne de Gy : Marécages contigus au bief du moulin de Lardilleux.

ZANICHELLIA dentata Willd. Mai-juillet.
Eaux stagnantes, ruisseaux à faible courant.

C^ne de Romorantin : Fosse à la Guillotière.

C^ne de Pruniers : Fosse près les communs des Vérières, — mare au gué des Moulins-Neufs contiguë à la Sauldre.

C^ne de Langon : Fosse au Port-Martin dans un bras desséché du Cher.

C^ne de S^t-Loup : Le Roulier au bas de S^t-Loup.

Digitized by Google

C^ne de Villefranche : Mare entre la Bézardière et la route de Romorantin à Villefranche.
C^ne de Gièvres : Fontaine de l'Erabe bordant la route de Gièvres à Selles-sur-Cher.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

POTAMOGETON *rufescens* Schrad. C^ne de Celettes, A.B. (M. Franchet.)

NAJADEÆ Link.

CAULINIA fragilis Willd. Août-septembre.
Étangs, mares, canal du Berry.
C^ne de Lanthenay : Étang de la Flandrinière.
C^ne de Loreux : Étang Dernier.
C^ne de Millançay : Étang de la Meunerie.
C^ne de Pruniers : Mare au gué des Moulins-Neufs contiguë à la Sauldre.
C^ne de Veilleins : Étang de la Meunerie.
C^nes de Langon, Villefranche et Gièvres : Canal du Berry, C.
C^ne de Lassay : Étang Bezard.

NAJAS major Roth. Juillet-août.
Fosses, canal du Berry.
C^nes de Langon, Villefranche et Gièvres : Canal du Berry, C.
C^ne de Langon : La vieille rivière, C.C.
C^ne de Selles-sur-Cher : Fosse dans le lit desséché du Cher entre la Thizardière et le confluent de la Sauldre.

Digitized by Google

LEMNACEÆ Dub.

LEMNA trisulca L. fl. mai.

Eaux stagnantes, A.C., notamment :

C^ne de Lanthenay : Fosse à la Lambinière.

C^ne de Loreux : Fosse à Migereau, R.

C^ne de Villeherviers : Fossé dans les prés de la Chansonnerie, — fossé traversant le chemin entre le bourg et la Sauldre.

C^ne de Selles-sur-Cher : Fossé au bas du coteau des Avray.

C^ne de Gièvres : *Mare à la Berrerie,* — fossé bordant la route de Chabris dans le val du Cher.

C^ne de Soings : Le lac et petite fosse au Nord-Ouest du lac.

Et encore : C^nes de Villefranche, — Gy, etc.

═══ **minor** L. fl. mai.

Eaux stagnantes, C.

═══ **gibba** L. Mai-juin.

Eaux stagnantes, A.C., notamment :

C^ne de Lanthenay : Fosse à la Malicorne aux bords du chemin, — mare dans un terrain excavé bordant le chemin de Loreux près la Jalousie, — fosse à Courmin, — fosse dans les prés de la Sauldre à l'Est de Longuevalle.

Et encore : C^ne de Gy.

═══ **polyrhiza** L. Mai-juillet.

Eaux stagnantes, C.

Digitized by Google

LEMNA arhiza L. de mai à décembre.
Eaux stagnantes.
C^ne de Lanthenay : Mare à la Genetière, C.C.
C^ne de Villeherviers : Mares à l'Est de Champvioux, R. — Mare à la Grande-Bioule, R.
C^ne de Villefranche : Mare de S^te-Marthe et fossé contigu, C., — contre-fossés du canal du Berry (rive droite) près Villebrette, A.C. — Idem au bas du pont de Villefranche, C.
C^ne de Gy : *Fosse bordant la route de Romorantin à Gy vis-à-vis la Ferranderie.*

AROIDEÆ Juss.

ARUM maculatum L. fl. avril-mai, fr. août.
Haies, bois, C.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

ARUM *Italicum* Mill. Env. de Blois, A.B. (M. Moreau).

TYPHÆ Juss.

TYPHA latifolia L. Juillet-août.
Fossés profonds, marnières, étangs, C.

= **angustifolia** L. Juin-septembre.
Fossés profonds, marnières, étangs, C.

SPARGANIUM ramosum Huds. Juin-août.
Fossés, étangs, C.

= **simplex** Huds. Juillet-septembre.
Fossés, étangs, C.

Digitized by Google

Var. **fluitans.**

C^ne^ d'Orçay : Mare à la Brocquerie.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

SPARGANIUM *minimum* Fries. Près Vendôme, A. V. (M. Peltéreau).

JUNCEÆ D.C.

JUNCUS conglomeratus L. Juin-juillet.
Fossés, C.

= **effusus** L. Juin-juillet.
Fossés, C.

= **glaucus** Ehrh. Juillet.
Fossés, C.

= **pygmæus** Thuill. Juin-juillet.
Fossés, bords des étangs, C., notamment :
C^ne^ de Lanthenay : Bords des étangs de la Flandrinière et de Nobière, — ancien étang du Lieu.
C^ne^ de Millançay : Bords de l'étang de la Meunerie, etc.
C^ne^ de Pruniers : Bords d'une fosse dans les bruyères des Landes, etc.
C^ne^ de Veilleins : Bords des étangs de la Meunerie, — Fleuri, etc.
C^ne^ de Villeherviers : Bords des étangs de Cornilly, — Bardin, etc.
C^ne^ de S^t^-Viâtre : Bords de l'étang de Marcilly,
C^ne^ de Soings : Bords du lac.

Digitized by Google

Et encore : Cnes de Romorantin, Loreux, — La Ferté-St-Cyr, — Marcilly-en-Gault, — Lassay, etc.

JUNCUS capitatus Weig. Juin-juillet.
Fossés, terrains sablonneux et humides, C.
Cne de Lanthenay : Fossé près la Pesnière bordant la route départementale no 13, etc.
Cne de Pruniers : Queue de l'ancien étang du Ponceau, etc.
Cne de Veilleins : Bords de l'étang Fleuri, etc.
Cne de Villeherviers : Fossés du chemin de Romorantin à Theillay, etc.
Et encore : Cnes de Vernou, — Langon, Villefranche, — Marcilly-en-Gault, Souesmes, — Gy, Mur, Rougeou, etc.

═══ **supinus** Mœnch. Juin-août.
Lieux marécageux, mares, étangs, C.

═══ **heterophyllus** L. Duf. Juin-septembre.
Fosses, étangs.
Cne de Lanthenay : Fosse entre les tailles du Lieu et la route de la forêt presque vis-à-vis l'allée de la ferme des Bruyères, — fosse bordant à l'Ouest la route de la forêt entre l'allée de la ferme des Bruyères et l'étang des Fourneaux.
Cne de Loreux : Fossé d'une taille vis-à-vis l'étang Dernier.
Cne de Pruniers : Bords de l'ancien étang Facy et fossés voisins, — *fosse dans les bruyères de la Robinière.*

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : *Étang Bardin*, — gardoir de l'étang Neuf.

Cne de Marcilly-en-Gault : Bords de l'étang de Madeleine, — fossé longeant l'étang de l'Aulnay et traversant la route de Marcilly à St-Viâtre.

Cne de St-Viâtre : Étang de Marcilly.

Cne de Gy : Étang au milieu des marais de la rive droite de la Croisne.

Cne de Lassay : Petit étang dans les bruyères voisines du château du Moulin, — étang Neuf.

JUNCUS lamprocarpus Ehrh. Juillet-août.
Bords des eaux.
Vraisemblablement commun, mais je l'ai peu observé.

Cne de Villefranche : Bords du canal du Berry entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux.

═══ **sylvaticus** Reich. Juin-juillet.
Fossés, prés marécageux, C.

═══ **anceps** Lah. Août-septembre.
Fossés, marnières, marais, bords des eaux, A.C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Romorantin : Marnières des Monteaux.

Cne de Villeherviers : Bords de la Rère, au bas du pont de la route de Theillay.

Cne de Langon : Ancien étang du Liot.

Cne de Villefranche : Bords du chemin de la Richaudière à Villefranche, — bords du

Digitized by Google

canal du Berry entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux.

C^ne de Theillay : Marnières du château de Rère.

C^ne de Gièvres : *Marais de Villefondue*, etc.

C^ne de Gy : Val de la Croisne près le bourg, C. — Marais de la rive droite de la Croisne.

Et encore : C^nes de Loreux, Pruniers, — Lassay, Rougeou, — Châtillon-sur-Cher.

JUNCUS obtusiflorus Ehrh. Août-septembre.

Prés et fossés tourbeux.

C^ne de Villeherviers : Prés tourbeux de la Sauldre principalement en amont du parc du Portail.

C^ne de Maray : Prés et ruisseaux tourbeux à Daluet.

squarrosus L. Juin-juillet.

Bruyères humides, C., notamment :

C^ne de Pruniers : *Bruyères de la Robinière.*

C^ne de Veilleins : Pâtureau de la Pineterie.

C^ne de Villeherviers : *Bruyères près le Riau-Mabon bordant le chemin de Romorantin à Theillay.*

C^ne de La Ferté-Imbault : Bruyères des Jumeaux.

C^ne de Gy : Landes de Chènemoireau, — de Boureau, etc.

Et encore : C^nes de Loreux, Millançay, Vernou, — Nouan, — Langon, — Salbris,

Digitized by Google

Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, St-Viâtre, Souesmes, Theillay.

JUNCUS compressus Jacq. Juillet-septembre.
Pâturages humides, surtout dans les vallées du Cher et de la Sauldre, A.R.
Cne de Romorantin : Ile de Mousseaux, — fossé dans les Quintaines près la Sauldre.
Cne de Villeherviers : Bords du chemin de Theillay près le pont sur la Rère.
Cne de St-Julien : Bords du ruisseau descendant à Olivet.
Cne de Villefranche : Bords du Cher à l'Escourioux.
Cne de Gièvres : Bords du chemin entre la Berrerie et la route départementale no 1.

tenageia L. Juin-septembre.
Fossés, bords des étangs, C.

Bufonius L. Juin-août.
Lieux humides, C.C.

Var. **fasciculatus.**
Cne de Pruniers : Bords de l'étang de la Châtre.
Cne de Villefranche : Pâtureau de Ste-Marthe.

LUZULA Forsteri D.C. Avril-mai.
Bois et pâtureaux.
Cne de Millançay : Forêt de Bruadan aux environs de Varenne.
Cne de Pruniers : Angle Sud-Ouest du bois de la Gascetière.

Digitized by Google

Cne de St-Julien : Bois au-dessous de Chantemerle, — bois au Sud et bois à l'Est d'Olivet.

Cne de St-Loup : Bois de la côte du Cher, C.C.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Bois de La Ferté, C.

Je l'ai trouvé également dans des bois Cnes de Gièvres, — de Ségy.

LUZULA campestris D.C. Avril-juin.

Pelouses, bruyères, pâtureaux, C.C.

multiflora Lej. Juin-juillet.

Bois taillis, fondrières et bruyères tourbeuses, C., je l'ai récolté notamment :

Cne de Lanthenay : Pacage bordant le Rantin près Queue-de-Loup.

Cne de Pruniers : *Bruyères autour de l'ancien étang Facy,* — bruyères bordant le chemin entre Longueville et la Cornuère.

Cne de Veilleins : Bruyères tourbeuses bordant à l'Ouest l'allée de Tréfontaine aux Levées.

Cne de St-Loup : Bois taillis de la côte du Cher.

Cne de Gy : Partie marécageuse du pâtureau du moulin de Lardilleux.

Et encore : Cnes de Loreux, — Maray, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Pierrefitte, Souesmes, etc.

Var. **congesta.**

Cne de Mur : Fondrières au-dessous de l'étang Maré.

Digitized by Google

Var. **pallescens.**

Cne de Villeherviers : Taillis de la Chansonnerie, R.

Cne de St-Julien : Bois taillis à Olivet, R.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

JUNCUS *Gerardi* Lois. Près Blois, A.B. (Dr Monin).

LUZULA *pilosa* Willd. Cne du Plessis-Dorin, A.V. (M. Léon Legué).

— *sylvatica* Gaud. Cne de Chaumont-sur-Loire, A. B. (M. Franchet).

CYPERACEÆ Juss.

CYPERUS longus L. Août.

Fossés humides, bords des eaux.

Cne de Gièvres : Fossé occidental d'un pré contigu au pont de la route de Gièvres à Chabris sur le canal du Berry.

Cne de Couffy : Ruisseau traversant la route entre Meunes et St-Aignan.

Cne de Thésée : Bords du Cher près le bac.

fuscus L. Août-octobre.

Lieux marécageux, bords des étangs, des rivières, C.

Cne de Lanthenay : Gué du Rantin à Queue-de-Loup.

Cne de Pruniers : Bords de la Sauldre au gué des Moulins-Neufs.

Cnes de St-Julien, Villefranche, Selles-s-Cher : Grèves du Cher, C.C.

Digitized by Google

C^ne de Soings : Bords du lac, C.C.

CYPERUS flavescens L. Août.

Bords des étangs, gazons spongieux, grèves des cours d'eau, C., notamment :

C^ne de Romorantin : *Bords de l'étang des Monteaux.*

C^ne de Pruniers : Bords du ruisseau de Bâtarde au gué de la Cornuère, — fossé Nord de la route de Romorantin à Pruniers près le bourg.

C^ne de Veilleins : Bords de l'étang de Lanoue, — terrains spongieux au bas de la chaussée de l'étang de Bordebure.

C^ne de Villefranche-sur-Cher : Bords du Cher à l'Escourioux.

C^ne de La Ferté-Imbault : Bords de l'étang de Bordebure.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Bords des étangs de la Gravelle et de Bièvre.

C^ne de Theillay : Bords de la Rère, — ruisseau entre le bourg et la station du chemin de fer.

C^ne de Lassay : Pentes de la chaussée de l'étang Paris du côté de l'étang Neuf.

C^ne de Mur : Revers de la chaussée du grand étang de la Chaussée.

Et encore : C^nes de Loreux, Millançay, — Maray, — S^t-Viâtre, — Gièvres.

Digitized by Google

CYPERACEÆ

SCHÆNUS nigricans L. Juin-juillet.

Bruyères et prés humides et tourbeux, C.

Cne de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*

Cne de Pruniers : Pré des Vérières, — prés à l'Est du Grand-Village, — bords de la route départementale n° 1 entre les Quatre-Roues et les Brésolles.

Cne de Villeherviers : Prés spongieux de la Sauldre, — les grandes marnières des Roches, — autour d'anciennes marnières à Forêt, etc., etc.

Cne de Gièvres : Pré du Chêne-Rabâteux, — prés bordant la route de Chabris à Pruniers entre la grange de Rère et la route départementale n° 1.

Cne de Gy : Landes de Chênemoireau et de Boureau.

CLADIUM Mariscus R. Br. Juillet-août.

Bords des eaux.

Cne de Villeherviers : Les grandes marnières des Roches, — bords du Riau-Mabon près et en amont du parc du Portail.

ERIOPHORUM angustifolium Roth. Mai-juin.

Marais et prés tourbeux, A.C.

Cne de Lanthenay : Marais entre les étangs de Courmin et de Nobière.

Cne de Millançay : Des deux côtés de la chaussée de l'étang de Millançay.

Cne de Pruniers : Partie restreinte de l'ancien étang du Ponceau.

Digitized by Google

Cne de Veilleins : Fondrières du Pavillon, C., — marais autour de l'étang de Bordebure.

Cnes de Salbris, Pierrefitte, Souesmes : Abonde dans les marécages et prés humides de ces communes.

Cne de St-Viâtre : Fondrières à droite de la route en allant de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne, lorsqu'on descend dans la vallée du Néant.

Cne de Gy : Plusieurs des nombreux marais de la rive droite de la Croisne.

Cne de Mur : Marécages tourbeux au-dessous de l'étang Maré.

Cne de Châteauvieux : Pré au bas du coteau de Péquignon.

ERIOPHORUM latifolium Hoppe. Mai-juin.
Mares et prés marécageux.

Cne de Villeherviers : Prés de la Sauldre au pont de Villeherviers :

Cnes de Neung et Montrieux : *Marais au bas de l'étang de Beaumont.*

Cne de Châtillon-sur-Cher : Prairies de la Sauldre près la Cave.

SCIRPUS sylvaticus L. Juin-juillet.
Fossés humides, ruisseaux, A.C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Lanthenay : Fossé au Grand-Vauvert.

Cne de Millançay : Fossé longeant la route de Millançay à Vernou.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Ruisseau de Bâtarde, — bords de la route départementale no 1 entre Beauvais et les Quatre-Roues.

Cne de Vernou : Bords de la Bonne-Heure au-dessous des Augères.

Cne de Maray : Ruisseau entre Grammont et Daluet.

Cne de St-Loup : Ruisseau du Roulier.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Ruisseau traversant la route entre Dhuizon et La Ferté-St-Cyr.

Cne de Pierrefitte : Bords de la Sauldre à l'Ardoise.

Cne de Souesmes : Bords de la Sauldre au pont de Pierrefitte, — bords de la petite Sauldre au moulin de la Fosse aux Loups.

Cne de Lassay : Ruisseau s'écoulant de l'étang Bezard.

Cne de Châteauvieux : Bas de la côte de Péquignon.

SCIRPUS Michelianus L. Septembre-octobre. Grèves.

Cne de Pruniers : Petit étang à Longueville lorsqu'il est à sec, C.

Cne de Villefranche : Grèves du Cher à la pointe de l'île de l'Escourioux, R.R.

═══ **maritimus** L. Juin-août.

Étang, bords des eaux, A.C., notamment :

Cne de Pruniers : Étangs desséchés de Bâtarde, — du Ponceau.

Digitized by Google

C^ne de Veilleins : Étangs desséchés du Lièvre, — de la Pingottière.

C^ne de Selles-sur-Cher : Le Cher au bas du quai Soubeyran, etc.

Et encore : C^ne de Gy, etc.

SCIRPUS lacustris L. Juillet-août.

Étangs, marais, C.

Var. **digynus** God. *(Sc. Tabernæmontani Gmel.)*.

C^ne de Maray : Fossés tourbeux à Daluet.

supinus L. Septembre.

Bords des étangs.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Bords de l'étang de Vérière, R.R.

C^ne de Soings : Bords du lac de Soings, çà et là.

setaceus L. Juin-août.

Bords des eaux, lieux et fossés humides, C.

fluitans L. Juin-juillet.

Marais, fosses, cours d'eau paisibles, C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Lanthenay : Fosses d'extraction de terres glaises près la route départementale n° 13, — fosse entre les tailles du Lieu et la route de la forêt presque vis-à-vis l'allée de la ferme des Bruyères, — le Rantin à Queue-de-Loup.

C^ne de Pruniers : Marais Chaunet, — fosses à l'Ouest et près de l'ancien étang Facy.

Digitized by Google

Cne de Veilleins : Ruisseau de l'ancien moulin Poulet, — fossé au bas de la chaussée de l'étang de la Noue.

Cne de Villeherviers : Anciennes marnières à Forez, — fosses entre le confluent de la Rère et la route de Romorantin à Theillay, — fossé contigu aux grandes marnières des Roches, etc.

Et encore : Cnes de Loreux, — Gy, Mur, etc.

SCIRPUS pauciflorus Lightf. Juin.

Prés tourbeux, R.

Cne de Pruniers : Pacages entre le Grand-Village et les Vérières, — *Pré des Vérières.*

Cne de Veilleins : Écoulements autour de l'étang de Bordebure, R.R.

Cne de Villeherviers : Prés spongieux près et en amont du parc du Portail.

Cne de Soings : Prés marécageux de la rive droite de la Croisne entre sa source et le moulin Hadry.

NOTA. — M. Rimboux l'a récolté dans les prés entre le château du Moulin et le rivière de Lassay, je ne l'y ai pas cherché.

cæspitosus L. Mai-juin.

Bruyères humides et tourbeuses, C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Loreux : Bruyères de la Moutonnerie.

Cne de Pruniers : Bruyères bordant au Sud le chemin de Longueville à la Cornuère, —

Digitized by Google

bruyères de la Robinière, — bruyères bordant au Nord le chemin de Chênemoireau entre la Robinière et les bois des Thivaux.

C^ne de Villeherviers : Pâtureau du Clos-Thion, — bruyères de la rive gauche de la Sauldre en amont du parc du Portail, — bruyères aux abords de Béjarie.

C^ne de Selles-St-Denis : Bruyères de la rive gauche de la Sauldre au bas du coteau vis-à-vis le moulin de Sauldre, etc.

C^ne de Gy : Landes de Chênemoireau, — de Boureau, etc.

Se trouve encore : C^ne de Mur, et surtout : C^nes de Nouan, — Salbris, Pierrefitte, St-Viâtre, Souesmes.

ELEOCHARIS palustris R.Br. Juin-juillet.

Fossés, marécages, C.C.

Var. **reptans** Thuill.

Bords desséchés des étangs sablonneux, C.

uniglumis Koch. Juin-juillet.

Fossés, marécages, prairies humides.

C^ne de Romorantin : Partie marécageuse d'un pré aux Crottés.

C^ne de Pruniers : Anciennes marnières de la Besaudière, etc.

C^ne de Villefranche : Parties humides des prés de l'Escourioux.

C^ne de Gy : Fossés dans les anciennes bruyères de Boureau, etc.

Et encore : C^ne de Souesmes, etc.

Digitized by Google

ELEOCHARIS multicaulis Dietr. Juin-juillet.
Bords des étangs, lieux marécageux, A.C.
C^ne de Lanthenay : Rive gauche du Rantin au-dessous de Queue-de-Loup.
C^ne de Millançay : Bords de l'étang de Malzoné.
C^ne de Pruniers : Rive gauche de l'étang de Bâtarde près la chaussée, — bords de l'ancien étang Facy, — mare à la queue de l'étang des Landes, — marécages bordant la route départementale n° 1 entre Beauvais et les Quatre-Roues, etc.
C^ne de Mur : Chambre d'emprunt bordant la route de Mur à Soings.
Et encore : C^ne de Souesmes, etc.

ovata R.Br. Juillet-août.
Bords des étangs, surtout quand ils sont à sec, C.
C^ne de Lanthenay : Gardoir desséché de l'étang Lanoue, — bords de la rouère de l'étang desséché du Lieu, — bords de l'étang de la Flandrinière.
C^ne de Loreux : Étang desséché d'En-bas, — bords de l'étang Dernier.
C^ne de Millançay : Bords de l'étang de la Meunerie.
C^ne de Pruniers : Étang desséché de Bâtarde, bords de l'étang de la Châtre.
C^ne de Veilleins : Bords de l'étang de la Meunerie, — rouère de l'étang desséché

Digitized by Google

du Lièvre, — rouère de l'étang desséché de la Pingottière.

C^ne de Vernou : *Étang desséché aux Augères.*

C^ne de Villeherviers : *Étang Bardin.*

C^ne de Marcilly-en-Gault : Étang desséché de la Prée.

Et encore : C^ne de Lassay, etc., etc.

ELEOCHARIS acicularis R. Br. Juin-août.

Bords des étangs et des rivières paisibles, C.

RHYNCOSPORA alba Vahl. Juillet-août.

Terrains spongieux, bruyères et prés tourbeux, C.

C^ne de Lanthenay : Marais entre les étangs de Courmin et de Nobière.

C^ne de Millançay : Fondrières au-dessous de l'étang de la Meunerie.

C^ne de Pruniers : Marécages bordant la route départementale n° 1 entre Beauvais et les Quatre-Roues.

C^ne de Veilleins : Abords de l'étang de Bordebure, — fondrières du Pavillon, — bruyères spongieuses au Nord de Tréfontaine.

C^ne de Villeherviers : Bruyères humides bordant la route entre le Portail et les Tourneux.

C^ne de Salbris : Bruyères des Rougerins, — prés tourbeux à Montboulan.

C^ne de Gièvres : Terrains spongieux aux Petits-Étangs.

Digitized by Google

Et encore : Cnes de La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, St-Viâtre, Souesmes, Theillay.

RHYNCOSPORA fusca Rœm. et Sch. Juin-juill.
Bruyères humides, terrains spongieux, C.
Cne de Pruniers : Pâtureau de la petite Robinière, — rive gauche de la Sauldre entre Beauvais et les Quatre-Roues au-dessus de fosses d'extraction.
Cne de Veilleins : Fondrières du Pavillon.
Cne de Villeherviers : Bruyères humides à droite et à gauche de la route de Theillay entre le Portail et les Tourneux.
Cne de Marcilly : *Bas fonds marécageux bordant la route de Loreux à Marcilly au bas de la Brosse.*
Cne de St-Viâtre : Pentes spongieuses de la vallée du Néant à droite de la route en allant de St-Viâtre à Chaumont-s-Tharonne.
Cne de Gy : Bords des marais dans les Landes de Chênemoireau et de Boureau.
Cne de Mur : Chambre d'emprunt bordant le chemin de Mur à Soings.
Je l'ai trouvé abondamment dans les bruyères de Salbris, Pierrefitte et Souesmes plus particulièrement dans le val de la Sauldre.

CAREX pulicaris L. Mai-juin.
Prés et bruyères humides, fondrières, C.
Cne de Pruniers : Bords de l'ancien étang Facy, — rive gauche de l'étang de Bâtarde, — bruyères de l'étang des Landes.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Prés de la Sauldre au pont de Villeherviers.

Cne de Veilleins : Bruyères spongieuses au Nord de Tréfontaine.

Cne de Gièvres : Parties spongieuses du pâtureau de la Grange de Rère, — pré du Chêne-Rabâteux.

Cne de Gy : Landes de Chênemoireau, landes de Boureau, fondrières au-dessous du moulin Tardieu ou Lardilleux.

Abonde surtout dans les fondrières et bruyères humides des Cnes de Pierrefitte et Souesmes, et encrore : Cnes de Loreux, — Villefranche, — Salbris, St-Viâtre, Selles-Saint-Denis.

CAREX disticha Huds. Mai-juin.
Prés humides, C.

═══ **Schreberi** Schrk. Avril-mai.
Cne de Villefranche : Partie septentrionale d'un pré du val du Cher dépendant de la ferme des Granges et contigu au pâtureau de la Parconière.

═══ **vulpina** L. Mai-juin.
Fossés, bords des eaux, C.

═══ **muricata** L. Mai-juin.
Pâtureaux, bords des eaux, C.

═══ **divulsa** Good. Mai-juin.
Bords des haies, bois, C.

═══ **paniculata** L. Mai-juillet.
Marécages tourbeux.

Digitized by Google

Cne de Maray : Prés et ruisseaux tourbeux à Daluet, C.C.

Cne de Gy : Bords du biez du moulin Tardieu, — marécages dans le pâtureau de ce moulin, — marécages dans le pâtureau du moulin Corbeau, — marais de la rive droite de la Croisne au-dessous de Gy, C. dans toutes ces localités.

Cne de Lassay : *Marécage derrière la ferme du château du Moulin,* R.R.

Cne de Mur : Marécages au-dessous de l'étang Maré, C.C.

CAREX elongata L. Mai-juin.

Lieux marécageux.

Cne de Villeherviers : Bords d'une mare dans le bois bordant la rive droite du Grand-Fossé près et vis-à-vis la Doubletière.

Cne de Gy : Le premier marais boisé qui se trouve à gauche du chemin après avoir passé le pont de la Croisne en venant de Piedsauvron, — marais boisé voisin de la Demangère.

═══ **leporina** L. Mai-juin.

Fossés, prés humides, C.

NOTA. — La var. ***argyroglochin*** Horn. a été récoltée par M. Franchet

Cne de St-Julien : Aux bords du ruisseau dans le bois sis au Sud et près d'Olivet.

═══ **echinata** Murr. Mai-juin.

Terrains spongieux et fondrières, C.

Digitized by Google

Plus particulièrement :

Cnes de Villeherviers, Pierrefitte, Souesmes.

Je l'ai trouvé également :

Cnes de Romorantin, Lanthenay, Millançay, Pruniers, — Marcilly-en-Gault, St-Viâtre, Selles-St-Denis, — Gièvres, Gy, Mur, etc.

CAREX remota L. Mai-juin.

Bords des ruisseaux, lieux humides et ombragés, C.

Cne de Loreux : Fossés de la Moutonnerie, — haie d'un pré à l'angle des chemins de Rosière à la Gravelle et de Lavau à la Gravelle.

Cne de Pruniers : Fossés du pâtureau des Granges.

Cne de Villeherviers : Rive gauche du Grand-Fossé près la Doubletière.

Cne de Maray : Fossés tourbeux à Daluet.

Cne de St-Julien : Bois près et au Sud de la route de St-Julien à St-Loup aux bords du ruisseau qui se jette dans le Cher à Olivet.

Cne de St-Loup : Bords du Roulier près la ferme du Roulier, C.C., bords du ruisseau de la Grange.

Cne de Villefranche : Ruisseau bordant au Nord la grande pièce de pré de l'Escourioux, — ruisseau du val du Cher au bas du pout de Villebrette.

Digitized by Google

C^ne de Neung-sur-Beuvron : Bas du parc de Villemorant.
C^ne de Selles-St-Denis : Haie à St-Genou près les bords de la Sauldre.
C^ne de Gièvres : Fossés du val du Cher entre le pont de l'Escourioux et celui de Jaugy au bas de la chaussée du canal du Berry.
C^ne de Gy : Marécages dans le pâtureau du moulin Lardilleux, — marécages dans le pâtureau du moulin Corbeau, et encore :
C^nes de Souesmes, — Mur, etc.

CAREX Goodenowii Gay. Juin.
Prés humides, fondrières, bords des eaux, A.C.
C^ne de Veilleins : Fondrières du Pavillon.
C^ne de Vernou : Bords du Néant (rive gauche) près les Nardillais.
C^ne de Villeherviers : Prés du Rantin à Queue-de-Loup, — Prairies de la rive droite du Grand-Fossé près de son confluent.
C^ne de Selles-Saint-Denis : Environs de la Bronze dans la vallée de la petite Rère.
Et encore : C^ne de Souesmes, etc.

═══ **stricta** Good. Avril-mai.
Étangs, bords des eaux, C.C.

═══ **acuta** Fries. Mai-juin.
Bords des eaux, C.

═══ **glauca** Scop. Mai-juin.
Bois frais, pâturages humides, C.

Digitized by Google

CYPERACEÆ

CAREX strigosa Huds. Mai-juin.
Bords des ruisseaux, R.R.
Cne de St-Loup : Bords du Roulier près la ferme du Roulier et plus particulièrement aux abords de la Fontaine-Chaude.

═══ **pallescens** L. Mai-juin.
Bois, prés, A.C.
Cne de Lanthenay : Prés aux Étangs.
Cne de Millançay : Forêt de Bruadan çà et là.
Cne de Pruniers : Pâtureau de la Petite-Robinière.
Cne de Villeherviers : Rive gauche de la Sauldre, vis-à-vis Trécy.
Cne de St-Julien : Bois à Olivet.
Cne de St-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et Saint-Loup.
Cne de Souesmes : Prairies de la rive gauche de la Sauldre près le pont de Pierrefitte.
Et encore : Cnes de Loreux, — Selles-St-Denis, — Gy, Mur, etc.

═══ **panicea** L. Avril-juin.
Bruyères, pacages humides, C.

═══ **Buxbaumii** Wahlenberg. Mai-juin.
Prés humides.
Cne de Romorantin : Prés aux Arrogantes, — prés aux Papillons.
Cne de Lanthenay : Prés aux Étangs, — Prés de la rive droite du

Digitized by Google

Rantin en amont du gué de Queue-de-Loup, — *bords du gardoir de l'étang de Courmin,* — bords d'une fosse entre le gardoir et la ferme de Courmin, — Prés de la Nasse entre la 2e et la 3e arche, — prés de la rive droite de la Sauldre vis-à-vis le Portail.

Cne de Loreux : Prés de la Beauce au-dessous de Pontaudran.

Cne de Pruniers : Prés à Longueville, — pré bordant la route départementale n° 7 au bas de la chaussée de l'ancien étang du Ponceau, — pré bordant la route départementale n° 1, un peu au-dessus des Quatre-Roues.

Cne de Villeherviers : Prés de la rive gauche du Rantin en amont du gué de Queue-de-Loup, — prés de la Beauce au-dessus et au-dessous du Pont-Gitton, — prés au bas de l'Étang-Neuf et de son gardoir, — prés de la rive droite de la Sauldre au-dessous du pont de Villeherviers : Pré au Colombier, — pré à Béjarie, — pré contigu au pâtureau de Clos-Thion, — prés bordant le Grand-Fossé au-dessous de la Doubletière jusqu'à son confluent, — prés du Riau-Mabon depuis la Gouabinière jusqu'à son confluent sur une longueur de plusieurs kilomètres, mais plus particulièrement aux abords du chemin de la

Digitized by Google

Fringale et surtout au-dessous de la Gouabinière, — pâtureau de Chenon.

Cne de Langon : Val de la petite Rère (rive gauche) au-dessous du pont de la route de Selles-St-Denis à Mennetou.

Cne de Villefranche : *Prés de la Bezardière,* — Pré de la Lavanderie bordant au Nord la route nationale no 76.

Cne de Selles-Saint-Denis : Prés de la Beauce à Pontaudran, — Prairie de la Sauldre (rive droite), un peu en amont du moulin de Sauldre.

Cne de Gièvres : *Pré du Chêne-Rabateux aux environs de la Berrerie,* — prés entre la Grange de Rère et la route départementale no 1, — *prés des Mottets, bordant la route départementale no 1,* — prés au bas de la Planche-Morand entre le canal du Berry et la route de Villefranche à Gièvres.

Cne de Gy : Prés de la rive gauche de la Croisne au-dessous de Gy, R. — Petit pré voisin de la Demangère faisant suite à des marécages.

La rareté de cette espèce qui, depuis la perte de l'Alsace, ne se trouve plus en France que sur le mont Bayard (Hautes-Alpes) et aux environs de Romorantin m'a déterminé à indiquer toutes les localités où je

Digitized by Google

l'ai observée. Ces localités se trouvent toutes sur une bande de terrain de 25 kilomètres de longueur sur 12 de largeur, courant du Nord-Est au Sud-Ouest et ayant son centre dans la partie la plus méridionale de la Cne de Romorantin.

CAREX præcox Jacq. Avril-mai.

Pelouses, bois, landes, C.

Je l'ai trouvé à bractées très développées et engaînantes et à écailles longuement mucronées

Cne de Villeherviers : Pré de la rive droite du Riau-Mabon à la Gaillardière.

tomentosa L. Mai-juin.

Bois et prés humides principalement dans les terrains calcaires, A.C.

Cne de Romorantin : Prés aux Arrogantes.

Cne de Lanthenay : Prés aux Étangs.

Cne de Pruniers : Pré à Longueville, — bois de l'Abbaye.

Cne de Villeherviers : Prés à Queue-de-Loup, — prés de la Sauldre en amont du parc du Portail, — prés du Riau-Mabon.

Cne de Langon : Pâtureau de Nocfond.

Cne de St-Loup : Bois de Laumond.

Cne de Villefranche : *Prés de la Bézardière bordant la route départementale n° 7*, — prés entre le canal du Berry et la route nationale n° 76 en amont de Villefranche.

Digitized by Google

Je l'ai trouvé encore : Cnes de Maray, — Gièvres, Gy, — Thésée.

CAREX pilulifera L. Mai.
Bois, bruyères, C.

═══ **sylvatica** Huds. Mai.
Bois, A.C.
Cne de Villeherviers : Ile de Trécy.
Cne de Maray : Bois de Belair contigu à la prairie de Doulcay.
Cne de St-Julien : Garenne de Valette, — bois à Olivet.
Cne de St-Loup : Bois de la rive droite du ruisseau de la Grange et, particulièrement, bois du Fondereau.
Cne de Selles-sur-Cher : Bois au bas de l'écluse qui précède le pont canal.
Cne de Gièvres : *Bois de la Grange de Rère.*
Cne de Châtillon-sur-Cher : Bois de la Cave.

═══ **flava** L. Juin-juillet.
Prairies humides, A.C.
Cne de Villeherviers : Prairies du Riau-Mabon à son confluent en amont du parc du Portail.
Cne de Millançay : Fondrières au-dessous de l'étang de la Meunerie, avec bractées dressées.
Cne de Gy : Pâtureau marécageux du moulin Corbeau.
Et encore : Cnes de Veilleins, — Souesmes.

Digitized by Google

CYPERACEÆ

CAREX Œderi Ehrh. Juin-août.
Bords des étangs et marais, C.C.

Hornschuchiana Hop. Mai-juin.
Prés et pacages humides, C.

C^ne de Lanthenay : Prés aux Étangs où je l'ai l'ai récolté avec une tige rameuse.

C^ne de Pruniers : *Pré des Vérières*, — bords de l'étang de Bâtarde.

C^ne de Villeherviers : Prés de Béjarie, — prés du val de la Sauldre, — pâtureau du Clos-Thion près les Fontenils, — prés du Riau-Mabon, — pacage à l'entrée des grandes marnières des Roches.

C^ne de Langon : Val de la petite Rère (rive gauche), au bas du pont de la route entre Selles-Saint-Denis et Mennetou où je l'ai récolté à épi gynobasique.

C^ne de Gièvres : Pré du Chêne-Rabâteux voisin de la Berrerie.

C^ne de Gy : Prés des bords de la Croisne.

Et encore : C^nes de Loreux, — Mennetou, — St-Viâtre, Selles-St-Denis, Souesmes, — Mur.

Var. **fulva** *(C. fulva Hop.)* Juin.
Prés, R.

C^ne de Pruniers : Prairie spongieuse près et à l'Est de Bâtarde.

C^ne de Villeherviers : Pâtureau du Clos-Thion près les Fontenils.

Digitized by Google

Cne de Selles-St-Denis : Vallée de la petite Rère au bas de la chaussée de la route de Selles-St-Denis à Mennetou.

CAREX distans L. Mai-juin.
Prés humides, fossés, C.

═══ **punctata** Gaud. Mai-juin.
Cne de Maray : Pacages et ruisseaux tourbeux à Daluet en amont des bâtiments.

═══ **lævigata** Sm. Mai-juin.
Fondrières et marécages boisés.
Cnes de Neung et de Montrieux : Bords du ruisseau qui sépare les deux communes à Villemorand, A.C.
Cne de Souesmes : Pentes spongieuses et boisées de la rive gauche de la Sauldre en an amont et en aval du pont de Pierrefitte, — marécages tourbeux de la petite Sauldre en se rapprochant des limites du département, A.R.
Cne de Gy : Fondrières près le moulin Tardieu ou Lardilleux à deux endroits, — pâtureau du moulin Corbeau.
Cne de Mur : Marécages boisés et tourbeux au-dessous de l'étang Maré, C.

═══ **pseudocyperus** L. Juin-juillet.
Bords des eaux un peu marécageuses, A.C.
Cne de Romorantin : Rouère de l'ancien étang de Beauvais.

Digitized by Google

C^ne de Veilleins : Rouère de l'ancien étang Poulet, — bas de la chaussée de l'étang du Pavillon.

C^ne de Villeherviers : Fossé traversant la route entre le bourg et le pont sur la Sauldre, — bords du Grand-Fossé au-dessous de la Doubletière.

C^ne de Maray : Ruisseaux tourbeux à Daluet.

C^ne de Villefranche : Contre-fossés et bords du canal du Berry entre Villebrette et l'Escourioux.

C^nes de Neung et de Montrieux : Ruisseau au bas de Villemorand.

C^ne de Selles-sur-Cher : Bords du canal du Berry.

C^ne de Billy : Bords de la Sauldre au moulin Larey.

C^ne de Gièvres : Bords du canal du Berry et dans ses contre-fossés particulièrement à l'entrée des bois des Nouïes.

C^ne de Gy : Un des nombreux marais de la rive droite de la Croisne voisin de la Demangère et peuplé de saules.

C^ne de Lassay : Mare derrière la ferme du château du Moulin.

C^ne de Soings : Autour du lac.

CAREX vesicaria L. Mai-juin.
Bords des eaux, marécages, C.C.

═══ **paludosa** Good. Mai.
Bords des ruisseaux, C.

Digitized by Google

NOTA. — Je possède de la petite île des Bresolles, commune de Pruniers, la var. *Kockiana (C. Kockiana D.C.)* qui y a été récoltée par M. Rimboux, mais je ne l'y ai pas vue.

CAREX riparia Curt. Mai-juin.

Bords des rivières, canaux et ruisseaux, C.

Je l'ai trouvé en 1861, A.C. à épi supérieur androgyne, aux bords de la Croisne entre le gué et le pont de Gy.

acuminata Willd. Mai-juin.

C^ne^ de Selles-S^t^-Denis : Bas fonds d'un pâturreau découvert longeant au Sud le chemin de Selles-S^t^-Denis à Veur, au Sud-Ouest de la ferme de Sauldre.

Fleurit très-rarement. Je le considère comme un hybride du *C. paludosa* dont il a l'aspect et du *C. hirta* ou du *C. filiformis*, tous habitants de la contrée, bien qu'à quelque distance. M. Boreau à qui je l'ai envoyé vivant en 1873, y voyait incontestablement, m'écrivait-il, le *Carex acuminata* de Reichenbach, mais comme Reichenbach reconnait que le *Carex acuminata* figuré dans ses *Icones* n'est pas celui de Willdenow, M. Boreau l'a inscrit dans son manuscrit sous le nom de *Carex pseudo nutans*. Quelqu'il soit, ce *Carex* est nouveau pour la flore de France.

Digitized by Google

En voici la description :

Souche : longuement traçante.

Tige : raide, haute de 6 à 7 décimètres, striée, lisse dans le bas, rude et à angles aigus dans le haut.

Feuilles : carénées, très aiguës, atteignant ou dépassant les épis.

Épis mâles : 3 à 4, bruns, aigus, dressés, rapprochés.

Épis femelles : 2, rarement 3, bruns, dressés, rapprochés entre eux et des épis mâles, le supérieur sessile, l'inférieur brièvement pédonculé.

Bractées : non engaînantes, foliacées, rudes, striées, celle de l'épi inférieur atteignant ou dépassant les épis mâles.

Écailles des épis : brunes, à carène colorée se prolongeant en mucron; celles des épis mâles obtuses dans le bas, aiguës dans le haut; celles des épis femelles aiguës, atteignant ou dépassant les utricules.

Utricules : à 3 stigmates, velus, nerviés, ovoïdes, atténués insensiblement en un bec court.

Akènes : constamment avortés.

CAREX filiformis L. Juin.

Bords des eaux marécageuses.

C^ne^ de Lanthenay : *Gardoir de l'étang de Courmin.*

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : *Marais Chaunet.*

C^ne de Villeherviers : Prés de la Chansonnerie sur la rive droite de la Sauldre ; — pré du Portail sur la rive gauche du Rau-Mabon en amont du parc du Portail.

C^nes de Langon et de Selles-St-Denis : Val de la petite Rère à droite et à gauche de la route de Selles-St-Denis à Mennétou. Dans les années humides les prairies en étaient littéralement couvertes, il tend à disparaître depuis que la petite Rère est curée.

C^ne de Souesmes : Bords de la Boute-Morte dans un pré bordant l'ancien chemin de Pierrefitte à Souesmes.

C^ne de Gièvres : *Fossé dans le pré du Chêne-Rabâteux.*

C^ne de Gy : Marais dans les landes de Chênemoireau et de Boureau, C.C., — marais de la rive droite de la Croisne entre le bourg de Gy et la Demangère.

CAREX hirta L. Mai-juin.

Lieux humides et sablonneux, C.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

ERIOPHORUM *gracile* Koch. C^nes de Cheverny et Vendôme, A.B.V. (MM. Franchet et Peltereau).

SCIRPUS *compressus* Pers. C^nes de Celettes et Huisseau-en-B., A.B.V. (MM. Franchet et Nouel).

CAREX *ligerica* Gay. Avaray, A.B. (M. E. Roger).

— *paradoxa* Willd. St-Lubin, A.B. (M. Franchet).

Digitized by Google

CAREX *teretiuscula* Good. Sargé, A.V. (M. Léon Legué).

— *maxima* Scop. Forêt de Boulogne, A.B. (M. Franchet).

— *depauperata* Good. Cne de Seur, A.B. (M. Franchet).

— *ampullacea* Good. Cnes de St-Lubin et Sargé, A.B.V. (MM. Franchet, L. Legué, Nouel).

GRAMINEÆ Juss.

LEERSIA oryzoides Soland. Juillet-septembre. Bords des eaux, C. notamment :

Cne de Vernou : Bords de la Bonne-Heure aux Augères, — bords du Néant à Villeneuve.

Cne de Villeherviers : Bords de la Sauldre à Trécy et au-dessous, — bords de la Rère au-dessous du pont de la route de Romorantin à Theillay.

Cne de Villefranche : Bords du canal du Berry entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux.

Cne de La Ferté-St-Cyr : Ruisseau traversant la route départementale no 13 à la sortie d'un étang.

Cne de Marcilly-en-Gault : Fossé d'écoulement au bas de la chaussée de l'étang de Bièvre, — fossé longeant des marécages à la queue de l'étang de la Gravelle, — bords de l'étang de Pointillou, — bords de l'étang de l'Aunay.

Cne de Pierrefitte : Ile de la Sauldre à Mau-

Digitized by Google

bertin, — bords de la Boute-Vive entre le pont et le Gué de Cerbois.

Cne de Souesmes : Bords de la petite Sauldre près du Réau.

Cne de Theillay : Ruisseau entre le bourg et le chemin de fer.

Cne de Gièvres : Bords du canal du Berry, notamment près le pont de l'Escourioux, — fosses près et à l'Ouest de la Prévôtière.

Cne de Gy : Bords de la Croisne près le pont de Piedsauvron.

Cne de Thésée : Les bords du Cher près le bac, et encore :

Cne de Lassay, etc.

PHALARIS arundinacea L. Juin-juillet.
Bords des eaux, C.

ANTHOXANTHUM odoratum L. Avril-mai.
Prés, bois, C.C.

═══ **Puelii** Lec. et Lam. Juin-juillet.
Moissons des terrains sablonneux et et frais, C.C.

MIBORA verna P. Beauv. Mars-mai.
Lieux sablonneux et incultes, C.C.

CRYPSIS alopecuroides Schrad. Août-octobre.
Cne de Villefranche : Val du Cher, bords d'un marécage près le pont de Villebrette, R.R.

PHLEUM pratense L. Juin-juillet.
Prés, C.C.

═══ **Bœhmeri** Wib. Juin-juillet.
Terrains calcaires, R.

Digitized by Google

Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.

Cne de Gièvres : *Terrains calcaires et incultes bordant la route départementale nº 1, à 9 kilomètres de Romorantin.*

Cne de Soings : Coteaux au Nord et à l'Est du lac.

ALOPECURUS pratensis L. Mai-juin.
Prés, C.C.

═══ **agrestis** L. Mai-juin.
A.C. mais dans les moissons des terrains calcaires seulement.

Cne de Pruniers : Moissons des terrains calcaires de la Besaudière et de la Maison-Blanche.

═══ **geniculatus** L. Mai-juillet.
Fossés, étangs desséchés, C.

═══ **fulvus** Smith. Mai-juillet.
Fossés, étangs desséchés, C.

SETARIA glauca P. Beauv. Août-septembre.

Cne de Pruniers : Terres sur la hauteur entre la Gascetière et la route départementale nº 1, — terres de la rive droite de la Sauldre en amont de Champleroy, — cultures à la Cornuère et à la Besaudière.

Cne de Villeherviers : Terre contiguë au gardoir de la Chansonnerie.

Cne de Langon : Val du Cher.

Cne de Villefranche : Jardin de Montauger.

Cne d'Orçay : Jardins du bourg.

Digitized by Google

Cne de Gièvres : Cultures entre le pâtureau de la Grange de Rère et la route de Chabris.

SETARIA viridis P. Beauv. Juillet-octobre.
Cultures, jardins, C.

═══ **verticillata** P. Beauv. Juillet-août.
Cultures, jardins, C.

PANICUM crus-galli L. Juillet-août.
Fosses, lits des étangs mis en culture, C. avec et sans arètes.

═══ **sanguinale** L. Juillet-octobre.
Vignes, cultures, C.

Var. **ciliare** *(Panicum ciliare Retz.)*. Septembre-octobre.
Cne de Billy : Vignes du Tertre-Blanc.

═══ **glabrum** Gaud. Août-septembre.
Lieux sablonneux, alluvions, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Romorantin : Pied du mur de l'hospice aux bords du chemin de Pruniers, — terres bordant la route de Villefranche.
Cne de Lanthenay : Cultures à la Pesnière.
Cne de Villefranche : Val du Cher.
Cne de Soings : Champs au Nord-Ouest du lac.

CYNODON dactylon Pers. Juillet-août.
Lieux secs et sablonneux, C.

ANDROPOGON ischæmum L. Juillet-août.
Terrains calcaires ou voisins du calcaire.
Cne de Gièvres : Chemin de la Loge, R.R.

Digitized by Google

Cne de Soings : Pentes dominant l'ancien chemin de Soings à Contres au Nord-Ouest du lac.

Cne de Noyers : Carrières de Belleroche.

PHRAGMITES communis Trin. Juillet-sept.
Bords des eaux, C.

CALAMAGROSTIS epigeios Roth. Août.
Bois, pâtureaux humides, C. surtout dans les terrains calcaires.

AGROSTIS alba L. Juillet.
Bruyères, bords des eaux, C.

═══ **vulgaris** With. Juin-juillet.
Pelouses, prés, C.

═══ **canina** L. Juin-juillet.
Prés humides, C.

═══ **spica-venti** L. Juillet.
Moissons, C.

═══ **interrupta** L. Juin.
Moissons, chemins peu fréquentés, R.R.

Cne de Lanthenay : Vignes aux Verdons, — moissons des Étangs bordant le chemin de la Malicorne, — chemin de la forêt, — chemin entre des vignes et la partie méridionale des tailles du Lieu.

Cne de Soings : Ancien chemin de Contres, — Coteau à l'Ouest du lac.

GASTRIDIUM lendigerum Gaud. Août-sept.
Cne de Pruniers : Terre bornée au Nord et à l'Ouest par le pâtureau de la Chapelle, R.R.

Digitized by Google

Je ne l'y trouve plus depuis quelques années.

ANTINORIA agrostidea Parl. Juin-août.

Bords des mares et des étangs, C.C. Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Romorantin : Bords d'une fosse dans les bruyères de Chat-Lièvre.

C^ne^ de Lanthenay : Queue de l'étang de Courmin, — marais au bas de la chaussée de l'étang de Courmin, — gardoir de l'étang Lanoue, — fosse entre les tailles du Lieu et la route de la forêt presque vis-à-vis l'allée de la ferme des Bruyères, — bords de l'étang de Nobière.

C^ne^ de Pruniers : Bords des étangs de la Cornuère, — de Longueville, — de Bâtarde.

C^ne^ de Veilleins : Bords des étangs du Lièvre, — de l'Ardrole, — Fleury, — de la Pingottière, etc.

C^ne^ de Selles-St-Denis : Fossé longeant au Nord la route départementale n° 11, entre les bornes 12 et 13.

C^ne^ de Gièvres : *Marais de Villefondue.*

C^ne^ de Lassay : Petit étang dans des bruyères près et à l'Est du château du Moulin.

C^ne^ de Mur : Étangs du bourg, — étangs de la ferme de la Chaussée, et encore :

C^nes^ de Loreux, Vernou, — Neung, — Salbris, Marcilly-en-Gault, Gy, etc.

Digitized by Google

GRAMINEÆ

CORYNEPHORUS canescens P. Beauv. Juin-juillet.

Sables incultes, C.

AIRA caryophyllea L. Juin.

Pelouses, moissons maigres, C.

Var. **divaricata** *(A. patulipes Jord.)*.

C^ne^ de Romorantin : Talus d'un fossé près S^t^-Lazare.

—— **multiculmis** Dum. Juin.

Moissons, talus des fossés, A.C.

C^ne^ de Romorantin : Bords d'un fossé dans les Crottés.

C^ne^ de Villeherviers : Talus de fossé du chemin longeant le parc des Roches.

C^ne^ de Villefranche : Moissons bordant la route de Romorantin à Villefranche.

C^ne^ de Gy : Moissons bordant le chemin de Gy à Rougeou à 1 kil. à peine du bourg de Gy.

—— **præcox** L. Mai-juin.

Terrains frais et sablonneux, A.C. Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Millançay : Bords d'une taille du Pâtis longeant la route départementale n° 1.

C^ne^ de Pruniers : Queue de l'ancien étang du Ponceau, — *bois de pins bordant le chemin de Romorantin à Bâtarde.*

C^ne^ de Lanthenay : Clairières de pins à Queue-de-Loup.

Digitized by Google

Cne de Villeherviers : Terrains sablonneux à Queue-de-Loup.

Cne de Gy : Anciennes bruyères de Boureau.

DESCHAMPSIA cæspitosa P. Beauv. Juillet. Bruyères, fossés, bois frais, C.

Thuillieri Gr. et G. *(Aira uliginosa Bœnigh.)* Juin-juillet.

Fossés, marécages, bords des étangs, C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Lanthenay : Marais et étangs aux environs des fermes de Courmin et des Bruyères, — gardoir de l'étang Lanoue.

Cne de Loreux : Bords de l'étang de Cantinet.

Cne de Millançay : Bords de l'étang de Malzoné, — de l'étang Pondeux, etc.

Cne de Veilleins : Queue de l'étang Fleuri.

Cne de Villeherviers : Bords des étangs *Bardin*, — des Gasts, — Preneau.

Cne de Selles-St-Denis : Prairies marécageuses de la rive droite de la petite Rère en aval de la route de Selles-Saint-Denis à Mennetou, C.C. avant le curage de la Petite-Rère.

Cne de Gy : Bords des marais dans les landes de Chênemoireau.

Cne de Lassay : Bords de l'Étang-Neuf.

Et encore : Cnes de Vernou, — Neung-sur-Beuvron, — Salbris, Marcilly-en-Gault, St-Viâtre, Souesmes, etc.

DESCHAMPSIA flexuosa Gris. Juillet. Bois, bruyères, C.

Digitized by Google

AVENA fatua L. Juin.
Prés, moissons, A.C.
Je l'ai récolté notamment :
C^ne de Pruniers : Pré de l'Aubraye.

═══ **pubescens** L. Juin.
Prés, bois, bruyères, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :
C^ne de Romorantin : Chemin voisin des marnières dans les anciennes bruyères des Monteaux.
C^ne de Pruniers : Pré de la cure appelé pré Vallois.
C^ne de Villeherviers : Pré de la Gaillardière entre le Riau-Mabon et un bois.
C^ne de Gièvres : Lisière septentrionale du bois du Poulinat.
C^ne de Soings : Coteau au Nord-Ouest du lac dominant l'ancien chemin de Contres.

═══ **pratensis** L. Juin.
C^nes de Billy et Châtillon-sur-Cher : Bords du chemin et chemin limitant les deux communes près et au Nord de la route nationale n° 76.

ARRHENATHERUM elatius Mert. et K. Juin-juillet.
Haies, buissons, prés, C.

Var. **bulbosum** *(Avena bulbosa Willd.)*.
Moissons calcaires, R.R.

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Moissons calcaires de la Besaudière et de la Maison-Blanche.

NOTA. — Je l'ai reçu des terres de Villeneuve, commune de Vernou, mais je ne l'y ai pas observé.

TRISETUM flavescens P. Beauv. Juin.
Prés secs, C.

HOLCUS lanatus L. Juin-juillet.
Prés, C.

═══ **mollis** L. Juillet.
Prés, moissons, C.

KŒLERIA cristata Pers. Juin.
Pelouses sèches, bruyères, A.C. Je l'ai trouvé notamment :
C^ne de Romorantin : *Bruyères des Monteaux.*
C^ne de Millançay : Ados du fossé méridional du taillis bordant la route départementale n° 1 sur la hauteur du Pâtis.
C^ne de Pruniers : Bords du chemin entre les Brésolles et le pont du Pruniers, — petit pâtureau de la Cornuère, — anciennes marnières de la Pommerie.
C^ne de Villeherviers : Bas de la côte à l'Est du parc du Portail.
C^ne de Villefranche : Pelouses près S^te-Marthe.
C^ne de Gièvres : Bords du chemin de la Loge en se rapprochant des affleurements calcaires.

CATABROSA aquatica P. Beauv. Juin.
Marécages, R.

Digitized by Google

Cne de Maray : Ruisseaux tourbeux à Daluet.
Cne de Gièvres : Fondrière bordant à mi-côte la route de Chabris et contiguë au pâtureau de la Grange de Rère.
Cne de Soings : Bords du lac vers le Nord.

GLYCERIA fluitans R. Br. Mai-juin.
Fossés, mares, C.

═══ **plicata** Fries. Juin.
Fossés, R.R.
Cne de Maray : Fossé au Sud-Est et au bas de la Pelaudière, — fossés tourbeux à Daluet.

═══ **aquatica** Wahlb. Juin.
Bords des eaux, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Romorantin : Bords de la Sauldre.
Cnes de Villefranche et de Gièvres : Bords du canal du Berry.

POA annua L. Avril-octobre.
Cultures, cours, rues, pelouses, C.C.

═══ **nemoralis** L. Juillet.
Bois, pâtureaux, C.

═══ **serotina** Ehrh. Septembre-octobre.
Prés, R.R.
Cne de Villeherviers : Prés de la rive droite de la Sauldre en amont de Moulin-Neuf.

═══ **bulbosa** L. Mai.
Lieux secs et incultes, murs, C.

═══ **compressa** L. Juin-septembre.
Lieux secs, murs, C.

Digitized by Google

GRAMINEÆ

POA pratensis L. Mai-juin.
Prés, pâturages, C.

═══ **trivialis** L. Juin.
Prés, moissons, C.

ERAGROSTIS megastachya Link. Août-octobre.
Lieux cultivés, jardins, vignes, C. Je l'ai trouvé notamment :
Cne de Romorantin : Vignes situées entre les faubourgs d'Orléans et de Blois, C.C.
Cne de Lanthenay : Environs de la Lambinière, C.
Cne de Villefranche : Jardins de l'Escourioux, — de la Commanderie, — de la Richaudière.
Cne de Marcilly-en-Gault : Le bourg.
Cne de Selles-sur-Cher : Terres de la Thizardière sises au Nord du canal du Berry.

═══ **pilosa** P. Beauv. Août-septembre.
Lieux sablonneux et inondés pendant l'hiver.
Cnes de Romorantin et Villefranche : Vignes et cultures à la Richaudière, C.
Cnes de St-Julien et de Villefranche : Grèves du Cher, A.C.

BRIZA media L. Mai-Juin.
Pacages, C.

═══ **minor** L. Juin-juillet.
Moissons, champs, R.

Digitized by Google

Cne de Lanthenay : Environs du Grand-Vauvert, R.R.

Cne de Pruniers : Moissons de la Gascetière, R.R.

Cne de Villeherviers : Terre de la rive gauche de la Beauce au Pont-Gitton entre un marais et la route départementale no 11, — moissons de Balletan, rive gauche de la Sauldre.

Cne de Gy : Moissons bordant la route de Gy à Rougeou, à moins de 1 kilom. du bourg de Gy.

MELICA uniflora Retz. Mai.

Bois, A.C. Je l'ai observé notamment :

Cne de Millançay : Forêt de Bruadan à la Californie.

Cne de Pruniers : Bois de l'Abbaye, — pâtureaux de Longueville et de la Cornuère.

Cne de Villeherviers : Bas du parc du Portail, C.C.

Cne de St-Julien : Bois à l'Est d'Olivet.

Cne de St-Loup : Bois de Sauveterre, — bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup, — bois du Fondereau, — bois bordant le ruisseau de la Grange.

SCLEROPOA rigida Gris. Juin.

Lieux secs et pierreux, principalement dans les terrains calcaires, A.R.

Cne de Pruniers : Abords d'une fosse à l'Abbaye.

Digitized by Google

Cne de Selles-sur-Cher : Culées du pont canal.
Cne de Billy : Carrières du Tertre-Blanc.
Cne de Gièvres : Terres calcaires à Jaugy, — champ des Calabres.

DACTYLIS glomereta L. Juin.
Prés, C.C.

MOLINIA cærulea Mœnch. Juillet-août.
Prairies et bruyères humides, C.

DANTHONIA decumbens D.C. Juin.
Pâturages, bruyères, pelouses des bois, C.

CYNOSURUS cristatus L. Juin.
Prés secs, C.

VULPIA pseudo-myuros Soy.-Willm. Juillet.
Chemins et champs sablonneux, C.C.

═══ **sciuroides** Gmel. Juin.
Chemins sablonneux, bords des bois de pins, C.

═══ **myuros** Rchb. *(V. ciliata Link.)* Juin.
Terrains secs incultes et calcaires, R.
Cne de Billy : Terres calcaires de Billy, particulièrement au Tertre-Blanc, C.C.
Cne de Gièvres : *Terres calcaires incultes bordant la route départementale nº 1, à 9 kilom. environ de Romorantin,* R.
Cne de Soings : Coteau au Nord du lac, R.

═══ **bromoides** Rchb. Mai-juin.
Lieux stériles.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Terre au Nord du pâtureau de Longueville.

Cne de Salbris : Sables contigus à la gare de Salbris et à un bois de pins.

Cne de Gièvres : Bords du chemin de la Loge avant les affleurements calcaires.

Cne de Gy : Terres dans la région des marais de la rive droite de la Croisne.

Cne de Soings : Coteau au Nord du lac.

FESTUCA tenuifolia Sibth. Juin.
Lieux incultes, bords des chemins sablonneux, C.

═══ **ovina** L. Mai-juin.
Lieux incultes, landes, C.

═══ **duriuscula** L. Juin.
Prés secs, lieux incultes, C.
Varie à épillets pubescents.

Cne de Villeherviers : Bruyères bordant le chemin de la Fringale près du Riau-Mabon.

═══ **rubra** L. Juin.
Prés, pacages, C.

═══ **pratensis** Huds. Juin-août.
Prés humides, C.

═══ **gigantea** Vill. Juillet-septembre.
Lieux ombragés et humides, R.R.

Cne de Pruniers : *Haie du jardin du Grand-Marmagne.*

Cne de St-Julien : Pentes à mi-côte dans le bois au Sud de la route de St-Loup, vis-à-vis Olivet.

Digitized by Google

Cne de St-Loup : Ravins et fossés dans les bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup, — bords du Roulier près la ferme du Roulier.

BROMUS tectorum L. Juin.
Murs, lieux secs et stériles, C.

═══ **sterilis** L. Mai-juin.
Lieux stériles, pied des haies, C.

═══ **asper** L. Juillet.
Bois, bords des ruisseaux ombragés, moissons fraîches, C.
Je l'ai récolté notamment :
Cne de St-Julien : Bords du ruisseau traversant le bois sis au Sud de la route de Saint-Loup, vis-à-vis Olivet.
Cne de St-Loup : Bois de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup, — bords du Roulier.
Cne de Gièvres : Moissons de la Berrerie, — large fossé d'enceinte au Nord et en bas de la Grange de Rère.

═══ **erectus** Huds. Juin.
Bords des champs, prés secs; levées du canal du Berry, C.

SERRAFALCUS secalinus Godr. Juin.
Moissons, C.

═══ **arvensis** Godr. Juillet-août.
Moissons, A.C.

═══ **commutatus** Godr. Juin.
Moissons, prés, C.

Digitized by Google

GRAMINEÆ

SERRAFALCUS mollis Parl. Mai-juin.
Bords des chemins, prés, C.

HORDEUM murinum L. Juin.
Bords des haies et des murs, C.C.

═══ **secalinum** Schreb. Juin-juillet.
Prairies, C.

AGROPYRUM repens P. Beauv. Juin.
Champs, bords des chemins, C.

═══ **caninum** Rœm. et Sch. Juin.
Haies, bois, C.

BRACHYPODIUM sylvaticum Rœm. et Sch. Juillet.
Haies, bois, pâtureaux, C.

═══ **pinnatum** P. Beauv. Juillet.
Haies, bois, pâtureaux, C.

LOLIUM perenne L. Juin-septembre.
Pelouses, bords des chemins, C.C.

Varie à épis grêles et lâches *(L. tenue L.)* et à épi formé d'épillets contigus et disposés sur deux rangs *(L. cristatum Pers.)*.

═══ **italicum** Al. Br. Juin-octobre.
Prairies, pacages.
C^ne^ de Romorantin : Prés de la Nasse dans le bas du faubourg d'Orléans.
C^ne^ de S^t^-Julien : Bois au Sud de la route de S^t^-Loup, vis-à-vis Olivet, C. dans les prairies artificielles.

Digitized by Google

LOLIUM multiflorum Lam. Juin-juillet.
Terres cultivées, C.

═══ **strictum** Presl. Juin.
C^ne de Salbris : Terrains sablonneux et incultes contigus à la Gare et à un bois de pins, R.R.
C^ne de Soings : Coteau au Nord du lac, R.R.

═══ **temulentum** L. Juillet-septembre.
Moissons, C.
J'ai trouvé la variété sans arêtes *(L. arvense With.)*
C^ne de Villeherviers : Moissons bordant le chemin de la Fringale entre l'allée de la ferme de Forêts et la prairie du Riau-Mabon.

GAUDINIA fragilis P. Beauv. Mai-septembre.
Bords des chemins, R.R.
C^ne de Romorantin : *Bords du chemin faisant suite à la rue de Launay.*
C^ne de Lanthenay : Bords de la route de la forêt, çà et là, depuis Belair jusques à l'allée de la ferme des Bruyères.
C^ne de Gièvres : Fossé Sud de la route départementale n° 1, à 9 kilomètres environ de Romorantin.

NARDURUS tenellus Rchb. *(Festuca tenuiflora Schr.)* Juin.
Lieux arides et calcaires, A.R.

Digitized by Google

Cne de Pruniers : Terres calcaires de la Maison-Blanche.

Cne de Selles-sur-Cher : Terres calcaires bordant la route nationale nº 156 et contiguës à un taillis.

Cne de Billy : Le Tertre-Blanc.

Cne de Gièvres : Terres calcaires de Jaugy, — champ des Calabres, — terres calcaires bordant la route départementale nº 1, à 9 kilom. environ de Romorantin.

Cne de Châteauvieux : Coteau de Péquignon.

Cne de Noyers : Carrières de Bellerôche.

NARDURUS Lachenalii Godr. *(Festuca Poa Kunth.)* Juin.

Terrains incultes sablonneux, A.C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Pruniers : Champs bordant le chemin entre Pruniers et Chênemoireau, vis-à-vis un bois de pins de la Robinière.

Cne de St-Julien : Grèves du Cher.

Cne de Salbris : Terrains sablonneux et incultes contigus à la gare et à un bois de pins avec sa variété *ramosa*.

Cne de Selles-St-Denis : Terres incultes bordant en contre-bas la route départementale nº 11, près du pont sur la Sauldre (rive droite).

Cne de Gy : Bois de pins bordant les bruyères de Boureau.

Digitized by Google

Cne de Soings : Bois de pins à l'Ouest du lac.

NARDUS stricta L. Juin-juillet.

Bruyères et bords des chemins sablonneux, C.C.

Autres espèces de Loir-et-Cher.

TRAGUS *racemosus* Hall. Sables de la Loire, A.B. (M. Franchet).

MILIUM *effusum* L. Parc de Cheverny, A.B. (Moi-même).

POA *sudetica* Hœnke. Parc de Cheverny, A.B. (M. Franchet).

FESTUCA *arundinacea* Schreb. Parc de Cheverny, A.B. (M. Franchet).

BROMUS *maximus* Desf. Blois, A.B. (MM. Franchet et Moreau).

— *madritensis* L Blois, A.B. (Moi-même).

Ces deux dernières espèces sont-elles spontanées?

TRITICUM *vulgari-aristatum* G.G. *(Ægylops)*, Gué du Loir, A.V. (MM. Franchet et Nouel).

— *ovatum* G.G. *(Ægylops ovata* L.) Gué du Loir, A.V. (M. Franchet).

Le *Ventenata avenacea* Kœl. *(Avena tenuis* Mœnch.) récolté dans un champ bordant la route de Blois à Romorantin, entre les bornes 17 et 18, n'y a pas été revu depuis.

L'*Avena orientalis* Schreb. se trouve dans presque tous les champs d'avoine cultivés.

Les *Hordeum* et *Triticum* sont cultivés aux environs de Romorantin. Le *Secale cereale* l'est dans toute la Sologne.

Digitized by Google

FILICES Juss.

OPHIOGLOSSUM vulgatum L. Juin-juillet.
Prés, bruyères.
C^ne^ de Pruniers : Pré de la cure, — pré à l'angle du chemin de Romorantin à Pruniers et de l'ancien chemin de Pruniers aux Thivaux, C.C. — Petit pâtureau de la Cornuère autour des basfonds, A.C. — Pré de la Besaudière bordant la rive gauche du ruisseau de Bâtarde, en amont du gué, — bruyères de Longueville bordant au Sud le chemin de Longueville à la Cornuère, R.R.
C^ne^ de Villefranche : *Pâtureau de Montauger.*
Je l'ai reçu venant de prairies bordant le Cher à l'Escourioux, C^ne^ de Villefranche, et d'un pré bordant la rive gauche de la Nasse derrière la tuilerie sise à la 1^re^ arche, C^ne^ de Lanthenay, mais je ne l'ai pas vu moi-même dans ces deux localités.

OSMUNDA regalis L. Juin-septembre.
Terrains marécageux ou tourbeux, C.
Je l'ai trouvé notamment :
C^ne^ de Romorantin : Ile de Mousseaux, R.R.
C^ne^ de Millançay : Bords de la Bonne-Heure un peu en amont des Augères, C.
C^ne^ de Pruniers : Prairie marécageuse à l'Est et près de Bâtarde.
C^ne^ de Veilleins : Fondrières du Pavillon.

Digitized by Google

FILICES

Cne de Villeherviers : Bords du Riau-Mabon dans les prés contigus au parc du Portail, C. — Rive droite du Grand-Fossé près la Doubletière, C.

Cne de Montrieux : Bords de la route départementale no 13 entre le Beuvron et l'allée de Courbanton.

Cnes de Salbris et St-Viâtre : Bords du Méant, là où il limite les deux communes, etc.

Cne de Pierrefitte : Val de la Boute-Vive.

Cne de St-Viâtre : Bords du Méant, — Ilot d'Aulnes à droite de la route de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne, avant la vallée du Néant.

Cne de Selles-St-Denis : Bords du chemin de Veur à Selles-Saint-Denis, à peu près à la hauteur de la ferme de Sauldre.

Cne de Souesmes : Terrains spongieux de la rive gauche de la Grande-Sauldre en amont et surtout en aval du pont de Pierrefitte, C. — Bords de la Petite-Sauldre dans le parc du château de Souesmes, — terrains spongieux de la rive gauche de la Petite-Sauldre, depuis le moulin de la Fosse-aux-Loups jusqu'aux limites du département, C.

Cne de Gièvres : Bas-fonds marécageux et boisé bordant la route de Gièvres à Selles

Digitized by Google

presque vis-à-vis les Nouïes (avec grappes fructifères terminées par des folioles).

Cne de Gy : Pâtureau du moulin Corbeau, — fondrières au moulin Tardieu ou Lardilleux.

Cne de Lassay : Pâtureau du château du Moulin sur la rive gauche de la rivière de Lassay.

Cne de Mur : Marécages tourbeux et boisés au-dessous de l'étang Maré, C.C. Je l'ai trouvé encore :

Cnes de Vernou, — Langon, Maray, — Neung-s-Beuvron, La Ferté-Saint-Cyr, — La Ferté-Imbault, Theillay, — Soings.

CETERACH officinarum Willd. Juin-juillet.

Vieux murs.

Cne de Romorantin : Contrefort méridional de l'ancienne église de St-Fiacre et puits au Nord de cette église, — puits du jardin de l'hospice.

Cne de Villeherviers : Côté extérieur du mur septentrional du cimetière de Villeherviers.

Cne de Maray : Contreforts et mur de l'église de Maray regardant le Nord.

Cne de Lassay : *Mur méridional dans la cour d'une maison à cheminées rondes à l'entrée du bourg.*

POLYPODIUM vulgare L. Octobre.

Murs; haies exposées au Nord, A.C.

Je l'ai trouvé notamment :

Digitized by Google

Cne de Romorantin : *Couronnement d'un mur dans la rue de la Pierre,*

Cne de Lanthenay : *Haie méridionale de la route de Romorantin à Loreux entre la Jalousie et la carrière Moureux, — haie du chemin de la forêt bordant les terres des Étangs,* — Bords d'un fossé limitant au Nord la pièce de pré attenant à la grange de Queue-de-Loup.

Cne de Loreux : Pieds d'arbres entourant les fossés de la Moutonnerie.

ASPIDIUM aculeatum Dœll. Juin-septembre. Bois, haies.

Var. **vulgare**

Cne de St-Julien : Bois au Sud de la route de St-Loup vis-à-vis Olivet sur les pentes du ruisseau qui le traverse, R.R.

Cne de St-Loup : Bords du ruisseau de la Grange, R.R.

Var. **angulare**

Cne de St-Loup : Bois et pâtureau de la côte du Cher entre Sauveterre et St-Loup en se rapprochant de St-Loup, A.C. — Bords du ruisseau de la Grange, R.R.

POLYSTICUM Thelypteris Roth. Juillet-août. Lieux tourbeux et marécageux, A.R.

Cne de Villeherviers : Bords du Riau-Mabon dans les prés contigus au parc du Portail, C.

Digitized by Google

C^ne de Maray : Prés et ruisseaux tourbeux à Daluet.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Marécages à la queue de l'étang de Bièvre au bas de Boisquillon.

C^ne de St-Viâtre : Marécages à la queue de l'étang de Favelle.

C^ne de Souesmes : Rive droite de la Petite-Sauldre, immédiatement au-dessous du moulin de la Fosse-aux-Loups, — rive gauche de la Petite-Sauldre au gué du Réau.

C^ne de Gièvres : Bords de l'arcade de la route de Gièvres à Selles-sur-Cher au bas des Petits-Étangs, — marécage boisé au Nord et près des Petits-Étangs.

C^ne de Gy : Plusieurs des nombreux marais de la rive droite de la Croisne entre le bourg de Gy et la Demangère.

C^ne de Soings : Bords de la Croisne entre sa source et le moulin Hadry.

C^ne de Châtillon-sur-Cher : Prés marécageux de la rive droite de la Sauldre en amont de la Cave.

POLYSTICUM Filixmas Roth. Mai-septembre.
Haies, boïs, C.
La forme de ses lobes est variable.

═══ **spinulosum** D.C. Juin-septembre.
Bois humides, terrains spongieux plantés d'aulnes, A.C.
Je l'ai trouvé notamment :

Digitized by Google

Cne de Loreux : Aulnaie bordant les prés de la Petite-Beauce près la Moutonnerie.

Cne de Millançay : Fossés bordant la route de Millançay aux Augères.

Cne de Vernou : *Marécage aux Augères.*

Cne de Villeherviers : Bords d'un marécage dans un bois de la rive droite du Grand-Fossé à la Doubletière.

Cne de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines sur les limites du département, avec pinnules à dents à peine mucronées.

Cne de Maray : Terrains tourbeux à Daluet.

Cnes de Neung-sur-Beuvron et Montrieux : Marécages à Villemorand.

Cne de St-Viâtre : Ilot d'Aulnes à droite de la route en allant de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne près le pont de Cholet.

Cne de Souesmes : Bords d'un ruisseau s'écoulant dans la Grande-Sauldre au Sud de Falaze, — terrains spongieux près le moulin de la Fosse-aux-Loups.

Cne de Gy : Marécages spongieux et boisés dans le pâtureau du moulin de Lardilleux et dans le pâtureau du moulin Corbeau.

Cne de Lassay : Fossé d'écoulement de l'étang Paris, — Fausse rivière du moulin Bezard.

Cne de Mur : Pentes boisées au bas de l'ancien moulin Poulet, — bois d'Aulnes au-

Digitized by Google

dessous de l'étang de Bordebure, — marécages tourbeux et boisés au-dessous de l'étang Maré, R.

Var. **dilatatum**

C^ne^ de Lassay : Marais derrière la ferme du château du Moulin.

CYSTOPTERIS fragilis Bernh. Mai-juin.

Ravins ombragés.

C^ne^ de S^t^-Loup : Ravin ombragé au bas de la route de Sauveterre à S^t^-Loup près Sauveterre, R.R. — Ravin traversé par la même route à l'endroit où l'on a érigé une croix, R.R.

ASPLENIUM filix fœmina Bernh. Juin-juillet.

Bois marécageux, terrains spongieux et ombragés, A.C. Je l'ai trouvé notamment :

C^ne^ de Millançay : Fossés bordant la route de Millançay à Vernou.

C^ne^ de Pruniers : Bords d'un pré spongieux à l'Est et près de Bâtarde.

C^ne^ de La Chapelle-Montmartin : Tailles de Ruines sur les limites du département, avec larges pinnules.

C^ne^ de Châtres : Bords du ruisseau de Perreux.

C^ne^ de Langon : Fossés à Bruleteau.

C^ne^ de Maray : Fossés tourbeux à Daluet.

C^ne^ de S^t^-Loup : Bords du ruisseau de la Grange.

Digitized by Google

Cnes de Neung et de Montrieux : Des deux côtés du ruisseau de Villemorand.

Cne de Pierrefitte : Val de la Boute-Vive.

Cne de St-Viâtre : Ilot d'Aulnes près le pont de Cholet à droite en allant de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne.

Cne de Souesmes : Val de la Sauldre en amont du pont de Pierrefitte, — val de la Petite-Sauldre depuis le moulin de la Fosse-aux-Loups jusque vers les limites du département.

Cne de Gièvres : Pâtureau de la Grange de Rère, — marécages boisés bordant la route de Gièvres à Selles presque vis-à-vis les Nouïes.

Cne de Gy : Bords du bief du moulin Lardilleux, — pâtureaux de ce moulin et du moulin Corbeau.

Cne de Lassay : Pâtureau du château du Moulin sur la rive gauche de la rivière de Lassay.

Cne de Mur : Marécages tourbeux et boisés au-dessous de l'étang Maré, C.C.

Cne de Ségy : Rouère du Coupe-Gorge.

ASPLENIUM Trichomanes L. Avril-septemb. Ravins et murs ombragés, C.

Ruta muraria L. Presque toute l'année. Vieux murs, A.R.

Digitized by Google

Cne de Romorantin : *Tour vis-à-vis la halle.*
Cne de Lanthenay : Ancienne église du Lieu.
Cne de Millançay : Mur de la tour du château de Villechenay, R.R.
Cne de Saint-Loup : Piliers et contreforts de l'église.
Cne de Lassay : Puits du château du Moulin.
Cne de Rougeou : Piliers de l'église.
Cne de Châteauvieux : Église du bourg.

ASPLENIUM Adianthum-nigrum L. Juin-novembre.

Haies, fossés ombragés, puits, vieux murs, C., notamment :

Cne de Lanthenay : Haies entre Gombault et Grange-Neuve.
Cne de St-Loup : Haie du chemin descendant au Cher immédiatement avant le bourg en venant de St-Julien.

SCOLOPENDRIUM officinale Sm. Presque toute l'année.

Puits.

Cne de Romorantin : Puits de la Comté dans le bas de la rue du Lys, — puits dans une cour ouverte vers l'extrémité de la rue de Beauvais, — puits de la maison de M. de Bellescize, rue de l'Écu.
Cne de Lanthenay : Puits à la Jalousie.
Cne de Maray : Puits de Belair.
Cne de Lassay : Puits du château du Moulin.

Digitized by Google

C^ne de Soings : Puits de la maison Pelletier dans le bourg, — puits de la ferme du Chastellier.

BLECHNUM Spicant Roth. Juin-octobre.

Fossés ombragés et humides, terrains spongieux et ombragés.

C^ne de Veilleins : Fossé Sud de l'allée de Chastenay s'embranchant sur la route de Veilleins à Courmemin.

C^ne de La Ferté-Imbault : Fossé entre deux étangs dans les bruyères des Jumeaux.

C^ne de St-Viâtre : Bords de la route de St-Viâtre à Chaumont-sur-Tharonne avant le pont de Cholet, — fossé parallèle au Néant à droite de la route avant d'arriver au Néant en allant de St-Viâtre à Chaumont-s-Tharonne.

C^ne de Souesmes : Bords de la route départementale n° 11 au bas du talus d'un taillis sis entre le bourg et le moulin de la Fosse-aux-Loups, — terrains spongieux au moulin de la Fosse-aux-Loups et entre ce moulin et les Vannes, — bords du Réau et marécages près la ferme de ce nom, — terrains spongieux et boisés entre Longate et le pont de Pierrefitte-sur-Sauldre, — ruisseau d'un bois au Sud de Falaze.

C^ne de Lassay : *Fossé d'écoulement de l'étang Paris.*

Digitized by Google

C^ne^ de Mur : Fossé ombragé et spongieux au-dessous de la Roche sur les limites de Veilleins, R.R.

Se trouve encore : C^ne^ de Salbris.

PTERIS aquilina L. Juillet-septembre.

Haies, bois, champs sablonneux, C.C.

Var. **crispa**

C^ne^ de Villefranche-sur-Cher : Bois bordant la levée du canal du Berry (rive droite) entre les bois de l'Escourioux et Villebrette.

Autres Espèces de Loir-et-Cher.

POLYSTICHUM *Oreopteris* D.C. Forêt de Blois, A.B. (M. Mathonnet).

ADIANTHUM *Capillus Veneris* L. C^nes^ de Celettes et La Chaussée-S^t^-Victor, A.B. (MM. Moreau et Mathonnet).

EQUISETACEÆ Rich.

EQUISETUM arvense L. Avril.

Champs humides, C.

═══ **Telmateya** Ehrh. Avril.

C^ne^ de Châtillon-sur-Cher : Val de la rive gauche de la Sauldre sur une longueur de plusieurs hectom., immédiatement avant le bois de la Cave.

═══ **palustre** L. Juin-juillet, novembre.

Bords des eaux, lieux humides, C.

Var. **polystachium**

Digitized by Google

C^ne de Pruniers : Au bas de la levée de l'ancien étang du Ponceau.

C^ne de Villeherviers : Au bas de la levée du pont de Villeherviers.

C^ne de Gy : Talus du fossé de la route de Romorantin entre le pont sur la Croisne et le bourg de Gy.

EQUISETUM limosum L. Mai.
Lieux fangeux, marais, C.

═══ **ramosum** Schleich. Juin-juillet.

C^ne de Villefranche : Val du Cher, — ile de l'Escourioux, R.R.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

EQUISETUM *hyemale* L. Val de la Loire à Blois, A.B. (M. Moreau).

RHIZOCARPEÆ Gr.

MARSILEA quadrifoliata L. Août-septembre.
Étangs, fossés.

C^ne de Lanthenay : *Étang du Moulin-Rouge*, C. — Gardoir de l'étang Lanoue, R.R. — Étang-Neuf au bas de la chaussée.

C^ne de Veilleins : Étang de la Gravelle, C.C. — Fondrières du Pavillon au-dessous de la Pingotière, R.R. — Rouère de l'ancien étang de la Pingotière et fosse au bas de la chaussée de cet étang.

Digitized by Google

C^ne de Marcilly-en-Gault : Étang de Vérière, — fossé d'écoulement entre les étangs Gibaut et de la Goujonnerie.

C^ne de Mur : La forcière de la Chaussée et deux des étangs de cette ferme, C.C.

PILULARIA globulifera L. Juillet-octobre. Bords des étangs, lieux inondés, C.C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Lanthenay : Étang de Nobière, — *ancien réservoir au bas de la chaussée de l'étang de Courmin,* — fosse entre les tailles du Lieu et la route de la forêt presque vis-à-vis l'allée des Bruyères.

C^ne de Loreux : Étang de Masinière.

C^ne de Pruniers : Étangs de Longueville, — de Bâtarde, — de la Pommerie, — de la Châtre, — fosses de la rive gauche de la Sauldre entre Beauvais et les Quatre-Roues.

C^ne de Veilleins : Étangs de la Gravelle, — du Lièvre, — de Bordebure.

C^ne de Lassay : Étang-Neuf, et encore :

C^nes de Courmemin, Millançay, — Salbris, La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, St-Viâtre, Theillay, — Gy, etc. Il y a peu d'étangs aux bords desquels il ne se trouve.

ISOETEÆ Rich.

ISOETES tenuissima Bor. De juin à septembre suivant les années. Étangs.

Digitized by Google

C^ne de Loreux : Étang de la Harpe, C.C. — Étangs Dernier ou Regnier, — Luneau, — Chauveu.

C^nes de Millançay et Veilleins : Étang de la Meunerie.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Étangs de Vérière, — de Fontenille.

LYCOPODIACEÆ L.C. Rich.

LYCOPODIUM inundatum L. Juillet-octobre. Marécages et bords marécageux des étangs, — chambres d'emprunt dans les bruyères.

C^ne de Salbris Chambre d'emprunt longeant à l'Est le chemin de fer dans une bruyère sise à 3 kilom. environ au Nord de Salbris.

C^ne de La Ferté-Imbault : Rive gauche de l'étang de l'Écluse et des marais qui déversent leurs eaux dans cet étang.

C^ne de Marcilly-en-Gault : *Chambre d'emprunt bordant la route de Marcilly-en-Gault à Neung à 1 kilomètre environ de Marcilly-en-Gault.*

C^ne de Souesmes : Chambre d'emprunt en amont et près du pont de Pierrefitte-sur-Sauldre sur l'emplacement de l'ancien chemin de Pierrefitte à Souesmes.

Digitized by Google

CHARACEÆ

C^ne de Gy : *Bords d'un marais à l'extrémité occidentale des landes de Chênemoireau.*

C^ne de Mur : Chambre d'emprmnt bordant la route de Mur à Soings.

Autre espèce de Loir-et-Cher.

LYCOPODIUM *clavatum* L. C^ne de St-Agyl, A.V. (M. Em. Desvaux).

CHARACEÆ Rich.

NITELLA syncarpa Al. Br. Septembre.

Eaux stagnantes.

C^ne de Lassay : Bords de l'étang du Rotay.

NOTA. — Les *Nitella syncarpa*, *capitata* et *opaca* ont entre eux une très grande affinité et pendant longtemps je les ai confondus. L'abondance des *N. capitata* et *opaca* aux environs de Romorantin m'autorise à penser que le *N. syncarpa* s'y trouve également commun.

capitata Agardh. Avril-mai.

Mares, fosses, fossés, étangs, eaux paisibles des terrains marneux, siliceux ou argileux, C., parfois incrusté, généralement pur. Je l'ai trouvé :

C^nes de Romorantin, Courmemin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Veilleins, Villeherviers, — Mennetou, Langon, — Marcilly-en-Gault, Selles-St-Denis, — Gièvres, Gy, Lassay,

Digitized by Google

mais je ne puis citer comme localités où il persiste que :

C^ne de Romorantin : Petite fosse dans le chemin des Arrogantes faisant suite à celui de Chat-Lièvre.

C^ne de Pruniers : Marnières de Longueville, et surtout :

C^ne de Villeherviers : Fosse sise sur la rive droite du Riau-Mabon près et au Nord du chemin de la Fringale.

NITELLA opaca Agardh. *(N. syncarpa* var. *Smithii Coss. et Germ.)* Avril-juin.

Mares, fosses, fossés, étangs, eaux paisibles dans les terrains calcaires et siliceux, C., incrusté ou pur, variant du jaune pâle au vert.

C^nes de Romorantin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Villeherviers, — Langon, S^t-Julien, S^t-Loup, Villefranche, — Gièvres, sans que je puisse citer des localités où il persiste si ce n'est :

C^ne de Gièvres : Mare bordant l'ancien chemin de Gièvres à Chabris dans le val du Cher, où je l'y trouve assez fréquemment.

= **flexilis** Al. Br. Mai-juillet.

Étangs, mares, fossés, ruisseaux et rivières, C.C.

Fructifie rarement dans les eaux courantes

Digitized by Google

Cnes de Romorantin, Courmemin, Lanthenay, Loreux, Millançay, Pruniers, Vernou, Veilleins, Villeherviers, — Mennetou, Maray, — La Ferté-Imbault, Marcilly-en-Gault, Souesmes, — Gy, Lassay, Mur. Très inconstant dans ses stations, je citerai comme localité où je l'ai trouvé le plus souvent :

Cne de Lassay : Petit étang dans des bruyères sises entre le pâtureau du château du Moulin et le chemin de Lassay à ce château.

NITELLA translucens Agardh. Juin-juillet.

Trouvé une seule fois fructifié au mois d'avril à la suite d'un hiver peu rigoureux.

Varie à individus grands et à individus beaucoup plus petits dans toutes leurs parties.

Eaux stagnantes à des profondeurs variables et dans des terrains calcaires, siliceux ou argileux, C.C.

Cnes de Romorantin, Courmemin, Lanthenay, Loreux, Millançay, Pruniers, Veilleins, Villeherviers, — Villefranche, — Marcilly-en-Gault, St-Viâtre, Theillay, — Gièvres, Gy, Lassay, Mur.

Je l'ai rencontré souvent :

Cne de Villefranche : Chambre d'emprunt du canal du Berry (rive droite), à mi-chemin

Digitized by Google

entre les ponts de Villebrette et de l'Escourioux, C.C.

NITELLA flabellata Kütz. Juin-juillet.

C^ne de Villefranche : Fosse dans l'île de l'Escourioux où après avoir pendant longtemps persisté il cesse de paraître depuis plusieurs années.

═══ **gracilis** Agardh. Avril-octobre.

Fosses, fossés, étangs.

Il a tantôt l'apparence et la tenuité du *N. batrachosperna*

C^ne de Marcilly-en-Gault : Bords de l'étang de Chantemerle.

Tantôt se rapproche du *Nitella flabellata :*

C^ne de Lanthenay : Réservoir au Dreuillet.

C^ne de Marcilly : Trou de bonde de l'étang Meuné.

Passe du jaune topaze au vert sombre.

A rayons très-courts et à rayons allongés.

Commun partout en 1860 et, dans d'autres années, presqu'introuvable.

Aussi variable d'aspect qu'inconstant dans ses stations.

Je l'ai récolté : C^nes de Courmemin, Lanthenay, Loreux, Pruniers, Veilleins, Villeherviers, — Marcilly-en-Gault, — Gy, Lassay.

Je puis citer comme localité où il se montre assez souvent :

Digitized by Google

CHARACEÆ

Cne de Lanthenay : Bords de l'étang de Nobière plus particulièrement du côté de la chaussée.

NITELLA tenuissima Coss. et Germ. *forma major*. Avril-mai.

Marnières.

Cne de Pruniers : Marnières de Longueville où je ne le trouve plus depuis plusieurs années.

Id. *Forma minor*. Août.

Cne de Marcilly-en-Gault : Étang de Vérière, R.R.

C'est avec doute que je donne à cette forme de *Nitella* le nom de *tenuissima*. Il se rapproche en effet du *tenuissima* par ses tiges peu ramifiées et par ses verticilles espacés, mais il rappelle le *N. batrachosperma* par l'exiguité de toutes ses parties et l'époque de son apparition.

batrachosperma Al. Br. Juillet-août.

Étangs, C. Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Courmemin : Étangs de la Grande-Bretèche, — de l'Imbertière, — de Vaulien.

Cne de Lanthenay : Étangs de Nobière, — de la Flandrinière.

Cne de Loreux : Étangs de Cantinet, — Dernier ou Regnier, — de la Harpe.

Cne de Millançay : Étangs de Malzoné, — de la Meunerie, — des Noëls.

Cne de Pruniers : Étang de la Pommerie.

Digitized by Google

C^ne de Veilleins : Étangs Fleuri, — de la Rouche.

C^ne de Villeherviers : Étangs Neuf, — *Bardin*.

C^ne de Dhuizon : Étang bordant à l'Est la route départementale n° 13 entre Vernou et Dhuizon.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Étang de la Prée.

C^ne de Lassay : Étangs Bezard, — du Rotay, — petit étang dans des bruyères sises entre le pâtureau du château du Moulin et le chemin de Lassay à ce château.

NITELLA intricata Al. Br. Mars-mai.

Eaux stagnantes des terrains calcaires ou argileux, C. Plante polymorphe le plus souvent incrustée et parfois parfaitement pure.

C^ne de Romorantin : Fossés et fosses du chemin des Arrogantes faisant suite à celui de Chat-Lièvre, — fosses au-dessous de la Guillotière.

C^ne de Lanthenay : Marnières de Grangeneuve.

C^ne de Pruniers : Marnières de la Besaudière, C.C. — Marnière de la Cornuère, R.R. — Anciennes marnières à St-Marc, R. — Fosses bordant la rive gauche de la Sauldre entre Beauvais et les Quatre-Roues, R.R. — Fossés du val de la Sauldre (rive droite) au Sud des Vérières.

Digitized by Google

Dans ces deux dernières localités je l'ai trouvé pur de toute incrustation.

C^ne de Villeherviers : **Marnières entre Chenon et la Gouabinière**, C.C. — Petit étang à Forez, — partie creuse du chemin traversé par le Grand-Fossé à l'extrémité du parc des Roches, — les grandes marnières des Roches.

C^ne de S^t-Loup : Fossé de la route entre Mennetou et S^t-Loup.

C^ne de Langon : Chambre d'emprunt du canal du Berry au bas du pont des Tréchis, — chambre d'emprunt du canal du Berry entre Langon et Préjeux, — marnières du val de la Petite-Rère voisines du pâtureau de Nocfond.

C^ne de Villefranche : Fossé de l'allée allant de la Gaudinière à la route départementale n° 7, — mare de la Bezardière près et à l'Est de cette route n° 7.

C^ne de Gièvres : Fossé de la route départementale n° 1 vers la Colinière, à environ 9 kilom. de Romorantin, — fossés et fosse du val du Cher bordant à l'Est l'ancien chemin de Gièvres à Chabris.

Sans avoir de fixité dans ses stations, cette plante se trouve toujours dans les marnières de la Besaudière et surtout dans celles situées entre Chenon et la

Digitized by Google

Gouabinière dont elle tapisse le fonds seule ou en société avec le *Chara aspera*.

CHARA coronata Ziz. Juillet-septembre.

Étangs sablonneux, C.

Je l'ai trouvé notamment :

Cne de Courmemin : Étangs de la Petite et de la Grande-Bretèche, — de la Grenetière.

Cne de Lanthenay : Étangs de Nobière, — Lanoue, — de la Flandrinière.

Cne de Loreux : Étangs de Mazinière, — Dernier, — de la Harpe, C.C.

Cne de Millançay : Étangs de Malzoné, — de la Meunerie.

Cne de Pruniers : Étang de la Châtre.

Cne de Veilleins : Étangs d'Aube-Fond, — Fleuri, — de la Gravelle, — du Lièvre, — de la Meunerie, — *de la Pingotière*.

Cne de Villeherviers : *Étangs Bazin, — de Cornilly*.

Cne de Dhuizon : Étang bordant à l'Est la route départementale n° 13 entre Vernou et Dhuizon.

Cne de Lassay : Étangs Neuf, — Paris, — Bezard, — du Rotay.

Cne de Mur : Le grand étang de la Chaussée.

fœtida Al. Br. Mai-septembre.

Eaux stagnantes des terrains calcaires principalement dans les marnières, C.C.

Affecte des formes et des grandeurs très différentes. Quelquefois vert et pur, le plus

Digitized by Google

souvent grisâtre et chargé d'incrustations avec ou sans papilles, à bractées plus ou moins longues, à rayons connivents ou divergents, à tiges grêles ou épaisses. Parmi les variétés les plus remarquables je citerai les suivantes :

Var. **longibracteata** *divergens* S. Var. *mundior*.

C^ne de Lanthenay : Marnière aux Étangs.

C^ne de Villeherviers : Marnière entre Chenon et la Gouabinière.

Var. **gracilis** *convergens* S.V. *mundior*.

C^ne de Lanthenay : Marnière aux Étangs.

J'ai surtout remarqué une variété à rayons de la coronulle très-développés et un peu divergents en forme d'étoile, que j'appelle *Stellata*, trouvée le 16 juin 1865

C^ne de Villeherviers : Marnière contiguë aux prés du Riau-Mabon et à la route de Romorantin à Theillay.

Je l'y ai vainement cherchée depuis.

CHARA hispida Sm. Mai-juillet.

Eaux stagnantes, principalement dans les marnières, C.

J'ai toujours vu les papilles de cette espèce et de la suivante affecter deux directions contraires entre chaque entre-nœud : descendantes dans la moitié supérieure, ascendantes dans l'autre moitié.

═══ **aspera** Willd. Mai-juin.

Marnières.

Digitized by Google

C^ne de Romorantin : Marnières des Monteaux, R.R.

C^ne de Lanthenay : Marnières de Grangeneuve, R.

C^ne de Pruniers : Marnières de la Besaudière, C.C. — Anciennes marnières contiguës aux bruyères de la Pommerie.

C^ne de Villeherviers : Les grandes marnières des Roches, C.C. — Marnières entre Chenon et la Gouabinière, C.C.

C^ne de Villefranche : Fosse bordant au Nord l'allée de la Gaudinière et la route départementale n° 7.

C^ne de Theillay : Marnières bordant la route de Romorantin à Theillay, près le château de Rère.

CHARA fragifera Dur. Mai-août.

Fosses, étangs, rivières, A.C.

Je l'ai trouvé notamment :

C^ne de Courmemin : Étang de l'Imbertière.

C^ne de Lanthenay : Étang de Nobière, — fosses d'extraction de terres glaises à l'Ouest de la route départementale n° 13.

C^ne de Loreux : Étang Dernier vers la queue.

C^ne de Millançay : Étangs de Malzoné, — de la Meunerie, R.

C^ne de Pruniers : Étangs de Bâtarde, — des Landes, — de la Châtre, — marais Chaunet, — fosse dans les bruyères des Landes.

Digitized by Google

CHARACEÆ

C^ne de Veilleins : Étangs de la Meunerie, — de Bordebure, — de la Rouche, — de la Pingotière.

C^ne de Vernou : Fosse au Nord d'un pâtureau sis entre Boussavie et Lallay aux environs de Marcheval, sur les limites de Millançay.

C^ne de Villeherviers : Ancien lit de la Rère en amont du pont de la route de Romorantin à Theillay.

C^ne de Marcilly-en-Gault : Petit étang bordant la route de Marcilly à Neung près le chemin de Boisquillon, — étang de Vérière, — bas de la chaussée de l'étang de la Gravelle, — étang s'écoulant dans celui de Courcelles.

C^ne de S^t-Viâtre : Étang de Marcilly dans la partie la plus rapprochée de l'étang de Favelle.

C^ne de Selles-S^t-Denis : Fossé parallèle à la Rère entre les Anges et la Bronze.

C^ne de Theillay : Petites marnières bordant la route de Romorantin à Theillay près le château de Rère.

C^ne de Gièvres : *Marais de Villefondue.*

C^ne de Lassay : Étang-Neuf, — gardoir de l'étang Paris, — deux petits étangs sis dans des bruyères contiguës au pâtureau du château du Moulin et au chemin de Lassay à ce château.

Digitized by Google

NOTA. — Le plus petit de ces étangs a été détruit; le *Ch. fragifera* le tapissait entièrement.

CHARA fragilis Desv. Avril-septembre.
Fosses, étangs, eaux stagnantes, C.

Var. **capillacea** *(Ch. capillacea* Wallm.)
Flexible et avec renflements bulbiformes, A.C., notamment :

C^ne^ de Romorantin : Pièce d'eau dans les bruyères de Chat-Lièvre.

C^ne^ de Lanthenay : Étang de Courmin.

C^ne^ de Pruniers : Étangs de Bâtarde, — de la Châtre, — des Landes.

C^ne^ de Veilleins : Étangs du Lièvre, — de la Rouche.

C^ne^ de Villeherviers : Ancien lit de la Rère en amont du pont de la route de Romorantin à Theillay, — fosse de la rive droite du Riau-Mabon près et au Nord du chemin de la Fringale.
J'ai trouvé le 6 juin 1861 cette variété *Capillacea* à rayons divergents et d'un beau vert

C^ne^ de Pruniers : Étang de la Pommerie.

Var. **crassicaulis**

C^ne^ de Lanthenay : Marnières de Grangeneuve.

Digitized by Google

Digitized by Google

ADDITIONS :

PAGE 34 : Ajoutez à la suite de la dernière ligne :

Le *Thlaspi alliaceum* L. vient de m'être signalé dans les jardins de Pierrefitte-sur-Sauldre par M. Guiho, commis principal des Contributions indirectes.

PAGE 133 : Ajoutez immédiatement avant **CHÆROPHYLLUM temulum** L.

ANTHRISCUS sylvestris Hoffm.

Cne de Salbris : Partie de la futaie bordant le chemin vis-à-vis l'aile occidentale du château du Chêne.

PAGE 251 : Ajoutez immédiatement avant **ALISMA plantago** L.

Je viens en effet de trouver l'*Alisma parnassifolium*

Cne de St-Viâtre : Étang de la Grande-Corbois au bas de la chaussée, R.R.

PAGE 345, 8e ligne, à la suite des mots : — de Fontenille, ajoutez : — de la Prée.

Cne de Saint-Viâtre : Étang de Galop.

ERRATA :

PAGE 21, 12e ligne, à **FUMARIA borœi**, substituez : **FUMARIA Boræi** Jord.

PAGE 37, avant dernière ligne, à ═══ **alissoides** Lam. substituez ═══ **alyssoides** Lam.

Digitized by Google

PAGE 176, 26e ligne, au mot découverte substituez découvert.

PAGE 114, 30e ligne,
PAGE 295, 5e ligne,
PAGE 319, 19e ligne,
PAGE 351, 4e ligne,
} au mot *Bardin* substituez *Bazin*.

Je ne relève pas les pages assez nombreuses où des lettres majuscules doivent être substituées aux lettres minuscules et *vice versâ*.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

U. HOLZER BINDER BOSTON, MASS.

Digitized by Google